



Standard
Стандартна серія

Дікам Плюс, РК

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ ТА КУКУРУДЗИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 2,4-Д (2,4- дихлорфеноксиоцтова кислота) у формі диметиламіної солі, 344 г/л-дикамба у формі диметиламіної солі, 120 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ: 10 л, 20л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знищення широкого спектру двосім'ядольних бур'янів
- Висока швидкість дії
- Ефективність проти підмаренника чіпкого, осотів та березки польової
- Проти бур'янів, стійких до 2,4-Д та МЦПА

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат Дікам Плюс, РК - системний гербіцид для знищення двосім'ядольних бур'янів у посівах пшениці, ячменю та кукурудзи. Вдало підібрані речовини з гербіцидними властивостями (2,4-Д та дикамба) та їх співвідношення в препаративній формі забезпечують неперевершений ефект у боротьбі з бур'янами, навіть зі стійкими до дії гербіцидів на основі 2,4-Д та 2М-4Х. Діючі речовини належать до синтетичних ауксинів, проникають у рослини через тканини надземних органів та коренів. Діють як інгібітори росту.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ДІКАМ ПЛЮС, РК:

Чутливі бур'яни	Середньочутливі бур'яни	Малочутливі бур'яни
• амброзія полинолиста • волошка синя • галінсога (види) • гірчиця польова • грицики звичайні • зірочник середній • кучерявець Софії • лобода (види) • лутига (види)	• підмаренник чіпкий • полин звичайний • редька дика • рутка лікарська • спориш звичайний • талабан польовий • хрінниця крупковидна • шпегель звичайний • щавель горобиний	• березка польова • гірчак (види) • дурман звичайний • жабрій (види) • осот жовтий польовий • осот рожевий • осот щетинистий • паслін чорний • ромашка непахуча • щиріця (види)
		• вероніка (види)

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦИД ДІКАМ ПЛЮС, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідливі об'єкти	Норма внесення, л/га
Пшениця	Обприскування посівів навесні від фази кушіння до виходу в трубку культури	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні, у тому числі стійкі до препаратів на основі тільки 2,4-Д та 2М-4Х кислот	0,8
Ячмінь			0,5-0,7
Кукурудза	Обприскування посівів у фазі 3-5 листків		1,5



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДІКАМ ПЛЮС, РК:

В якій фазі розвитку рослин потрібно використовувати Дікам Плюс, РК?

У посівах пшениці, ячменю препарат застосовується одноразово від фази кущіння до виходу в трубку рослин, кукурудза обробляється одноразово у фазі рослин 3-5 листків.

Як досягти максимальної ефективності від обробки гербіцидом Дікам Плюс, РК?

Найвищий рівень ефективності (80-90%) гербіцидної дії досягається у разі обробки посівів у ранні фази розвитку (2 - 4 листки) бур'янів. Слід пам'ятати, що при застосуванні препарату в більш пізні фази розвитку бур'янів, особливо проти видів гірчаків, ромашки непахучої, зірочника середнього, підмаренника чіпкого, ефективність гербіциду істотно зменшується.

Яку норму витрати препарату слід встановити при використанні в посівах ячменю?

Норму витрати на ячмені слід встановлювати з урахуванням чисельності бур'янів та стану посівів культурних рослин. При невисокій чисельності тільки чутливих бур'янів (до 10 шт./м²) та при добре розвинутих культурних рослинах в посівах препарат доцільно використовувати з нормою витрати 0,5 л/га, у разі високої чисельності (більше 50 шт./м²) бур'янів - 0,7-0,8 л/га.

Чи можна використовувати Дікам Плюс, РК в бакових сумішах з іншими гербіцидами?

Препарат Дікам Плюс, РК сумісний з багатьма гербіцидами, його можна використовувати в бакових сумішах для підвищення рівня рентабельності гербіцидної обробки в посівах пшениці, ячменю та кукурудзи.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30 °C



	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +15°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб внесення	Бур'яни	Норма внесення, л/га	Максимальна кратність обробок
Жито	Обприскування посівів навесні від фази кущіння до виходу в трубку культури	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні	0,6-0,8	1
Овес			0,5-0,7	

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Пшениця, ячмінь: Дікам Плюс, РК (0,5-0,6 л/га) + Меркурій, ВГ (0,015 кг/га)
- Дікам Плюс, РК (1,0-1,2 л/га) + Крейсер, ВГ (40 г/га)
- Дікам Плюс, РК (0,5-1,0 л/га) + Вулкан Плюс, РК (3-4л/га)