



Standard
Стандартна серія

Ін Сет, ВГ

**ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ, ТА ОДИН З
НАЙБЕЗПЕЧНИШИХ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, КОНТАКТНО-
ШЛУНКОВИЙ ІНСЕКТИЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ
ПРОТИ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ШКІДНИКІВ**



ДІЮЧА РЕЧОВИНА: імідаклопрід, 700 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ: 1 кг фольгований пакет (10 пакетиків по 100 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Тривала захисна дія
- Незалежність від стадій розвитку шкідників
- Високі системні властивості
- Відсутність резистентності шкідників до препарату

МЕХАНІЗМ ТА СПЕКТР ДІЇ:

Системний інсектицид з контактною та шлунковою дією для боротьби з широким спектром шкідників в посівах основних сільськогосподарських культур. Діюча речовина препарату швидко поглинається рослинами та поширюється по них акропетально. Імідаклопрід діє як антагоніст постсинаптичних нікотинінових рецепторів, з наступним руйнуванням центральної нервової системи комах, внаслідок чого шкідники гинуть.

ІНСЕКТИЦИД ІН СЕТ, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га	Строки обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка	0,1	Обприскування в період вегетації	30	1
	Попелиці, п'явиці, трипси	0,05-0,07			
Ріпак ярий та озимий	Ріпаківий квіткоїд, хрестоцвітні блішки, попелиці	0,05-0,07		30	1
Картопля	Колорадський жук	0,045-0,05		20	1
Яблуня	Каліфорнійська щитівка, яблунева плодожерка, попелиці	0,07		30	2
Виноград	Виноградна листовійка, листова форма філоксери	0,07		30	1

Проводити механізовані роботи дозволяється через 1 добу, ручні роботи - 3 доби.



Зелена яблунева
попелиця



Клоп шкідлива
черепашка



Колорадський жук



Ріпаківий квіткоїд

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ІН СЕТ, ВГ:

У чому полягає унікальність цього препарату?

Завдяки системним властивостям препарат має особливо високу ефективність в обмеженні шкодочинності комах з сисним ротовим апаратом. При цьому препарат використовується з низькими нормами витрати, при яких ризики забруднення навколишнього природного середовища мінімальні.

Чи впливає температура та вологість повітря на ефективність препарату?

Інсектицид застосовується у широкому інтервалі температур та вологості повітря, ефективність його дії менше залежить від цих факторів.

Чи має інсектицид фітотоксичну дію?

Фітотоксичні властивості у препарату відсутні, при його використанні некротичних плям на плодах яблуні не спостерігається. Тому даний інсектицид є оптимальним препаратом для захисту яблуні від каліфорнійської щитівки та попелиці впродовж всього періоду вегетації.

Чи можна використовувати препарат у бакових сумішах з іншими препаратами?

Препарат сумісний з більшістю препаратів, проте перед приготуванням бакової суміші необхідно провести пробне змішування. Бакову суміш слід використовувати відразу після приготування.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (помірнотоксичний). Препарат токсичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки при дотриманні умов зберігання. від дати виготовлення.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від -10°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		- на польових культурах 200-400 л/га - у яблуневих садах та на виноградниках 800-1000 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТИВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб та час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробок
Зернові культури (ячмінь ярий)	Злакові мухи, п'явиці, блішки, клоп шкідлива черепашка	0,045-0,05	Обприскування в період вегетації	1
Томати, баклажани	Колорадський жук, попелиці, трипси	0,045-0,05		
Цибуля	Попелиці, трипси	0,045-0,05		
Томати, огірки закритого ґрунту	Попелиці, білокрилка теплична, трипси	0,05-0,07		
Хміль	Попелиця хмельова	0,17	вручну методом мазка	
Буряки цукрові	Комплекс сисних шкідників	0,09	Обприскування в період вегетації	
Соя	Акацієва вогнівка, трипси та інші сисні шкідники	0,07		

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту груш, слив.

РЕКОМЕНДОВАНІ БАКОВІ СУМІШІ:

- Ін Сет, ВГ (50-70 г/га)+Альтекс, КЕ (0,1 л/га)