



Standard
Стандартна серія

Ефес, РК

**ГЕРБІЦИД КОНТАКТНОЇ ДІЇ ДЛЯ
ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСІВАХ
ГОРОХУ ТА СОЇ**



ДІЮЧА РЕЧОВИНА: бентазон, 480 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ: 20 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока швидкість дії
- Тривалий захисний ефект
- Висока селективність до культурних рослин
- Пригнічення бур'янів, стійких до 2,4-Д та 2М-4Х

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Гербіцид контактної дії для боротьби з однорічними двосім'ядольними оурянами, в тому числі стійкими до препаратів на основі 2,4-Д та 2М-4Х кислот в посівах гороху та сої. Бентазон призводить до порушення функціонування другої фотосинтетичної системи з подальшим припиненням розвитку і поділу клітин.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ЕФЕС, РК:

Гербіцид використовується для пригнічення та знищення широкого спектра двосім'ядольних бур'янів та рослин з родини осикових.

Чутливі бур'яни			Середньочутливі бур'яни
• амброзія • полинолиста • галінсога • дрібноквіткова • гірчиця польова • гречка татарська • дурман звичайний	• нетреба звичайна • паслін чорний • підмаренник чіпкий • полин звичайний • портулак городній • редька дика • роман	• ромашка (види) • жабрій • смикавець круглий • щиріця (види)	• кропива (види) • фіалка польова

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Горох (на насіння)	Однорічні двосім'ядольні	Обприскування посівів в фазу 5-6 листків культури	3,0	1
Соя	Однорічні двосім'ядольні	Обприскування посівів в фазу 1-3 справжніх листків культури	1,5-3,0	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕФЕС, РК:

Що впливає на ефективність роботи гербіциду Ефес, РК?

Ефективність гербіцидної обробки залежить від якісного внесення препарату. Тому слід ретельно дотримуватися правил регулювання обладнання для внесення препарату, приготування робочого розчину та організації проведення робіт по застосуванню пестицидів.

У якій фазі культури потрібно застосовувати препарат Ефес, РК?

В посівах гороху препарат застосовується одноразово у фазі 5-6 листків культури. Соя обробляється одноразово у фазі 1-3 справжніх листків культури. При цьому максимальна норма витрати в посівах сої використовується у разі переростання бур'янів (від фази більше 4-х листків для однорічних, фази стеблуння – для багаторічних).

Чи можна використовувати Ефес, РК в бакових сумішах з іншими гербіцидами?

З метою підсилення гербіцидної дії препарату можливе його використання в сумішах з іншими гербіцидами, які застосовують у період вегетації культури. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з урахуванням видового складу та чисельності бур'янів в посівах



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Гербіцид не рекомендується застосовувати в баковій суміші з протизлаковими препаратами на основі діючої речовини клетодим.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас (малотоксичний). Помірно небезпечний для теплокровних, безпечний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки при дотриманні умов зберігання. від дати виготовлення.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування Від +15°C до +25°C Тепла погода підсилює гербіцидну дію препарату		Приготування робочого розчину 200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування За умов вологої погоди ефективність внесення препарату зростає, але дощ протягом 3 годин після обприскування може знизити його активність. Негативно впливає на дію препарату догортвувалий посушливий період.		Погодні умови в період застосування Обприскування дощільно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима та яра, жито, ячмінь, овес	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2М-4Х та 2,4-Д бур'яни	Обприскування посівів весною у фазі куціння культури	2,0-4,0	1
Просо	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2М-4Х та 2,4-Д бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3-х листків культури	2,0-4,0	
Рис	Бульбоочерет та інші болотні бур'яни	Обприскування посівів у фазі куціння культури	2,0-4,0	
Кукурудза	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2М-4Х та 2,4-Д бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3-5 листків культури	2,0-4,0	
Льон-довгунець	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2М-4Х бур'яни	Обприскування посівів у фазі «ялинки» за висоти культури 3-10 см	3,0-4,0	
Хміль (віком понад 3 роки)	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування після 1-го обгортання за висоти бур'янів 10-15 см	4,0	

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту м'яти перцевої, райграсу однорічного, коношини польової 1-го та 2-го років вегетації та насінневих посівів коношини польової, повзучої, гібридної; люцерни 1-го року вегетації (насінники); ярих зернових (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом люцерни або коношини.