



Standard  
Стандартна серія

# Рейтар, КС

**ГРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД ДЛЯ БОРОТЬБИ З  
ОДНОРІЧНИМИ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ ТА  
ЗЛАКОВИМИ БУР'ЯНАМИ**

**ДІЮЧА РЕЧОВИНА:** прометрин, 500 г/л

**ФОРМУЛЯЦІЯ:** концентрат суспензії

**УПАКУВАННЯ:** 20 л пластикова канистра

**ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:**

- Контроль двосім'ядольних та злакових бур'янів
- Тривала захисна дія
- Ефективність проти бур'янів (амброзія полинолиста, гірчиця польова, редька дика, гірчак (сходи з насіння))

**МЕХАНІЗМ ДІЇ:**

Діюча речовина ґрунтового гербіциду відзначається високою гербіцидною активністю по відношенню до однорічних двосім'ядольних та деяких злакових бур'янів. Прометрин поглинається проростками та корінцями бур'янів, активно розноситься по ксилемі, накопичується в меристематичних тканинах. Діюча речовина препарату призводить до руйнування фотосинтетичної системи з подальшим припиненням поділу клітин та росту і розвитку рослин.

**СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ РЕЙТАР, КС:**

Вероніка плющелиста, галінсога, гірчак (сходи з насіння), гірчиця польова, дворядник степовий, буркун лікарський (сходи з насіння), дурман звичайний, зірочник середній, кропива дводомна, лобода біла, жовтозілля звичайне, курачі очка польові, паслін чорний, осот рожевий (сходи з насіння), калачики, плоскуха звичайна, редька дика, пальчатка кровоспиняюча, череда, мишій (види), щириця (види).

**ГЕРБІЦИД РЕЙТАР, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:**

| Культура  | Спосіб внесення                                                                        | Бур'яни                             | Норми внесення, л/га |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Кукурудза | Обприскування ґрунту до посіву, під час посіву або після, але до появи сходів культури | Однорічні двосім'ядольні та злакові | 2,0-4,0              |
| Соняшник  |                                                                                        |                                     |                      |
| Картопля  | Обприскування ґрунту до появи сходів культури                                          |                                     | 3,0-4,0              |



## ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ РЕЙТАР, КС:

**Чи можна використовувати препарат Рейтар, КС в бакових сумішах з іншими ґрунтовими гербіцидами?**

Рейтар, КС сумісний в бакових сумішах з іншими ґрунтовими гербіцидами, але в кожному окремому випадку необхідно провести тест на сумісність.

**Від чого залежить норма витрати препарату?**

Норма витрати препарату регулюється залежно від типу ґрунтів та їх механічного складу:

- мінімальна норма витрати застосовується на малогумусних, легких за механічним складом ґрунтах;
- середня - на суглинкових із вмістом гумусу менше 4%;
- підвищена - на суглинкових і важких із вмістом гумусу 4-5% та торф'яних.

**Як досягти найвищої ефективності від застосування препарату?**

На прояв гербіцидного ефекту особливо впливає стан ґрунту перед внесенням гербіциду. Ґрунт перед внесенням препарату має бути оброблений згідно з рекомендаціями (зволоженим, дрібногрудкуватим з ретельно подрібненими рослинними рештками). У разі загрози пересихання верхнього шару ґрунту гербіцид після внесення необхідно заробити легкими або середніми бородами.

**КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:**

II клас (помірнотоксичний). Безпечний для бджіл. Малотоксичний для риби.


**ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:**

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

**ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:**

Від +1°C до +35°C

|                                                                                   |                                                   |                                                                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Оптимальні температурні умови застосування</b> |  | <b>Приготування робочого розчину</b>                                                                  |
|                                                                                   | Від +10°C до +25°C                                |                                                                                   | 200-400 л/га. Робочий розчин препарату необхідно використати протягом 24 годин з моменту приготування |
|   | <b>Погодні умови в період застосування</b>        |  | <b>Погодні умови в період застосування</b>                                                            |
|                                                                                   | Оптимальні умови для внесення - після дощу        |                                                                                   | Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше ніж 3-4 м/с                           |



## СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

| Культура                                            | Спосіб внесення                                                                        | Бур'яни                                     | Норми внесення, л/га |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Морква                                              | Обприскування ґрунту до висівання, до сходів або у фазі 2 справжніх листків культури   |                                             | 2,0-3,0              |
| Коріандр                                            | Обприскування ґрунту до висівання, до сходів або у фазі 2-3 справжніх листків культури |                                             | 3,0-4,0              |
| Горох на зерно, соя, часник, чина (на кормові цілі) | Обприскування ґрунту до сходів культури                                                | Однорічні двосім'ядольні та злакові бур'яни | 3,0-5,0              |
| Горох овочевий                                      | Обприскування ґрунту до сходів культури                                                |                                             | 2,0                  |
| Квасоля, кріп                                       | Обприскування ґрунту до сходів культури (протягом 2-5 діб після висівання)             |                                             | 3,0-4,0              |
| Петрушка                                            | Обприскування ґрунту до сходів культури                                                |                                             | 4,0                  |

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту селери, віки, кормових бобів.

**ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:**

- Рейтар, КС (2 л/га) + Екстрем, КЕ (2 л/га)
- Рейтар, КС (2 л/га) + Тайфун, КЕ (1,5 л/га)
- Рейтар, КС (2 л/га) + Пропозит, КЕ (2 л/га)