



Standard
Стандартна серія

Тайфун, КЕ

ГРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ, ЦУКРОВОГО БУРЯКУ, СОНЯШНИКУ ТА РІПАКУ ВІД ЗЛАКОВИХ ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: метолахлор, 960 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ: 20 л пластикова канистра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Відсутність фітотоксичності
- Тривала захисна дія
- Проникнення в стеблові частини проростків

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина ґрунтового гербіциду Тайфун, КЕ відзначається високою гербіцидною активністю по відношенню до однорічних злакових та деяких двосім'ядольних бур'янів. Метолахлор діє на проростаючі бур'яни. Діюча речовина препарату проникає переважно у тканини шилець, активно гальмує розвиток і поділ клітин через порушення ліпідного обміну. В результаті дії метолахлору проростки бур'янів призупиняють ріст і розвиток та гинуть.

СПЕКТР ДІЇ ПРЕПАРАТУ ГЕРБІЦИДУ ТАЙФУН, КЕ:

Чутливі бур'яни: просо (види), мишій сизий, мишій зелений, мишій мутувчатий, пальчатка кровоспиняюча, пальчатка горизонтальна, тонконіг однорічний, зірочник середній, плоскуха звичайна, галінсога дрібноквіткова.

Помірно чутливі бур'яни: щиряца біла, щиряца жминдовидна, щиряца звичайна, грицики звичайні, портулак городній, гумай (сорго алепське).

ГРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД ТАЙФУН, КЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Бур'яни	Норма внесення, л/га
Кукурудза	Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури	Однорічні злакові та деякі двосім'ядольні	1,6-2,1
Соняшник			1,6-2,6
Цукровий буряк			
Ріпак			

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ТАЙФУН, КЕ:

Від яких факторів залежить ефективність дії гербіциду Тайфун, КЕ?

При внесенні препарату ґрунт має бути оброблений згідно з рекомендаціями і бути зволоженим, дрібногрудкуватим, з ретельно подрібненими рослинними рештками. Після внесення гербіцид відразу необхідно заробити середніми або легкими бородами. В разі існування загрози підсушування ґрунту доцільно провести коткування для його ущільнення.

Як визначити необхідну норму внесення гербіциду Тайфун, КЕ?

Як визначити необхідну норму внесення гербіциду Тайфун, КЕ?

Норма витрати препарату регулюється залежно від типу ґрунтів та їх механічного складу. Так, мінімальна норма витрати застосовується на малогумусних та легких за механічним складом ґрунтах, середня - на суглинкових, із вмістом гумусу менше 4%, підвищена - на суглинкових і важких, із вмістом гумусу 4-5% та торф'яних.



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ТАЙФУН, КЕ:

Чи зміниться ефективність гербіциду Тайфун, КЕ при високому рівні забур'яненості?

Слід пам'ятати, що при прогнозуванні великої кількості сходів гірчиці польової, амброзії полинолистої, чорнощирю нетребилистого, пасльону чорного, редьки дикої, видів гірчаків і щириці, грициків звичайних, портулака городнього, гумаю (сорго алепське) та падалиці попередньої культури гербіцидний ефект від застосування препарату може не перевищити 70%, особливо за умов посухи. В зв'язку з цим необхідно планувати додаткові заходи щодо захисту посівів від цих бур'янів.

Як застосовувати гербіцид в умовах недостатнього зволоження ґрунту?

В умовах посухи для підсилення гербіцидного ефекту гербіцид доцільно вносити під передпосівну культивуацію на глибину 5 см. Якщо препарат вноситься після сівби, то після заробки гербіциду бородами необхідно провести коткування для ущільнення ґрунту.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1 °C до +35 °C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Оптимальні умови для внесення препарату - після випадання дощу або зрошення нормою 10-20 мм		Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТИВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб внесення	Бур'яни	Норма внесення, л/га
Сорго	Обприскування ґрунту до висівання або до сходів культури (у зонах недостатнього зволоження - із загортанням), обприскування в фазу 3-5 листків культури. Обов'язковою умовою застосування є обробка насіння сорго антидотом.		1,6-2,0
Горох	Обприскування ґрунту до висівання або до сходів культури (у зонах недостатнього зволоження - із загортанням)		1,6
Картопля	Обприскування ґрунту до посадки, але до появи сходів культури	Однорічні злакові та деякі двосім'ядольні	1,6
Кавуни	Обприскування ґрунту до висівання або до сходів культури (у зонах недостатнього зволоження - із загортанням на глибину не більше 5 см.)		1,6-2,1
Томати (розсадні), капуста(розсадна)	Обприскування ґрунту до висаджування розсади		1,6
Томати безрозсадні	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури		1,2
Картопля	Обприскування ґрунту після посадки, але до сходів культури		1,6-2,1
Соя	Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури		1,1-2,0

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту буряка столового, тютюну.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Соняшник, кукурудза: Тайфун, КЕ (1,5 л/га) + Рейтар, КС (2,0 л/га)