



Standard
Стандартна серія

Юпітер, РК

**ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ
ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ ТА ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ У
ПОСІВАХ ГОРОХУ ТА СОЇ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: імазетапір, 100 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ: 10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Одна обробка за сезон
- Тривала дія
- Застосування до сходів культури або по вегетації
- Широкий діапазон температур

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гербіциду поглинається коренями та листками рослин, переміщується по флоемі та ксилемі і накопичується в меристематичних тканинах. Імазетапір знижує активність ферментів ацетолактатсинтетази та ацетогідроксилази з подальшим порушенням синтезу валіну, лейцину та ізолейцину, порушення синтезу ДНК, що призводить до зупинки поділу клітин та росту рослин.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ЮПІТЕР, РК:

Гербіцид використовується для пригнічення та знищення широкого спектру злакових та двосім'ядольних бур'янів.



Злакові:

- мишій зелений
- пальчатка кровоспиняюча
- пальчатка лінійна
- плоскуха звичайна
- просо посівне
- сить бульбоносна
- сить істівна
- гумай (сорго алепське)

Двосім'ядольні

- амброзія полинолиста
- галінсога дрібноквіткова
- гірчак березко видний
- гірчиця (види)
- гречка посівна
- грицики звичайні
- дурман звичайний
- зірочник середній
- кропива глуха
- кропива дводонна
- кучерявець Софії
- лобода (види)
- молочай болотний
- молочай плямистий
- нетреба звичайна
- осот польовий
- паслін чорний
- підмаренник чіпкий
- повитиця польова
- портулак городній
- редька дика
- рутка лікарська
- соняшник однорічний
- суріпиця звичайна
- сухоребрик
- талабан польовий
- хрінниця віржинська
- хрінниця польова
- чорнощір звичайний
- щавель горобиний
- щавель кучерявий
- щиріця (види)
- якірці сланкі

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦИД ЮПІТЕР, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га
Соя	Злакові та однорічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, до появи сходів або по сходях у фазі 2-3 справжні листки	0,5-1,0
Горох			0,5 - 0,75

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЮПІТЕР, РК:

Як правильно провести обробку препаратом Юпітер, РК при досходовому застосуванні?

При досходовому застосуванні препарату можна провести обробку шляхом наземного обприскування до або після посіву культури. Передпосівна обробка препаратом здійснюється у добре оброблений ґрунт з загортанням у шар до 6 см під культивуацію. Післяпосівна обробка проводиться протягом 2-3 днів після посіву культури.

Від чого залежить ефективність дії гербіциду Юпітер, РК?

Слід пам'ятати, що ефективність гербіцидної обробки залежатиме від чисельності та видового складу бур'янів, стану посівів культурних рослин; обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясне змочування рослин під час проведення внесення препарату. Застосовувати препарат тільки за рекомендаціями. Обробку посівів проводити своєчасно в ранні фази розвитку бур'янів (до 4 справжніх листків). Для збереження «гербіцидного екрану» не проводити міжрядних культивацій протягом 2-3 тижнів після обробки.

Який період захисної дії препарату?

Препарат ефективний впродовж всього вегетаційного періоду за відсутності другої хвилі бур'янів.

Яка швидкість дії гербіциду Юпітер, РК?

Гербіцид починає діяти відразу після внесення, відмирання рослин відбувається в період від 2 до 8 тижнів.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Культури, які можна вирощувати в наступному році на площах, де раніше застосовувався гербіцид Юпітер, РК:

Після збирання врожаю та глибокого обробітку ґрунту можна сіяти такі культури: бобові, люцерну, конюшину, озиму пшеницю, жито, яру пшеницю, кукурудзу; через 1,5 року після обробки препаратом – соя, картоплю, жито, овочеві культури та однорічні трави; через 2 роки після обробки – цукровий та кормовий буряк, озимий та ярий ріпак.

Після застосування гербіциду не можна вносити препарати з групи сульфонілсечовин та імідазолінів протягом всієї вегетації культур і навіть пізньої осені. Не можна застосовувати у бакових сумішах з протизлаковими гербіцидами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Малотоксичний для ссавців, риб і бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 2 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Умовою ефективної дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 6 годин. У дні з високою температурою обприскування бажано проводити у вечірні години або вранці.		Не проводити внесення при швидкості вітру понад 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТИВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га
Люцерна (безпокровна)	Злакові та однорічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, до появи сходів культури або після появи сходів у фазі 1-2 трійчастих листків культури. Або через 7-10 днів після першого покошу (не частіше 1 раз у 3 роки на одному полі).	1,0
Люпин		Обприскування посівів у фазі 2-3 справжніх листків	0,4 - 0,5
Соняшник (гібриди, стійкі до гербіцидів групи імідазолинонів)		2-3 пари справжніх листків культури	0,8 - 1,0

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Соя: Юпітер, РК (0,5 л/га) + Ефес, РК (1,5 л/га)