



# Дестрой, КС

**СИСТЕМНИЙ ІНСЕКТИЦИД  
КОНТАКТНО-ШЛУНКОВОЇ ДІЇ  
ДЛЯ БОРОТЬБИ З ШИРОКИМ  
СПЕКТРОМ ШКІДНИКІВ**

## ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

імідаклоприд, 250 г/л+лямбда-цигалотрин, 80 г/л

**ФОРМУЛЯЦІЯ:** концентрат суспензії

**УПАКУВАННЯ:** 1 л пластикова пляшка, 5л пластикова каністра

## ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока швидкість дії
- Тривалий захисний період
- Репелентний ефект
- Відсутність резистентності шкідників до препарату
- Ефективна дія навіть від +10°C

## МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Системний інсектицид контактно-шлункової дії для боротьби з широким спектром шкідників на пшениці, ріпаку та яблуні.

Одна з діючих речовин імідаклоприд швидко поглинається рослинами та переноситься по них акропетально. Імідаклоприд діє як антагоніст постсинаптичних нікотинових рецепторів, з наступним руйнуванням центральної нервової системи комах. Діюча речовина лямбда-цигалотрин належить до класу синтетичних піретроїдів. Лямбда-цигалотрин має контактно-кишкову дію та репелентні властивості. При потраплянні в організм шкідників впливає на нервову систему, порушуючи діяльність нейронів шляхом взаємодії з натрієвим каналом. Симптоми дії проявляються у вигляді сильного збудження нервової системи, судом кінцівок, з наступним паралічем та загибеллю комах.

## ДЕСТРОЙ, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

| Культура             | Шкідник                                                           | Норма витрати препарату, л/га | Шкідливі об'єкти                 | Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів | Максимальна кратність обробок |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Пшениця озима        | Клоп шкідлива черепашка, трипси, п'явиці, попелиці                | 0,1-0,15                      | Обприскування в період вегетації | 30                                               | 1                             |
| Ріпак ярий та озимий | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, попелиці                  | 0,1-0,15                      |                                  | 30                                               | 1                             |
| Яблуня               | Яблунева плодожерка, листовійки, каліфорнійська щитівка, попелиці | 0,1                           |                                  | 30                                               | 2                             |

Проведення механізованих робіт - 4 доби, ручних робіт - 10 діб.



## ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДЕСТРОЙ, КС:

### У чому полягає унікальність цього препарату?

Поєднання у препараті системної та контактної діючих речовин з різних хімічних родин дозволяє:

- значно розширити спектр дії проти шкідників
- забезпечити довготривалий захисний ефект і одночасно скоротити строк очікування після внесення препарату
- уникнути резистентності шкідників до препарату

### Чи впливає температура та вологість повітря на ефективність препарату?

Інсектицид застосовується у широкому інтервалі температур та вологості повітря.

Для виявлення системних властивостей препарату температура має бути не менше +10 °C

### Чи має інсектицид фітотоксичну дію?

За умов дотримання регламентів та норм застосування препарату проявів фітотоксичності не спостерігається.

Чи можна використовувати препарат у бакових сумішах з іншими препаратами?

Препарат сумісний з більшістю препаратів, проте перед приготуванням бакової суміші необхідно провести пробне змішування. Бакову суміш слід використовувати відразу після приготування.

### КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

II клас небезпечності (малотоксичний). Препарат токсичний для бджіл.

### ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки при дотриманні умов зберігання. від дати виготовлення.

### ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +5°C до +25°C



|                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Оптимальні температурні умови застосування</b><br>Від +10°C до +25°C                                                  |  | <b>Приготування робочого розчину</b><br>- на польових культурах: 200-400 л/га<br>- у яблуневих садах: 800-1000 л/га |
|  | <b>Наявність вітру в період застосування</b><br>Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3-4 м/с |                                                                                   |                                                                                                                     |

### СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Препарати з аналогічними діючими речовинами використовують для захисту сої, кукурудзи, цукрових буряків, виноградників, картоплі, томатів, гороху, капусти, сорго, соняшнику.



Колорадський жук



Зелена яблунева попелиця



Клоп шкідлива черепашка



Ріпаковий квіткоїд