



Agrosfera ®

Вибір розумних рішень

КАТАЛОГ – 2019

ГІБРИДІВ

СОНЯШНИКУ ТА КУКУРУДЗИ



ЗМІСТ

СОНЯШНИК

AGS 103 HO	ТМ Агросфера ЛТД	(вегетаційний період 98 дн.)	2
AGS 104 OR	ТМ Агросфера ЛТД	(вегетаційний період 100 дн.)	3
AGS 101 OR	ТМ Агросфера ЛТД	(вегетаційний період 101 дн.)	4
AGS 102 CL	ТМ Агросфера ЛТД	(вегетаційний період 101 дн.)	5
AGS 106 SU OR	ТМ Агросфера ЛТД	(вегетаційний період 101 дн.)	6
AGS 107 SU OR	ТМ Агросфера ЛТД	(вегетаційний період 104 дн.)	7
НС СУМО 2017	Нові Сад	(вегетаційний період 107 дн.)	8
AGS 105 CL	ТМ Агросфера ЛТД	(вегетаційний період 110 дн.)	9

 **HO** – високо олеїновий гібрид  **Clearfield** Production System for Sunflower **CL** – технологія вирощування  **OR** - стійкий до вовчка

КУКУРУДЗА

AGS 501	ТМ Агросфера ЛТД	(ФАО 210)	10
AGS 502	ТМ Агросфера ЛТД	(ФАО 250)	11
Корунд ДН	ІСГСЗ НААН	(ФАО 250)	12
Білозірський 295 СВ	ІСГСЗ НААН	(ФАО 290)	13
Подільський 274 СВ	ІСГСЗ НААН	(ФАО 290)	14
AGS 503	ТМ Агросфера ЛТД	(ФАО 300)	15
Солонянський 298 СВ	ІСГСЗ НААН	(ФАО 310)	16
AGS 504	ТМ Агросфера ЛТД	(ФАО 320)	17
Акватор ДН	ІСГСЗ НААН	(ФАО 320)	18
AGS 505	ТМ Агросфера ЛТД	(ФАО 340)	19

Зони вирощування.....	20-21
-----------------------	-------

СОНЯШНИК **AGS 103 НО**

Найменування

Оригігатор
Тип
Стиглість
Особливості
Потенційна врожайність ц/га
Веgetаційний період
Олійність
Висота рослини

AGS 103 НО

Аспрія Сідс для Агросфера ЛТД
простий
надранній
високоолеїновий гібрид
52
98 днів
50%
155 сантиметрів



Рекомендована норма висіву
(тисяч зерен/га)

50-55 для посушливих зон
60-65 для зон достатнього зволоження
65-70 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок (за допомогою IMI)					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Стійкий до вовчка
- Висока олійність
- Добре адаптується до північних зон
- Дуже високий потенціал

СОНЯШНИК **AGS 104 OR**

Найменування

Оригігатор
Тип
Стиглість
Особливості
Потенційна врожайність ц/га
Веґетаційний період
Олійність
Висота рослини

AGS 104 OR

Аспрія Сідс для Аґросфера ЛТД
простий
середньоранній
стійкий до вовчка OR 7
52
100 днів
50%
150 сантиметрів



Рекомендована норма висіву
(тисяч зерен/га)

50-55 для посушливих зон
60-65 для зон достатнього зволоження
65-70 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Стійкий до водного стресу
- Висока олійність
- Добре адаптується до північних зон

СОНЯШНИК **AGS 101 OR**



Найменування

Оригігатор
Тип
Стиглість
Особливості
Потенційна врожайність ц/га
Вегетаційний період
Олійність
Висота рослини

AGS 101 OR

Аспрія Сідс для Агросфера ЛТД
простий
ранньостиглий
стійкий до вовчка OR 7
54
101 день
54%
165 сантиметрів

Рекомендована норма висіву
(тисяч зерен/га)
50-55 для посушливих зон
60-65 для зон достатнього зволоження
65-70 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Висока олійність
- Дуже високий потенціал
- Добре адаптується до північних

СОНЯШНИК **AGS 102 CL**



Найменування

AGS 102 CL

Оригігатор
Тип
Стиглість
Особливості
Потенційна врожайність ц/га
Веґетаційний період
Олійність
Висота рослини

Аспрія Сідс для Аґросфера ЛТД
простий
ранньостиглий
ClearField гібрид стійкий до імідазолінонів
53
101 день
50%
150 сантиметрів



Рекомендована норма висіву
(тисяч зерен/га)

50-55 для посушливих зон
60-65 для зон достатнього зволоження
65-70 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок (за допомогою IMI)					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Стійкий до вовчка - 9 (IMI)
- Висока енергія росту на початок періоду
- Висока олійність
- Висока стійкість до грибкових хвороб
- Добре адаптується до північних зон

СОНЯШНИК **AGS 106 SU OR**



Найменування

Оригіатор

Тип

Стиглість

Особливості

Потенційна врожайність ц/га

Вегетаційний період

Олійність

Висота рослини

Рекомендована норма висіву

(тисяч зерен/га)

AGS 106 SU OR

Аспрія Сідс для Агросфера ЛТД

простий

ранньостиглий

Стійкий до гербіцидів з д.р. трибенурон-метил (Меркурій)

стійкий до вовчка OR 5

52

101 день

50%

165 сантиметрів

50-55 для посушливих зон

60-65 для зон достатнього зволоження

65-70 для зрошення



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Висока олійність
- Високий потенціал
- Висока стійкість до грибних хвороб
- Добре адаптується до північних зон

СОНЯШНИК **AGS 107 SU OR**



Найменування

Оригігатор

Тип

Стиглість

Особливості

Потенційна врожайність ц/га

Вегетаційний період

Олійність

Висота рослини

Рекомендована норма висіву

(тисяч зерен/га)

AGS 107 SU OR

Аспрія Сідс для Агросфера ЛТД

простий

середньоранній

Стійкий до гербіцидів з д.р. трибенурон-метил (Меркурій)

стійкий до вовчка OR 6

52

104 дні

52%

165 сантиметрів

50-55 для посушливих зон

60-65 для зон достатнього зволоження

65-70 для зрошення



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Висока олійність
- Високий потенціал
- Висока стійкість до грибних хвороб
- Добре адаптується до північних зон

СОНЯШНИК **НС СУМО 2017**

Найменування

Оригігатор

Тип

Стиглість

Особливості

Потенційна врожайність ц/га

Вегетаційний період

Олійність

Висота рослини

Рекомендована норма висіву
(тисяч зерен/га)

НС СУМО 2017

Нові Сад

простий

середньоранній

Стійкий до гербіцидів з д.р. трибенурон-метил (Меркурій)

45

103-107 днів

50%

170 сантиметрів

55-60 для посушливих зон

60-65 для зон достатнього зволоження

65-70 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Висока олійність
- Стійкий до вовчка - OR7
- Стійкий до водного стресу

СОНЯШНИК **AGS 105 CL**

Найменування

AGS 105 CL

Оригігатор

Аспрія Сідс для Агросфера ЛТД

Тип

простий

Стиглість

середньоранній

Особливості

ClearField гібрид стійкий до імідазолінонів

Потенційна врожайність ц/га

52

Веgetаційний період

110 днів

Олійність

51%

Висота рослини

160 сантиметрів



Рекомендована норма висіву
(тисяч зерен/га)

50-55 для посушливих зон
60-65 для зон достатнього зволоження
65-70 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок (за допомогою IMI)					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Висока олійність
- Високий потенціал
- Висока стійкість до грибних хвороб

КУКУРУДЗА **AGS 501**

Найменування

Оригігатор
Тип
Зерно
Потенційна врожайність ц/га
ФАО
Стиглість
Рядів у качані
Зерен у ряду
Висота рослини
Висота кріплення качана
Напрямок використання

AGS 501

Аспрія Сідс для Агросфера ЛТД
трёхлінійний
кременисто-зубоподібне
130
210
дуже ранній
14
38
235 сантиметрів
75 сантиметрів
зерно, силос, карнаж
70-80 для посушливих зон
90-100 для зон достатнього зволоження
100-110 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння 830
Силос (32% сухої речовини) 1405
Зерно (35% вологи) 1605

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспоріозу					

ПЕРЕВАГИ ГИБРИДУ

- Висока виповненність качана

КУКУРУДЗА **AGS 502**

Найменування

Оригігатор
Тип
Зерно
Потенційна врожайність ц/га
ФАО
Стиглість
Рядів у качані
Зерен у ряду
Висота рослини
Висота кріплення качана
Напрямок використання

AGS 502

Аспрія Сідс для Агросфера ЛТД
трёхлінійний
зубоподібне
145
250
середньоранній
14-16
44
240 сантиметрів
50 сантиметрів
зерно, силос, карнаж
70-80 для посушливих зон
80-90 для зон достатнього зволоження
90-100 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння 880
Силос (32% сухої речовини) 1500
Зерно (35% вологи) 1660

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГИБРИДУ

- Високий потенціал

КУКУРУДЗА **КОРУНД ДН**

Найменування

Оригігатор

Тип

Зерно

Потенційна врожайність ц/га

ФАО

Стиглість

Рядів у качані

Зерен у ряду

Висота рослини

Висота кріплення качана

Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)

КОРУНД ДН

Інститут сільського господарства степової зони

Національної Академії аграрних наук України

трёхлінійний

зубоподібне

130

250

середньоранній

16

32

250 сантиметрів

90 сантиметрів

70-80 для посушливих зон

80-90 для зон достатнього зволоження

90-100 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння

890

Силос (32% сухої речовини)

1510

Зерно (35% вологи)

1740

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспоріозу					

ПЕРЕВАГИ ГИБРИДУ

- Відносно скоростиглий
- Швидкий початковий розвиток
- Швидке зневоднення

КУКУРУДЗА **БІЛОЗІРСЬКИЙ 295 СВ**

Найменування

Оригіатор

Тип

Зерно

Потенційна врожайність ц/га

ФАО

Стиглість

Рядів у качані

Зерен у ряду

Висота рослини

Висота кріплення качана

Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)

БІЛОЗІРСЬКИЙ 295 СВ

Інститут сільського господарства степової зони

Національної Академії аграрних наук України

трёхлінійний

зубоподібне

130

290

середньоранній

16

36

270-280 сантиметрів

105-115 сантиметрів

45-50 для посушливих зон

65-70 для зон достатнього зволоження

70-75 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологи)	1740

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посуhostійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГИБРИДУ

- Швидкий початковий розвиток
- Швидке зневоднення

КУКУРУДЗА ПОДІЛЬСЬКИЙ 274 СВ

Найменування

Оригігатор

Тип

Зерно

Потенційна врожайність ц/га

ФАО

Стиглість

Рядів у качані

Зерен у ряду

Висота рослини

Висота кріплення качана

Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)

ПОДІЛЬСЬКИЙ 274 СВ

Інститут сільського господарства степової зони

Національної Академії аграрних наук України

простий

зубоподібне

125

290

середньоранній

16

37

240-250 сантиметрів

100-105 сантиметрів

45-50 для посушливих зон

70-75 для зон достатнього зволоження

75-80 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологи)	1740

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспоріозу					

ПЕРЕВАГИ ГИБРИДУ

- Дуже стійкий при перестой і може використовуватись для зимового збирання
- Найбільш посухостійкий гібрид з високою врожайністю в степу України
- Відносно скоростиглий
- Швидкий початковий розвиток
- Швидке зневоднення

КУКУРУДЗА **AGS 503**

Найменування

Оригігатор
Тип
Зерно
Потенційна врожайність ц/га
ФАО
Стиглість
Рядів у качані
Зерен у ряду
Висота рослини
Висота кріплення качана
Напрямок використання

AGS 503

Аспрія Сідс для Агросфера ЛТД
трёхлінійний
зубоподібне
163
300
середньостиглий
16
43
240 сантиметрів
65 сантиметрів
зерно, силос, карнаж
70-80 для посушливих зон
90-100 для зон достатнього зволоження
100-110 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння 895
Силос (32% сухої речовини) 1560
Зерно (35% вологи) 1710

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Високорослий гібрид
- Розвинений габітус
- Добрий стан стебла у кінці цикла

КУКУРУДЗА СОЛОНЯНСЬКИЙ 298 СВ

Найменування

Оригігатор

Тип

Зерно

Потенційна врожайність ц/га

ФАО

Стиглість

Рядів у качані

Зерен у ряду

Висота рослини

Висота кріплення качана

Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)

СОЛОНЯНСЬКИЙ 298 СВ

Інститут сільського господарства степової зони

Національної Академії аграрних наук України

трёхлінійний

зубоподібне

120

310

середньостиглий

16

36

250-260 сантиметрів

80-90 сантиметрів

45-50 для посушливих зон

70-75 для зон достатнього зволоження

75-80 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологи)	1740

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГИБРИДУ

- Найбільш розповсюджений гібрид вітчизняної селекції
- Швидке зневоднення
- Національний стандарт в офіційному сортовипробуванні України
- Швидкий початковий розвиток

КУКУРУДЗА **AGS 504**

Найменування

Оригігатор
Тип
Зерно
Потенційна врожайність ц/га
ФАО
Стиглість
Рядів у качані
Зерен у ряду
Висота рослини
Висота кріплення качана
Напрямок використання

AGS 504

Аспрія Сідс для Агросфера ЛТД
трёхлінійний
зубоподібне
150
320
середньостиглий
16
32
240 сантиметрів
70 сантиметрів
зерно, силос, карнаж
70-80 для посушливих зон
80-90 для зон достатнього зволоження
90-100 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння 895
Силос (32% сухої речовини) 1510
Зерно (35% вологи) 1710

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посуhostійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГИБРИДУ

- Високий потенціал

КУКУРУДЗА АКВОЗОР ДН

Найменування

Оригіатор

Тип

Зерно

Потенційна врожайність ц/га

ФАО

Стиглість

Рядів у качані

Зерен у ряду

Висота рослини

Висота кріплення качана

Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)

АКВОЗОР ДН

Інститут сільського господарства степової зони

Національної Академії аграрних наук України

простий

зубоподібне

130

320

середньостиглий

16

40-45

205-215 сантиметрів

80-90 сантиметрів

70-80 для посушливих зон

80-90 для зон достатнього зволоження

90-100 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологи)	1740

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГИБРИДУ

- Низька збиральна вологість зерна
- Відносно скоростиглий
- Швидке зневоднення
- Швидкий початковий розвиток

КУКУРУДЗА **AGS 505**

Найменування

Оригіатор
Тип
Зерно
Потенційна врожайність ц/га
ФАО
Стиглість
Рядів у качані
Зерен у ряду
Висота рослини
Висота кріплення качана
Напрямок використання

AGS 505

Аспрія Сідс для Агросфера ЛТД
простий
кременисто-зубоподібне
154
340
середньостиглий
16
32
260 сантиметрів
100 сантиметрів
зерно, силос, карнаж
70-80 для посушливих зон
80-90 для зон достатнього зволоження
90-100 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння 890
Силос (32% сухої речовини) 1510
Зерно (35% вологи) 1740

АГРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Середньорослий гібрид
- Висока невибагливість
- Добрий стан стебла у кінці цикла

Рекомендації щодо зон вирощування

Культура	Назва гібриду	Оригіатор	Вегетаційний період / дні	Вінницька	Дніпропетровська	Донецька	Житомирська	Запорізька	Київська	Кіровоградська	Луганська	Львівська	Миколаївська	Одеська	Полтавська	Рівненська	Сумська	Тернопільська	Харківська	Херсонська	Хмельницька	Черкаська	Чернівецька	Чернігівська
СОНЯШНИК	AGS 103 HO	Аспрія Сідс	98																					
	AGS 104 OR	Аспрія Сідс	100																					
	AGS 101 OR	Аспрія Сідс	101																					
	AGS 102 CL	Аспрія Сідс	101																					
	AGS 106 SU OR	Аспрія Сідс	101																					
	AGS 107 SU OR	Аспрія Сідс	104																					
	AGS 105 CL	Аспрія Сідс	110																					

Рекомендації щодо зон вирощування

Культура	Назва гібриду	Оригіатор	ФАО	Вінницька	Дніпропетровська	Донецька	Житомирська	Запорізька	Київська	Кіровоградська	Луганська	Львівська	Миколаївська	Одеська	Полтавська	Рівненська	Сумська	Тернопільська	Харківська	Херсонська	Хмельницька	Черкаська	Чернівецька	Чернігівська
КУКУРУДЗА	AGS 501	Аспрія Сідс	210																					
	AGS 502	Аспрія Сідс	250																					
	AGS 503	Аспрія Сідс	300																					
	AGS 504	Аспрія Сідс	320																					
	AGS 505	Аспрія Сідс	340																					

Телефони представництв:

• Дніпропетровська обл.	(067) 635 15 94
• Вінницька обл.	(067) 634 89 56
• Житомирська обл.	(067) 635 02 48
• Запорізька обл.	(067) 635 14 42
• Київська обл.	(067) 841 61 51
• Кіровоградська обл.	(067) 635 14 89
• Миколаївська обл.	(067) 635 08 61
• Херсонська обл.	(067) 635 02 40
• Одеська обл.	(067) 635 01 46
• Полтавська обл.	(067) 635 89 26
• Сумська обл.	(067) 635 24 84
• Харківська обл.	(067) 635 24 84
• Хмельницька обл.	(067) 635 02 48
• Черкаська обл.	(067) 635 12 97
• Чернігівська обл.	(067) 560 85 16

Call-center: 0 800 20 42 42
(безкоштовні дзвінки)