

Препарати 2019

Agrosfera®



Представник компанії:

Контактний телефон:

Засоби захисту рослин. Регулятори росту. Мікродобрива. Посівний матеріал.



Професійна серія



Унікальні препарати



Стандартна серія

Замовляй онлайн:

Безкоштовний дзвінок

0 800 20 42 42

www.agrosfera.ua



Галеон®, ТН



ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ФУНГІЦИДНИЙ ПРОТРУЙНИК НА ОСНОВІ ДВОХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА СОЇ ВІД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
дифеноконазол, 92 г/л +
азоксистробін, 27 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, який тече,
для обробки насіння

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова каністра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Строк обробки	Збудники хвороб	Норма витрати, л/т насіння
Пшениця	Протруювання насіння до висівання	Летюча і тверда сажки, гелмінтоспоріозна, фузаріозна і пітіозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз	0,55-0,75
Ячмінь		Летюча і кам'яна сажка, гелмінтоспоріозна, фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз, темно-бура плямистість	
Соя		Фузаріоз, аскохітоз, антракноз, сіра гниль, пероноспороз, фузаріозна коренева гниль, пліснявіння насіння	



Standard
Стандартна серія

Гранівіт®, ТН



УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОТРУЙНИК НАСІННЯ ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА КУКУРУДЗИ ВІД ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
карбоксин, 200 г/л +
тирам, 200 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, який тече, для
обробки насіння

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова каністра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Строк обробки	Збудники хвороб	Норми витрати, л/т насіння
Пшениця, ячмінь	Протруювання насіння до висівання	Тверда та летюча сажки, комплекс збудників кореневих гнилей, пліснявіння сходів	2,5-3,0
Кукурудза	Протруювання насіння до висівання	Пухирчаста та летюча сажки, комплекс збудників кореневих і стеблових гнилей, пліснявіння	2,5-3,0

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Строк обробки	Збудники хвороб	Норми витрати, л/т насіння
Жито	Протруювання насіння до висівання	Летюча, стеблова сажки, кореневі гнилі, снігова пліснява	2,5-3,0
Ріпак		Пліснявіння насіння, альтернативний, коренева гниль	2,0-3,0
Льон-довгунець		Антракноз, плямистості	1,5-2,0
Горох		Кореневі гнилі	2,5



Standard
Стандартна серія

Ін Сет® SC, КС



ПРОТРУЙНИК КОНТАКТНО-СИСТЕМОЇ ДІЇ ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ПРОТРУЄННЯ НАСІННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імідаклоприд, 600 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова каністра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідники	Норма витрати, л/т насіння	Строки застосування
Кукурудза	Дротяники, шведська муха	3,5-6,0	Обробка насіння перед висіванням
Соняшник	Дротяники	4,0-7,0	
Пшениця	Злакові мухи, совки, цикадки	0,3-1,0	
Пшениця	Хлібна жужелиця	1,0-1,5	
Ріпак	Хрестоцвітні білшки та ґрунтові шкідники	3,0-4,0	

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідники	Норма витрати, л/т	Максимальна кратність обробок
Картопля	Обприскування бульб до висадки	Колорадський жук	0,2	1



Standard
Стандартна серія

Ін Сет®, ВГ



ПРОТРУЙНИК НАСІННЯ КОНТАКТНО-СИСТЕМОЇ ДІЇ ПРОТИ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ШКІДНИКІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імідаклоприд, 700 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:
гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:
1 кг фольгований пакет
(10 пакетиків по 100 г)

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідники	Норма витрати, л/т насіння	Строки застосування
Кукурудза	Дротяники, шведська муха	3,0-4,5	Обробка насіння перед висіванням
Соняшник	Дротяники	3,5-5,5	
Пшениця	Злакові мухи, совки, цикадки	0,25-0,6	
Пшениця	Хлібна жужелиця	0,6-0,75	
Ріпак	Хрестоцвітні білшки та ґрунтові шкідники	2,5-3,5	

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідники	Норма витрати, л/т	Максимальна кратність обробок
Картопля	Обприскування бульб до висадки	Колорадський жук	0,2	1

Протруйники насіння



Standard
Стандартна серія

Кольчуга Плюс®, ТН

**ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ
ФУНГІЦИДНИЙ ПРОТРУЙНИК
НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ
ВІД ШИРОКОГО СПЕКТРА
ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
тебуконазол, 120 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, який тече,
для обробки насіння

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Строк обробки	Збудники хвороб	Норма витрати, л/т насіння
Пшениця озима та яра, ячмінь ярий	Протруювання насіння до висівання	Тверда та летюча сажки, комплекс збудників кореневих гнилей, септоріоз	0,2-0,25

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ:



Буря (листова) іржа Обфобольозна коренева гниль Корончата іржа Летюча сажка пшениці Борошниста роса ячменю Карликова іржа ячменю Борошниста роса пшениці Тверда сажка



Пентафорс® 322 FS, ТН

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати, л/т
Пшениця озима	Комплекс насінневих та ґрунтових збудників хвороб: сажки, пліснявіння насіння, кореневі гнилі, септоріоз, листові іржі, борошниста роса. Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників посівів: дрітляники, совка озима, турун хлібний, злакові мухи, білшики, цикадки, попелиці	1,5-2,0
Ячмінь ярий	Комплекс насінневих та ґрунтових збудників хвороб: сажки, пліснявіння насіння, кореневі гнилі, септоріоз, листові іржі, борошниста роса, плямистість, гельмінтоспоріоз. Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників посівів: дрітляники, совка озима, турун хлібний, злакові мухи, білшики, цикадки, попелиці	1,5-2,0

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ:



Дрітляник Совка підризаюча Попелиці Цикадки Пліснявіння сходів пшениці Летюча сажка пшениці Тверда сажка Борошниста роса пшениці




Томагавк®, ТН

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Строк обробки	Збудники хвороб	Норма витрати, л/т насіння
Пшениця	Протруювання насіння до висівання	Тверда та летюча сажки, гельмінтоспоріоз, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз	0,4-0,5
Ячмінь		Летюча та кам'яна сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста плямистість	0,4-0,5

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ:



Буря (листова) іржа Обфобольозна коренева гниль Корончата іржа Летюча сажка пшениці Борошниста роса ячменю Карликова іржа ячменю Борошниста роса пшениці Тверда сажка



Standard
Стандартна серія

Форсаж®, КС

**СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦИДНИЙ
ПРОТРУЙНИК ЗАХИСНОЇ ТА
ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
карбендазим, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Строк обробки	Збудники хвороб	Норма витрати, л/т насіння
Пшениця та ячмінь	Протруювання насіння до висівання	Кореневі гнилі, снігова пліснява, сажкові хвороби	1,0-1,2
Соняшник		Сіра та біла гнилі, фомоз, пліснявіння	0,8

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Строк обробки	Збудники хвороб	Норма витрати, л/т насіння
Жито, Овес	Протруювання насіння до висівання	Фузаріозно-гельмінтоспоріозна коренева гниль, снігова пліснява, сажкові хвороби	1,5
Картопля	Обприскування бульб до висадки	Суша гниль (фузаріозна), ризоктоніоз	0,08-0,12



Professional
Професійна серія

Аболір®, РГ

**СИСТЕМНИЙ ГЕРБІЦИД
З ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДІЇ.**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
гліфосат, у вигляді амонійної солі, 757 г/кг, у кислотному еквіваленті, 687 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинні гранули

УПАКУВАННЯ:
10 кг фольгований пакет

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ НА КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати, кг/га	Спосіб, час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробок
Пари	Однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	1,5-2,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	1
Поля призначені під посів ярих зернових та олійних культур		1,5-2,0	Обприскування вегетуючих бур'янів восени, після збирання попередника або навесні, за 2 тижні до висівання	
Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження, ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насадки)		1,5-2,0	Обприскування вегетуючих бур'янів	



Professional
Професійна серія

Апач®, ВГ



ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ І БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ (БЕРЕЗКА ПОЛЬОВА, ОСОТИ, АМБРОЗІЯ, ГРІЧКА ТА ІНШІ)

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
дикамби натрієва сіль, 468 г/кг
+ римсульфурон, 25 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:
2,5 кг фольгований пакет
(25 пакетиків по 100 г)

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати, кг/га	Час обробки, обмеження
Кукурудза	Однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	0,4-0,5 кг/га +0,2 л/га ПАР «Флокс»	У фазі 3-5 листків культури

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ У ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ:

- збільшити норму витрати робочого розчину до 300 л/га;
- збільшити норму ПАР Флокс (від 0,3 л/га);
- додати у бакову суміш карбамід (3-5 кг/100 л робочого розчину);
- вносити препарат у вечірній та нічний час.



Standard
Стандартна серія

Вулкан® Плюс, РК

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:



ГЕРБІЦИД СУЦІЛЬНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПОВНОГО ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
гліфосат у формі ізопропіламіної солі, 480 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова канистра

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату, л/га		Максимальна кратність обробок
		наземним устаткуванням	авіацією (літаки АН-2)	
Пари	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2,0-4,0	6,0	1
	Багаторічні бур'яни	4,0-6,0		
Поля, призначені під посіви ярих зернових	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2,0-4,0		
	Багаторічні бур'яни	4,0-6,0		
Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насадження)	Однорічні та багаторічні рослини	3,0-6,0		



Professional
Професійна серія

Гурон®, ВГ

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:



ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ ПРОТИ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: тифен-сульфурон-метил, 375 г/кг + трибенурон-метил, 375 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:
1 кг фольгований пакет
(10 пакетиків по 100 г)

Культура	Норми витрати препарату, г/га	Спосіб, час обробок, обмеження
Пшениця озима, ячмінь озимий	30-40	Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури включно

Рекомендуємо використовувати з ПАР ФЛОКС, РК



Professional
Професійна серія

Деліт®, РК

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:



НЕСЕЛЕКТИВНИЙ ПІСЛЯСХОДОВИЙ ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ БУР'ЯНІВ. ДЕСИКАНТ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
гліфосату калієва сіль, 613 г/л, у кислотному еквіваленті, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова канистра

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату, л/га	Строк обробки до збирання врожаю, діб	Максимальна кратність обробок
Пари	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2,0	-	1
	Багаторічні бур'яни	4,0	-	
Поля, призначені під посіви ярих зернових	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0-4,0	-	
Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насадження)	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0-4,0	-	



Standard
Стандартна серія

Дікам Плюс®, РК

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:



ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ ТА КУКУРУДЗИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксицетова кислота) у формі диметиламіної солі, 344 г/л + дикамба у формі диметиламіної солі, 120 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ: 10 л, 20 л пластикова канистра

Культура	Спосіб, час обробок, обмеження	Шкідливі об'єкти	Норма витрати, л/га
Пшениця	Обприскування посівів навесні від фази куцїння до виходу в трубку культури	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні, у тому числі стійкі до препаратів на основі тільки 2,4-Д та 2М-4Х кислот	0,8
Ячмінь			0,5-0,7
Кукурудза	Обприскування посівів у фазі 3-5 листків		1,5

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб, час обробок, обмеження	Бур'яни	Норма витрати, л/га	Максимальна кратність обробок
Жито	Обприскування посівів навесні від фази куцїння до виходу в трубку культури	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні	0,6-0,8	1
Овес			0,5-0,7	



Standard
Стандартна серія

Екстрем®, КЕ

ГЕРБІЦИД ГРУНТОВИЙ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В
ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ,
СОЛЯНИКУ ТА СОЇ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
ацетохлор, 900 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідливі об'єкти	Норма витрати, л/га
Кукурудза, соняшник, соя	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури	Однорічні злакові та двосім'ядольні, а також проростки багаторічних бур'янів з насіння	1,5-3,0
Землі несільсько-господарського призначення(смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насапи)	Обприскування ґрунту до появи сходів бур'янів. Забороняється випасання худоби та заготівля сіна у зоні 300 м від оброблених територій протягом 15 діб. Забороняється обробка земель несільськогосподарського використання на відстані менше 300 м від місць постійного перебування людей.		3,0



Standard
Стандартна серія

Ефес®, РК

ГЕРБІЦИД КОНТАКТНОЇ
ДІЇ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В
ПОСІВАХ ГОРОХУ ТА СОЇ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
бентазон, 480 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Горох (на насіння)	Однорічні двосім'ядольні	Обприскування посівів в фазу 5-6 листків культури	3,0	1
Соя	Однорічні двосім'ядольні	Обприскування посівів в фазу 1-3 справжніх листків культури	1,5-3,0	



Standard
Стандартна серія

Канцлер®, ВГ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМОЇ
ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ
БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ
ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ
ТА КУКУРУДЗИ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
тифенсульфурон-метил,
750 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:
250 г у пластиковій пляшці

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, г/га	Спосіб, час обробок, обмеження
Пшениця озима	15-20 г/га + ПАР Флокс	Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури включно
Ячмінь ярий	10-15 г/га + ПАР Флокс	Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до виходу в трубку культури
Кукурудза	10 г/га + ПАР Флокс або 15 г/га без ПАР Флокс	У фазі 3-7 листків кукурудзи

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Норма витрати препарату, г/га	Спосіб, час обробок, обмеження
Соя	6-8 г/га+ПАР Флокс, 200 мл/га	Після розкриття першого трійчастого листка до початку бутонізації культури, бур'яни: у фазі 2-4 листки, капустаї до 15см
Льон-довгунець, льон олійний	15-25 г/га	5-12 см (фаза ялинки)



Professional
Професійна серія

Корвет®, КС

ПІСЛЯСХОДОВИЙ СЕЛЕКТИВНИЙ
ГЕРБІЦИД СИСТЕМОЇ ДІЇ
ДЛЯ БОРІТБИ З ОДНОРІЧНИМИ
ТА ДЕЯКИМИ БАГАТОРІЧНИМИ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ БУР'ЯНАМИ
В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ, ТА ЯЧМЕНЮ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
флуметсулам, 100 г/л +
флорасулам, 75 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
500 мл у пластиковій пляшці

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробки, обмеження	Кратність обробок
Пшениця озима та яра	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яни	0,05-0,07	Під час вегетації починаючи від фази кущення до фази прапорцевого листка включно	1
Ячмінь озимий та ярий				

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

Корвет, КС (0,05-0,07 л/га) + Сулам, СЕ (0,1 - 0,2 л/га) – бакова суміш за наявності великої кількості лободи білої.



Standard
Стандартна серія

Крейсер®, ВГ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМОЇ ДІЇ ДЛЯ
БОРІТБИ З ОДНОРІЧНИМИ ТА
БАГАТОРІЧНИМИ ЗЛАКОВИМИ
ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ
БУР'ЯНАМИ



ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
римсульфурон, 250 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:
1 кг фольгований пакет
(20 пакетиків по 50 г)

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, г/га	Спосіб, час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробок
Кукурудза	Однорічні та багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	40-50 г/га + 200 мл/га ПАР «Флокс»	Обприскування посівів у фазі 1-7 листків культури	1
Картопля		50 г/га + 200 мл/га ПАР «Флокс»	Обприскування посівів за висоти культури 5-20 см	1
Картопля		(30 г/га + 20 г/га) + 200 мл/га ПАР «Флокс»	Перша обробка після міжрядної обробки при висоті культури 5 см Друга обробка – через 8-10 днів, максимальна висота культури 20 см	2

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, г/га	Спосіб, час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробок
Томати безрозсадні	Однорічні та багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	100 г/га (50 г/га + 50 г/га) + ПАР	Перше обприскування при 2-4 листків у культурі; друге – по другій хвилі бур'янів (через 7-10 днів)	2
Томати розсадні		50 г/га + ПАР	Перше обприскування через 4-10 днів після висаджування розсади; друге – по другій хвилі бур'янів (через 7-10 днів)	2



Легіон®, ВГ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ КОРЕНЕПАРОСТКОВИХ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ З РОДИН АЙСТРОВИХ, ГУБОЦВІТИХ ТА ПАСЛЮНОВИХ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
клопіралід, 750 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:
2 кг фольгований пакет
(20 пакетиків по 100 г)



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, г/га	Максимальна кратність обробок
Пшениця, ячмінь	Однорічні двосім'ядольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування від фази куцїння до виходу в трубку культури	60-120	1
Цукрові буряки		Обприскування у фазі 1-3 справжніх листків у культури	120-200	
Ріпак	Однорічні двосім'ядольні та багаторічні, в т. ч. коренепаросткові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 6-8 листків у однорічних бур'янів, у фазі розетки - початку формування генеративного пагону 2-8 см (проти осотів)	120-200	



Меркурій®, ВГ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТБІ З ОДНОРІЧНИМИ ТА ДЕЯКИМИ БАГАТОРІЧНИМИ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ БУР'ЯНАМИ В ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
трибенурон-метил, 750 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:
1 кг фольгований пакет
(20 пакетиків по 50 г)



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, г/га	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
Озима пшениця	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д бур'яни	15-25	Обприскування посівів від фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка включно	1
Ярий ячмінь	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д бур'яни	15-20	Обприскування посівів від фази 2-3 листків до виходу в трубку культури	

Рекомендуємо використовувати з ПАР ФЛОКС, РК



Молтено®, РК

ГЕРБІЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ОДНОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ І ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ В ПОСІВАХ БОБОВИХ КУЛЬТУР ТА СО-НЯШНИКУ, СТІЙКОГО ДО ГЕРБІЦИДІВ З ХІМІЧНОЇ ГРУПИ ІМІДАЗОЛІНОНИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імазамокс, 40 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова канистра



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
Горох	Злакові та двосім'ядольні бур'яни	0,75 – 1,0	Обприскування посівів у фазу 3–5 справжніх листків у культури (злакові бур'яни у фазі 1–3 листки, дводольні – 2–4 листки)	1
Соя		0,75 – 1,0	Обприскування посівів у фазу 2–3 трійчастих листка у культури (злакові бур'яни у фазі 1–3 листки, дводольні – 2–4 листки)	
Соняшник		1,0 – 1,2	Обприскування посівів у фазі від 2 до 8 справжніх листків у культури (злакові бур'яни у фазі 1–3 листки, дводольні – 2–4 листки)	
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:				
Нут	Злакові та двосім'ядольні бур'яни	0,75 – 1,0	Обприскування посівів в ранні фази росту бур'янів (1–3 справжніх листків) і 1–3 справжніх листків культури	1
Конюшина			Обприскування посівів до сходів, після посіву культури, або в фазі 1–2 трійчастих листки в ранні фази росту бур'янів	
Люцерна		1,0	Обприскування посівів в фазу 1–4 трійчастих листка, в ранні фази росту бур'янів	
Люпин			Обприскування ґрунту до сходів, після посіву культури	



Нікоміл®, МС

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ І БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
нікосульфурон, 60 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
суспензія, що змішується з маслом (олією)

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова канистра



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробок, обмеження
Кукурудза	Однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни.	0,7-1,0	Обприскування у фазі 3-10 листків у культури



Вівсюг звичайний



Прчиця польова



Прчак почечуйний



Пропозит®, КЕ

ГРУНТОВИЙ ГЕРБІЦИД ДЛЯ БОРОТБІ З ОДНОРІЧНИМИ ЗЛАКОВИМИ ТА ДЕЯКИМИ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ БУР'ЯНАМИ В ПОСІВАХ ОСНОВНИХ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР. ПІСЛЯСХОДОВИЙ СЕЛЕКТИВНИЙ ГЕРБІЦИД В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
пропізохлор, 720 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова канистра



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідливі об'єкти	Норми витрати, л/га	Кратність обробки
Соняшник, ріпак, цукровий буряк, кукурудза	Однорічні злакові та деякі двосім'ядольні бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	2,0-3,0	1
Кукурудза		Обприскування у фазі до 3-4 листків у культури		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідливі об'єкти	Норма витрати, л/га
Соя	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, але до появи сходів культури	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2-3
Ріпак	Обприскування посівів у фазі до 2-4 листків у культури		



Standard
Стандартна серія

Рейтар®, КС

ГРҀНТОВИЙ ГЕРБІЦИД ДЛЯ
БОРІТЬБИ З ОДНОРІЧНИМИ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ ТА
ЗЛАКОВИМИ БУР'ЯНАМИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
прометрин, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова канистра



Standard
Стандартна серія

Стилет®, КЕ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ
ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНО- ТА
БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ
БУР'ЯНІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
клетодим, 120 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова канистра



Standard
Стандартна серія

Сулам®, СЕ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ
БОРІТЬБИ З ОДНОРІЧНИМИ
ТА ДЕЯКИМИ БАГАТОРІЧНИМИ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ БУР'ЯНАМИ
НА ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
ТА КУКУРУДЗИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
2,4-Д-2-етилгексилловий
ефір, 452,42 г/л +
флорасулам, 6,25 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
суспо-емульсія

УПАКУВАННЯ:
5 л, 10 л пластикова канистра



Standard
Стандартна серія

Тайфун®, КЕ

ГРҀНТОВИЙ ГЕРБІЦИД
ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ
КУКУРУДЗИ, ЦУКРОВОГО
БУРЯКУ, СОЛЯШНИКУ ТА
РІПАКУ ВІД ЗЛАКОВИХ ТА
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
метолахлор, 960 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова канистра



Футурин®, ВГ

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ
ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ
ТА БАГАТОРІЧНИХ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ
БУР'ЯНІВ В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ,
ЯЧМЕНЮ ТА КУКУРУДЗИ (У ТОМУ
ЧИСЛІ СТИЙКИХ ДО 2,4-Д ТА 2М-4Х)

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
дикамби натрієва сіль 600 г/кг +
тифенсульфурон-метил, 60 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що
диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:
2,5 кг фольгований пакет
(10 пакетиків по 250 г)

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідливі об'єкти	Норма витрати, л/га
Кукурудза	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, але до появи сходів культури	Однорічні двосім'ядольні та злакові	2,0-4,0
Соняшник			
Картопля	Обприскування ґрунту до появи сходів культури		3,0-4,0

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідливі об'єкти	Норма витрати, л/га
Морква	Обприскування ґрунту до висівання, до сходів або у фазі 2 справжніх листків культури	Однорічні двосім'ядольні та злакові бур'яни	2,0-3,0
Коріандр	Обприскування ґрунту до висівання, до сходів або у фазі 2-3 справжніх листків культури		3,0-4,0
Горох на зерно, соя, часник, чина (на кормові цілі)	Обприскування ґрунту до сходів культури		3,0-5,0
Горох овочевий	Обприскування ґрунту до сходів культури		2,0
Квасоля, кріп	Обприскування ґрунту до сходів культури (протягом 2-5 днів після висівання)		3,0-4,0
Петрушка	Обприскування ґрунту до сходів культури		4,0

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробок, обмеження	Строки виходу людей на оброблені площі
Буряки цукрові, ріпак, соя, соняшник	Однорічні злакові	0,4-0,8	Обприскування посівів у фазу 2-6 листків у бур'янів (незалежно від фази розвитку культури)	Механічні роботи - 3 дні, ручні роботи - 7 днів
	Багаторічні злакові	1,4-1,8	Обприскування посівів при висоті бур'янів 10-20 см (незалежно від фази розвитку культури)	

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
Морква, льон-довгунець, горох, цибуля (крім на «перо»), картопля	Однорічні злакові бур'яни	0,4-0,8	Обприскування посівів за висоти бур'янів 3-5 см	1
Льон-довгунець, морква, картопля	Багаторічні злакові бур'яни (крім «перо»)	1,4-1,8	Обприскування посівів за висоти бур'янів 15-20 см	
Горох, цибуля (крім на «перо»)		1,2-1,6		

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Пшениця	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування від фази кушніня до утворення 2 міжвузлів культури	0,4-0,6	1
Ячмінь			0,4-0,6	
Кукурудза		Обприскування з фази 3 до фази 7 листків культури, включно	0,4-0,6	

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
Просо	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яни	0,4-0,6	Від фази кушніня до виходу втрубку	1
Сорго	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яни	0,4-0,6	Фаза 3-5 листків культури	

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Бур'яни	Норма витрати, л/га
Кукурудза	Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури	Однорічні злакові та деякі двосім'ядольні	1,6-2,1
Соняшник			
Цукровий буряк			
Ріпак			1,6-2,6

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробок, обмеження
Озима пшениця, ячмінь ярий	0,15-0,2	Обприскування посівів від фази кушніня культури і до виходу в трубку
Кукурудза	0,2-0,25	У фазі 3-5 листків культури

Рекомендуємо використовувати з ПАР ФЛОКС, РК



Professional
Професійна серія

Хантер®, РК

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ТА
ГРУНТОВОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ ТА ЗЛАКОВИХ
БУР'ЯНИВ У ПОСІВАХ ГІБРИДІВ
СОНЯШНИКУ, СТИЙКИХ ДО ДІЮЧИХ
РЕЧОВИН ГРУПИ ІМІДАЗОЛІНОНИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імазапір, 15 г/л +
імазамокс, 33 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова канистра



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробок, обмеження
Соняшник (гібриди стійкі до даного гербіциду)	Злакові та двосім'ядольні бур'яни	1,0-1,2	Обприскування у фазі 4 листків культури та на початкових фазах розвитку бур'янів



Standard
Стандартна серія

Шквал®, KE

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ
ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА
БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ
БУР'ЯНИВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
хізалоф-П-етил, 125 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова канистра



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Буряки цукрові, соняшник, соя.	Однорічні злакові	Обприскування посівів у фазу 2-4 листків у бур'янів (незалежно від фази розвитку культури)	0,4-0,8	1
Ріпак ярий та озимий	Багаторічні злакові (пирій)	Обприскування посівів при висоті пір'ю 10-15 см (незалежно від фази розвитку культури)	0,8-1,2	



Standard
Стандартна серія

Юпітер®, РК

ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ
ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ
ТА БАГАТОРІЧНИХ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ ТА
ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНИВ У ПОСІВАХ
ГОРОХУ ТА СОЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імазетапір, 100 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова канистра



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, л/га
Соя	Злакові та однорічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, до появи сходів або по сходях у фазі 2-3 справжні листки	0,5-1,0
Горох			0,5 - 0,75



Standard
Стандартна серія

Альтекс®, KE

КОНТАКТНО-ШЛУНКОВИЙ
ІНСЕКТИЦИД ДЛЯ БОРОТБИ
З ШИРОКИМ СПЕКТРОМ
ШКІДНИКІВ РОСЛИН

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
альфа-циперметрин, 100 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ:
1 л, 5 л пластикова канистра



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Строк обробки	Максимальна кратність обробок
Пшениця	П'явиці, клоп шкідлива черепаха, пшеничний трипс, попелиці, блішки, цикадки	0,1-0,15 0,1-0,15 (avia)	Обприскування в період вегетації	2
Горох	Зернівка горохова, трипси, попелиці	0,15-0,25		
Буряки цукрові	Лучний метелик, попелиці, блішки, довгоносики	0,1-0,25 0,1-0,15 (avia)		
Капуста	Міль, совки, білани	0,1-0,15		
Ріпак	Ріпаківий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, попелиці	0,1-0,15		
Картопля	Колорадський жук	0,07-0,1		
Яблуна	Плодожерки, листовійки, попелиці	0,15-0,25		
Землі несільськогосподарського призначення (дика рослинність, узбіччя доріг)	Саранові	0,2		
Лісові насадження		0,05-0,1		



Professional
Професійна серія

Дестрой®, КС

СИСТЕМНИЙ ІНСЕКТИЦИД
КОНТАКТНО-ШЛУНКОВОЇ ДІЇ
ДЛЯ БОРОТБИ З ШИРОКИМ
СПЕКТРОМ ШКІДНИКІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імідаклоприд, 250 г/л
+лямбда-цигалотрин, 80 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
1 л, 5 л пластикова канистра



ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату, л/га	Строк обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима	Клоп шкідлива черепаха, трипси, п'явиці, попелиці	0,1-0,15	Обприскування в період вегетації	30	1
Ріпак ярий та озимий	Ріпаківий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, попелиці	0,1-0,15		30	1
Яблуна	Яблунева плодожерка, листовійки, каліфорнійська щитівка, попелиці	0,1		30	2



Standard
Стандартна серія

Ін Сет®, ВГ



ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ, ТА ОДИН З НАЙБЕЗПЕЧНІШИХ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, КОНТАКТНО-ШЛУНКОВИЙ ІНСЕКТИЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ПРОТИ ШИРОКОГО СПЕКТРУ ШКІДНИКІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імідаклоприд, 700 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:
1 кг фольгований пакет
(10 пакетиків по 100 г)

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га	Строк обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка Попелиці, п'явиці, трипси	0,1 0,05-0,07	Обприскування в період вегетації	30	1
Ріпак ярий та озимий	Ріпаківий квіткоїд, хрестоцвітні блішки, попелиці	0,05-0,07		30	1
Картопля	Колорадський жук	0,045-0,05		20	1
Яблуня	Каліфорнійська щитівка, яблунева плодожерка, попелиці	0,07		30	2
Виноград	Виноградна листовійка, листова форма філоксери	0,07		30	1



Standard
Стандартна серія

Ріфос®, КЕ



ІНСЕКТИЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ШКІДНИКІВ З ГРИЗУЧИМ І ЧАСТКОВО З КОЛЮЧЕ-СИСНИМ РОТОВИМ АПАРАТОМ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
хлорпірифос, 500 г/л +
циперметрин, 50 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова каністра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га	Строк обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Пшениця	Клоп шкідлива черепашка, трипси, п'явиці, злакова попелиця, хлібні жуки, хлібна жужелиця	0,75-1,0	Обприскування культур за наявності шкідників в період вегетації	30	1
Ріпак	Прихованохоботники	0,5-0,6		30	2
Яблуня	Плодожерки, листовійки, молі, кліщі попелиці	1,0-1,5		30	2



Standard
Стандартна серія

Штурм®, ЗП



КОНТАКТНИЙ АКАРИЦИД, ЩО ВОЛОДІЄ ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРИ БОРОТБІ З РІЗНИМИ ВИДАМИ КЛІЩІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
піридабен, 200 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:
порошок, що змочується

УПАКУВАННЯ:
1 кг фольгований пакет
(10 пакетиків по 100 г)

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га	Строк обробки	Максимальна кратність обробок
Яблуня	Кліщі	0,5-0,9	Обприскування в період вегетації	1
Виноградники				

- високоефективний проти різних видів кліщів
- знищує білокрилку
- забезпечує високу швидкість дії
- має тривалий період захисту



Арбалет®, КС



ФУНГІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТБІ З ХВОРОБАМИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ, ЯЧМЕНЮ ЯРОГО, СОЛЯШНИКУ ТА РІПАКУ ОЗИМОГО

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
азоксистробін, 200 г/л +
флутріафол, 120 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова каністра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Кількість обробок
Озима пшениця	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, іржасті хвороби	0,5-0,75	Обприскування в період вегетації	2
Ячмінь ярий	Борошниста роса, сітчастий, смуғастий гелмінтоспоріоз, іржасті хвороби	0,5-0,75		
Соняшник	Фомоз, іржа, несправжня борошниста та борошниста роса, фомопсис	0,6-1,0		
Озимий ріпак	Фомоз, альтернاریоз, біла гниль, пероноспороз, сіра гниль	0,6-1,0		



Баліста®, КЕ



ФУНГІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТБІ З ХВОРОБАМИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ТА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
тебуконазол, 120 г/л +
спіроксамін, 300 г/л +
дифеноконазол, 30 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова каністра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Кількість обробок
Озима пшениця	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, іржасті хвороби	0,5-0,6	Обприскування в період вегетації	2
Ячмінь ярий	Борошниста роса, сітчастий, смуғастий гелмінтоспоріоз, іржасті хвороби	0,5-0,6		



Standard
Стандартна серія

Корнет®, КС

ФУНГЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ
ДЛЯ БОРЬБИ З ХВОРОБАМИ
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ЦУКРОВИХ
БУРЯКІВ, ВИНОГРАДУ ТА ЯБЛУНІ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
флутріафол, 250 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Кількість обробок
Озима пшениця	Борошниста роса, плямистості, септоріоз, стеблова бура іржа, кореневі гнилі, фузаріоз, ринхоспоріоз	0,5	Обприскування в період вегетації	2
Ярий ячмінь				
Буряки цукрові	Борошниста роса, церкоспороз	0,25		
Виноградники	Мілдью	0,1		
Яблуня	Борошниста роса, парша	0,15		



Professional
Професійна серія

Ретардин® EW, EB

ФУНГЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ
ОБРОБКИ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
ТА РІПАКУ ВІД ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ
ХВОРОБ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА
ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ. МАЄ РЕТАРДАНТНУ
ДІЮ НА РОСЛИНИ ОЗИМОГО РІПАКУ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
тебуконазол, 250 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
емульсія, масло (олія) у воді

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Кількість обробок
В якості фунгіциду				
Пшениця озима	Обприскування рослин при появі перших симптомів захворювання	Септоріоз листя, фузаріоз колоса, борошниста роса, бура листова іржа	0,5-1,0	2
Ріпак озимий		Альтернاریоз, сіра гниль	0,8-1,0	2
В якості ретарданту				
Ріпак озимий	Обприскування рослин в фазі 5-7 листків	Інгібування росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	0,5-0,75	1



Professional
Професійна серія

Ретардин®, ВГ

СИСТЕМНИЙ ФУНГЦИД ТА РЕТАРДАНТ
ІЗ ЗАХИСНОЮ ТА ЛІКУВАЛЬНОЮ
ДІЄЮ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ
ПШЕНИЦІ ТА ОЗИМОГО РІПАКУ ВІД
ШИРОКОГО СПЕКТРУ ЗБУДНИКІВ
ГРИБНИХ ХВОРОБ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
тебуконазол, 500 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що
диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:
2,5 кг фольгований пакет
(5 пакетиків по 500 г)

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га
В якості фунгіциду			
Пшениця озима	Обприскування рослин при появі перших симптомів захворювання	Септоріоз, фузаріоз колоса, борошниста роса, бура іржа	0,25-0,50
Ріпак озимий		Альтернاریоз	0,40-0,50
В якості ретарданту			
Ріпак озимий	Обприскування рослин в фазі 5-7 листків	Інгібування росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	0,25-0,38



Standard
Стандартна серія

Форсаж®, КС

СИСТЕМНИЙ ФУНГЦИД
ЗАХИСНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
карбендазим, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Максимальна кратність обробок
Пшениця яра та озима	Борошниста роса, септоріоз	0,4-0,5	Обприскування в період вегетації	2
Ячмінь ярий та озимий				
Жито озиме				
Ріпак озимий та ярий	Альтернاریоз, септоріоз	0,6		
Буряки цукрові та кормові	Церкоспороз	0,3-0,4		



Standard
Стандартна серія

Юнкер®, ЗП

ФУНГЦИД СИСТЕМНОЇ ТА
КОНТАКТНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ
КАРТОПЛІ, ТОМАТІВ ТА
ВИНОГРАДНИКІВ ВІД ГРИБНИХ
ХВОРОБ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
металаксил, 80 г/кг +
манкоцеб, 640 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:
порошок, що змочується

УПАКУВАННЯ:
2,5 кг фольгований пакет

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га	Норма витрати робочого розчину, л/га	Спосіб внесення	Максимальна кратність обробок
Картопля	Альтернاریоз, фітофтороз	2,0-2,5	200-400	Обприскування при загрозі розповсюдження хвороб та при появі їх перших ознак	2 рази за вегетаційний період, через 10-14 днів після першого застосування
Томати відкритого ґрунту	Фітофтороз	2,25	200-400	Обприскування при виявленні перших ознак хвороби	2-3 рази з інтервалом 7-10 днів
Виноградники	Мілдью	2,5	500-800		



Professional
Агросерія

Аболір®, РГ

ДЕСИКАНТ
СИСТЕМОЇ ДІЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
гліфосат, у вигляді амонійної солі, 757 г/кг у кислотному еквіваленті, 687 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинні гранули

УПАКУВАННЯ:
10 кг фольгований пакет

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати, кг/га	Спосіб, час обробки, обмеження	Строк обробки до збирання врожаю, дів
Зернові	Підсушування культурних рослин та знищення бур'янів	1,5	Обприскування посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30%	14
Ріпак			Обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури	



Standard
Стандартна серія

Везувій®, РК

ДЕСИКАНТ КОНТАКТНОЇ ДІЇ.
ДЛЯ ДЕСИКАЦІЇ ГОРОХУ,
СОНЯШНИКУ ТА СОЇ. ПОЛЕГШЕ
ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ЗА РАХУНОК
ПІДСУШУВАННЯ РОСЛИН ПРИ
НЕРІВНОМІРНОМУ ДОЗРІВАННІ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: дикват
дибромід, 150 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб та час застосування	Строк очікування (в днях до збирання врожаю)
Соняшник	2,0-3,0	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	6
Горox	2,0-3,0	Обприскування у період поживотіння нижніх бобів (вологість зерна до 45%)	7
Соя	2,0-3,0	Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього та середнього ярусів	6



Standard
Стандартна серія

Вулкан® Плюс, РК

ДЕСИКАНТ
СИСТЕМОЇ ДІЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
гліфосат у формі
ізопропіламіної солі, 480 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Призначення	Норми витрати, л/га наземним устаткуванням	Норми витрати, л/га авіацією (літак АН-2)	Строк очікування до збирання врожаю, дів	Максимальна кратність обробок
Зернові	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більш 30%	Підсушування культурних рослин та знищення бур'янів	3,0	3,0	14	1
Горox	Обприскування при побурінні 70-75% бобів культури		3,0	-	14	
Соя	Обприскування у фазу початку побуріння бобів		3,0	-	14	
Ріпак	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури		3,0	-	14	
Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків		3,0	-	14	



Professional
Агросерія

Деліт®, РК

НЕСЕЛЕКТИВНИЙ
ПІСЛЯСХОДОВИЙ ГЕРБІЦИД
СИСТЕМОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ
ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ
БУР'ЯНІВ. ДЕСИКАНТ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
гліфосату калієва сіль 613 г/л, у кислотному еквіваленті 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Строк обробки до збирання врожаю, дів	Максимальна кратність обробок
Десикація зернових	Обприскування за 2 тижні до збирання за вологості зерна не >30%	1,5-2,0	14	1
Десикація соняшнику	Десикація у фазі початку побуріння кошиків	1,5-2,0	14	



Фосфір®, ТБ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
фосфід алюмінію, 560 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:
таблетки

УПАКУВАННЯ:
1 кг металева пляшка

ФУМІГАНТ ДЛЯ БОРотьБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ЗАПАСІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР МЕТОДОМ ФУМІГАЦІЇ (ГАЗАЦІЇ)

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ:

Об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату г/м³, т	Спосіб, час обробки, обмеження
Зерно хлібних злаків, незавантажені складські приміщення	6-9 (2-3 таблетки)	Допуск людей та завантаження складських приміщень – після повного провітрювання (7 дів) та вмісту фосфороводню не більше ГДК у повітрі робочої зони. Реалізація зерна – через 20 дів після фумігації за наявності залишків фосфороводню не вище МДР



Флокс®, РК

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
Етоксилат ізодецилового спирту, 90%

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова канистра

ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА РЕЧОВИНА ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ З ГЕРБІЦИДАМИ НА ОСНОВІ СУЛЬФОНІЛСЕЧОВИНИ

ПАР Флокс застосовується спільно з препаратами, діючі речовини яких відносяться до хімічної групи сульфонілсечовини:

• Апач • Гурон, ВГ • Канцлер, ВГ • Крейсер, ВГ • Меркурій, ВГ • Футурин, ВГ

ПАР Флокс застосовується в концентрації – 0,1-0,2% (100 мл/100 л води) при нормі виливу робочої рідини від 200 до 300 літрів на гектар. Рівень концентрації ПАР Флокс залежить від препарату. Завжди уважно читайте тарну етикетку перед застосуванням.



Professional
Професійна серія

Бор Маджестик®, Рід.

МІКРОДОБРИВО РЕКОМЕНДОВАНЕ
для ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
КУКУРУДЗИ, ОЛИЙНИХ КУЛЬТУР
(СОНЯШНИКУ) І РОСЛИН З
СИМПТОМАМИ ДЕФІЦИТУ БОРУ
(ЗЕРНОВИ)

СКЛАД: бор (В) – 11%,
азот (N) – 4,8%,
фосфор (P₂O₅) – 2%,
калій (K₂O) – 4% та
мікроелементи

ФОРМУЛЯЦІЯ: рідина

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробки
Озима пшениця, кукурудза, соняшник, томати	1,0 – 3,0	Позакореневе живлення

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Фази внесення	Норма витрати л/га
Ріпак	Осінь: формування розетки; весна: подовження квітконіжки; бутонізація, до початку цвітіння	1,0 – 2,0
Буряки цукрові та столові	2 обробки: 4-6 справжніх листків – до змикання міжрядь	2,0 – 3,0
Соя	4-6 трійчастих листків, бутонізація	1,0 – 3,0
Картопля	Бутонізація, утворення стонів	1,0 – 2,0
Виноград	2 обробки: початок повного цвітіння – кінець цвітіння	2,0 – 3,0



Professional
Професійна серія

Калій Фреш®, П

ПРЕПАРАТ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ
КАЛІЮ для ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНИХ
ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ТА
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РОСЛИН
ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ У
РОЗВИНУТИХ РОСЛИН

СКЛАД: гіберелін – 10 г/кг,
азот (N) – 5%, фосфор (P₂O₅)
– 15%, калій (K₂O) – 38% та
мікроелементи

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ:
9,5 кг поліпропіленовий пакет

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,5-1,0	Позакореневе живлення

- активізує процеси фотосинтезу та обміну речовин у листі рослин
- сприяє кращому застосуванню поживних речовин через листя та з ґрунту
- підвищує стійкість рослин до несприятливих погодних умов та грибних хвороб



Professional
Професійна серія

Універсал Фреш®, П

ПРЕПАРАТ З РЕТЕЛЬНО
ПІДБРАНОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ
ЛЕГКО ЗАСВОЮВАНИХ ФОРМ
МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ
НРК ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ФОРМІ
ХЕЛАТІВ МЕТАЛІВ для КОРИГУВАННЯ
МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КЛІТИНАХ
ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
МІЖ ОРГАНАМИ У РОСЛИН

СКЛАД: бурштинова кислота
– 40 г/кг, азот (N) – 20%, фосфор
(P₂O₅) – 20%, калій (K₂O) – 20%
та мікроелементи

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ:
9,5 кг поліпропіленовий пакет

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,5-1,0	Позакореневе живлення

- активізує процес фотосинтезу та обміну речовин у листі рослин
- сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту
- підвищує стійкість рослин до несприятливих погодних умов та грибних хвороб



Professional
Професійна серія

Фосфор Фреш®, П

ПРЕПАРАТ З РЕТЕЛЬНО
ПІДБРАНОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ
ЛЕГКО ЗАСВОЮВАНИХ ФОРМ
МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ
НРК ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ФОРМІ
ХЕЛАТІВ МЕТАЛІВ З ПІДВИЩЕНИМ
ВМІСТОМ ФОСФОРУ для МАКСИМАЛЬНОЇ
АКТИВІЗАЦІЇ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ
У КОРЕНЕВІЙ СИСТЕМІ В ПЕРІОД ЇЇ
УТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

СКЛАД: індолілмасляна
кислота – 10 г/кг, азот (N) – 10%,
фосфор (P₂O₅) – 40%, калій (K₂O)
– 11% та мікроелементи

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ:
9,5 кг поліпропіленовий пакет

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,5-1,0	Позакореневе живлення

- прискорює та активізує процес утворення і розвитку кореневої системи на початку вегетації
- сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту
- відмінна розчинність добрив у воді
- підвищує стійкість рослин до несприятливих погодних умов та грибних хвороб



Professional
Професійна серія

Аміно Фреш®, Рід.

РЕГУЛЯТОР РОСТУ НА ОСНОВІ
АМІНОКИСЛОТ ІЗ ВИСОКИМ
ВМІСТОМ АЗОТУ для ПІДВИЩЕННЯ
МЕМБРАННОЇ, МЕТАБОЛІЧНОЇ І
ГЕНЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СИСТЕМ
У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ
І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ
РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН

СКЛАД: амінокислоти – 150 г/л,
азот (N) – 11%, фосфор (P₂O₅)
– 2%, калій (K₂O) – 4% та
мікроелементи

ФОРМУЛЯЦІЯ: рідина

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробки
Озима пшениця, кукурудза, ячмінь ярий, соняшник	0,5 – 1,0	Позакореневе живлення

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Необхідність застосування	Норма витрати, л/га
Для підсилення гербіцидного ефекту; для підкислення робочого розчину	0,2
Для зняття гербіцидного стресу	0,5 – 1,0



Гуміленд Фреш®, Рід.

РЕГУЛЯТОР РОСТУ ДЛЯ РОСЛИН НА ОСНОВІ ГУМІНОВОЇ ТА ФУЛЬВОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАННОЇ І МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН

СКЛАД: солі гумінових кислот – 120 г/л, солі фульвокислот – 60 г/л, азот (N) – 2,5%, фосфор (P₂O₅) – 2%, калій (K₂O) – 4% та мікроелементи

ФОРМУЛЯЦІЯ: рідина

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикава канистра

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробки
Озима пшениця, кукурудза, ячмінь ярий, соняшник	1,0 – 3,0	Позакореневе живлення

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробки
Буряки цукрові, ріпак озимий, соя, горох, картопля, овочі	1,0 – 3,0	Позакореневе живлення



Енергія Фреш®, П

РЕГУЛЯТОР РОСТУ ДЛЯ РОСЛИН НА ОСНОВІ ІНДОЛІЛМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ З МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕТАБОЛІЧНОЇ І ГЕНЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ГОРМОНАЛЬНОЇ І ТРОФІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН

СКЛАД: індолілмасляна кислота – 40 г/кг, азот (N) – 5,4%, фосфор (P₂O₅) – 5%, калій (K₂O) – 8% та мікроелементи

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ:
5 кг фольгований пакет

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Ярий ячмінь, пшениця, кукурудза, соняшник	0,5 - 1,0	Позакореневе живлення

- активізує процес фотосинтезу та обміну речовин у листі рослин
- сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту
- відсутність прояву токсичної дії на рослини



Ленд Фреш®, П

РЕГУЛЯТОР РОСТУ ДЛЯ РОСЛИН НА ОСНОВІ КАЛІЕВОЇ СОЛІ ФУЛЬВОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАННОЇ І МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН

СКЛАД: солі фульвокислот – 500 г/кг, азот (N) – 3%, фосфор (P₂O₅) – 5%, калій (K₂O) – 10% та мікроелементи

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ:
5 кг фольгований пакет

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,3 - 1,0	Позакореневе живлення

- фульвокислоти належать до комплексонат утворюючих речовин з неорганічними та органічними сполуками. Тому, підвищує ефективність застосування мікродобрив, інсектицидів та фунгіцидів при листовій обробці



Мікс Фреш®, П

РЕГУЛЯТОР РОСТУ НА ОСНОВІ АМІНОКИСЛОТ ІЗ ВИСОКИМ ВМІСТОМ АЗОТУ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАННОЇ, МЕТАБОЛІЧНОЇ І ГЕНЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СИСТЕМ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН

СКЛАД: амінокислоти – 150 г/кг, екстракт морських водоростей – 350 г/кг, азот (N) – 10%, фосфор (P₂O₅) – 5%, калій (K₂O) – 8% та мікроелементи

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ:
5 кг фольгований пакет

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Ячмінь ярий, кукурудза, соняшник	0,5 - 1,0	Позакореневе живлення

- композиція фізіологічно активних речовин та мікроелементів нівелює негативні наслідки дії високих температур на фоні дефіциту вологи у ґрунті та пестицидів після обробки рослин
- відсутність прояву токсичної дії на рослини



Флорід Фреш®, П

СТИМУЛЯТОР РОСТУ РОСЛИН НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН З МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАННОЇ, МЕТАБОЛІЧНОЇ І ГЕНЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СИСТЕМ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ, ГОРМОНАЛЬНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН

СКЛАД: екстракт морських водоростей – 500 г/кг, амінокислоти – 15 г/кг, азот (N) – 3%, фосфор (P₂O₅) – 5%, калій (K₂O) – 16% та мікроелементи

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок


УПАКУВАННЯ:
5 кг фольгований пакет

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Спосіб, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,2 - 0,4	Позакореневе живлення

- фізіологічно активні речовини надзвичайно ефективні для стимулювання росту надземних органів рослин в період активного росту
- відсутність прояву токсичної дії на рослини


СИСТЕМА ЗАХИСТУ ГОРОХУ

• Юпітер, РК (0,5-0,75 л/га)		• Юпітер, РК (0,5-0,75 л/га)	• Ефес, РК (3,0 л/га)					• Вулкан Плюс, РК (3,0 л/га)	
		• Молтено, РК (0,75 - 1,0 л/га)						• Везувій, РК (2,0-3,0 л/га)	
		• Альтекс, КЕ (0,15-0,25 л/га)						• Деліт, РК (2,0-2,5 л/га)	
		• Фреш Енергія (0,5 - 1,0 кг/га)		• Фреш Флорід (0,2 кг/га)		• Фреш Аміно (0,5 - 1,0 л/га)			
		• Фреш Гуміленд, Рід. (1,0 ¹ - 3,0 ² л/га)				• Фреш Калій (1,0 ¹ - 2,0 ² кг/га)			
		• Фреш Ленд (0,3 ¹ - 1,0 ² кг/га)							
		• Фреш Фосфор (1,0 ¹ - 2,0 ² кг/га)		• Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га)					
									
Обприскування грунту до/або після сівби	Сівба	Сходи	3-5 листіків	5-6 листіків	Бутонізація	Цвітіння	Формування бобів	Побуріння бобів	Достигання

■ ГЕРБИЦИДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)
2 – при застосуванні самостійно


СИСТЕМА ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ

• Деліт, РК (2,0-3,0 л/га)	• Гранівіт, ТН (2,5-3,0 л/т)	• Пропозит, КЕ (2,0-3,0 л/га)		
• Аболір, РГ (1,5 кг/га)	• Ін Сет SC, КС (3,5-6,0 л/т)	• Екстрем, КЕ (1,5-3,0 л/га)	• Нікоміл, МС (0,7-1,0 л/га) 3-10 листків	
			• Сулам, СЕ (0,4-0,6 л/га) 3-7 листків	
			Апач, ВГ (0,4-0,5 кг/га) 3-5 листків	
			• Футурин, ВГ (0,2-0,25 кг/га) 3-5 листків	
	• Фреш Фосфор (1,0 ¹ -2,0 ² кг/т)		• Фреш Фосфор (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)	• Фреш Калій (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)
	• Фреш Гуміленд, рід. (1,0 ¹ -3,0 ² л/т)		• Фреш Гуміленд, рід. (1,0 ¹ -3,0 ² л/га)	• Фреш Аміно (0,5 ¹ -1,0 ² л/га)
	• Фреш Енергія (0,5 ¹ -1,0 ² кг/т)		• Фреш Енергія (0,5 ¹ -1,0 ² кг/га)	• Фреш Універсал (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)
			• Фреш Мікс (0,5 ¹ -1,0 ² кг/га)	
				
На парах та полях, призначених під посіви ярих зернових	Протруєння насінина	До сівби, під час та після сівби, але до появи сходів	Від 3 до 10 листків кукурудзи	

■ ПРОТРУЙНИКИ ■ ГЕРБИЦИДИ ■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)
2 – при застосуванні самостійно




СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ

• Пентафорс, ТН (1,5-2,0 л/т)	• Дестрой, КС (0,1-0,15 л/га)				• Ріфос, КЕ (0,75-1,0 л/га)		• Фосфір, таб. (6-9 г/т або 2-3 таб./т)	
• Томагавк, ТН (0,4-0,5 л/т)		• Баліста, КЕ (0,5-0,6 л/га)		• Ретардин EW, EB (0,5-1,0 л/га)		• Арбалет, КС (0,5-0,75 л/га)		• Аболір, РГ (1,5 кг/га)
• Галеон, ТН (0,55-0,75 л/т)		• Футурин, ВГ (0,15-0,2 кг/га)						• Деліт, РК (2,0 л/га)
		• Леґіон, ВГ (0,06-0,12 кг/га)						
		• Сулам, СЕ (0,4-0,6 л/га)						
		• Гурон, ВГ (30-40 г/га)		• Корвет, КС (0,05-0,07 л/га)				
• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/т)		• Фреш Енергія (0,3-0,5 кг/га)		• Фреш Універсал (1,0- 2,0 кг/га)	• Фреш Флорід (0,2 кг/га)	• Фреш Аміно, рід. (0,5 л/га)		
	• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га)							
• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/т)	• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-2,0 л/га)		• Фреш Мікс (0,5-1,5 кг/га)					
								
Протруєння до сівби	Сходи — 2-3 листки	Куціння	Вихід в трубку — прапорцевий лист		Колосіння - цвітіння	За 2 тижні до збирання та вологості зерна не більше 30%		Зберігання зерна

■ ПРОТРУЙНИКИ ■ ГЕРБИЦИДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ ■ ФУНГІЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ ■ МІКРОДОБРИВА ■ ФУМІГАНТ

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)
2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ РІПАКУ

• Ін Сет SC, КС (3,0-4,0 л/т)	• Пропозит, КЕ (2,0-3,0 л/га)	• Стилєт, КЕ (0,4-1,8 л/га)	• Леґіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га)			• Деліт, РК (2,0-2,5 л/га)			
		• Шквал, КЕ (0,4-1,2 л/га)				• Аболір, РГ (1,5 кг/га)			
			• Ретардин EW, EB (0,5-1,0 л/га)	• Арбалет, КС (0,6-1,0 л/га)					
		• Дестрой, КС (0,1-0,15 л/га)	• Ріфос, КЕ (0,5-0,6 л/га)						
			• Фреш Енергія (0,3-0,5 кг/га)		• Фреш Калій (1,0-2,0 кг/га)				
			• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/га)						
			• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га)						
			• Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га)						
			• Фреш Універсал (1,0-2,0 кг/га)						
				• Фреш Мікс (0,5-1,5 г/га)					
									
Протруєння до сівби	Обприскування ґрунту до/або після висівання, але до появи сходів	Сівба	Фаза сім'ядолей	2 справжніх листка	5-6 листків	Бутонізація	Формування стручків	Побуріння стручків	Достигання

■ ПРОТРУЙНИКИ ■ ГЕРБИЦИДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ ■ ФУНГІЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)
2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОЇ

• Деліт, РК (2,0-4,0 л/га)	• Галеон, ТН (0,55-0,75 л/га)	• Пропозит, КЕ (2,0-3,0 л/га)		• Ефес, ВР (1,5-3,0 л/га)			• Деліт, РК (2,0-2,5 л/га)	
		• Рейтар, КС (2,0-3,0 л/га)	• Юпітер, РК* (0,5-1,0 л/га)	• Канцлер, ВГ (6-8 г/га)			• Везувій, РК (2,0-3,0 л/га)	
			• Стилет, КЕ** (0,4-1,8 л/га)	• Шквал, КЕ** (0,4-1,2 л/га)			• Аболір, РГ (1,5 кг/га)	
	• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/га)			• Молтено, РК (0,75-1,0 л/га)				
				• Арбалет, КС (0,6-1,0 л/га)				
	• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/га)			• Ріфос, КЕ (1,0 л/га)				
				• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/га)	• Фреш Флорід (0,4 кг/га)			
	• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га)			• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/га)	• Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га)			
				• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га)		• Фреш Калій (1,0-2,0 кг/га)		
					• Фреш Мікс (0,5-1,5 г/га)			
Обприскування вегетуючих бур'янів до висівання культури	Протруєння до сівби	Обприскування ґрунту до/або після сівби, але до появи сходів	* Обприскування ґрунту до/або після сходів до 2-3 листків ** Обприскування сходів незалежно від фази розвитку культури	1 справжній листок	3-5 справжніх листків	Цвітіння – початок досягання	Побуріння бобів нижнього та середнього ярусів, за вологості насіння не більше 35-40%	Повна стиглість

■ ПРОТРУЙНИКИ ■ ГЕРБИЦИДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ ■ ФУНГЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)

2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ

• Ін Сет SC, КС (3,5-5,5 кг/га)		• Рейтар, КС (2,0-4,0 л/га)	• Стилет, КЕ (0,4-1,8 л/га)	• Шквал, КЕ (0,4-1,2 л/га)		• Деліт, РК (2,5 л/га)
		• Пропозит, КЕ (2,0-3,0 л/га)		• Хантер, РК ¹ (1,0-1,2 л/га)		• Аболір, РГ (1,5 кг/га)
				• Молтено, РК ¹ (1,0-1,2 л/га)		• Везувій, РК (2,0-3,0 л/га)
				• Арбалет, КС (0,6-1,0 л/га)		
• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га)				• Ріфос, КЕ (1,0 л/га)		
				• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га)	• Фреш Калій (1,0-2,0 кг/га)	
• Маджестик Бор (1,0 л/га)				• Фреш Енергія (0,3-0,5 кг/га)		
• Фреш Флорід (0,3 кг/га)				• Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га)		
				• Фреш Універсал (1,0-2,0 кг/га)		
				• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/га)		
Протруєння до сівби	Обприскування вегетуючих бур'янів до висівання культури	Обприскування ґрунту до/під час висівання, але до появи сходів культури	Сходи-дві пари листків	Формування кошиків-цвітіння		Обприскування посівів у фазі побуріння кошиків

■ ПРОТРУЙНИКИ ■ ГЕРБИЦИДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ ■ ФУНГЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)

2 – при застосуванні самостійно

3 – у посівах гібридів соняшнику, стійких до діючих речовин групи імідазоліни

ПОРЯДОК ПРИГОТУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ

При приготуванні бакових сумішей ЗЗР рекомендується наступна послідовність:

- Частково наповніть бак обприскувача водою згідно з рекомендаціями на етикетці, на 1/3, або 1/2, або 3/4 від об'єму. Увімкніть мішалку обприскувача і продовжуйте перемішування протягом приготування робочого розчину та обприскування.
- Додайте препарати у вигляді водорозчинних порошків (ВП).
- Додайте препарати у вигляді водорозчинних гранул (РГ), у вигляді гранул, що диспергуються у воді (ВГ).
- Додайте препарати у вигляді концентратів суспензії (КС).
- Додайте препарати у вигляді концентратів, що емульгуються (КЕ).
- Додайте препарати у вигляді масляних дисперсій (МД).
- Додайте препарати у вигляді емульсії, масла (олії) у воді (ЕВ) або суспензії (СЕ).
- Додайте препарати у вигляді розчинних концентратів (РК).
- Додайте прилипачі, адюванти.
- Додайте добрива або мікродобрива (тверді, рідкі).
- Долийте бак обприскувача до повного.

УВАГА! НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ В БАКОВИХ СУМІШАХ НАСТУПНІ ПРЕПАРАТИ:

- Фосфорорганічні інсектициди (**Акцент, Ріфос**), гербіциди, що містять похідні сульфонілсечовин (**Апач, Гурон, Канцлер, Крейсер, Нікоміл, Меркурій**) та імідазолінів (**Молтено, Хантер, Юпітер**). А також використовувати (**Акцент, Ріфос**) до 14 днів після внесення даних препаратів. Не змішувати з пестицидами, які мають лужну реакцію (сірчане вапно, мідь тощо).
- Гербіциди **Ефес** та **Стилет**.
- Гербіцид **Канцлер** – при використанні у посівах льону не використовувати з грамініцидами та ПАР **Флокс**.

БАКОВІ СУМІШІ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРУ ДІЇ ТА ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБОК.

Культура	Група препаратів	Фаза розвитку	Мета обробки	Бакова суміш, норма внесення
Поля призначені під посів	Гербіцид	Обприскування вегетуючих бур'янів	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни в умовах недостатнього зволоження	Вулкан Плюс (3-4 л) + Футурин (150 г)
				Вулкан Плюс (3-4 л) + Сулам (0,4 л)
				Деліт (2-3 л) + Футурин (150 г)
			Для підсилення дії на проблемні злакові бур'яни (очерет, гумай та ін.)	Вулкан Плюс (3-4 л) + Шквал (0,5 л)
Зернові колосові	Протруйник	Обробка насіння перед сівбою	Для підсилення дії на кореневі гнилі та збудника снігової плісняви	Кольчуга Плюс (0,2 л) + Форсаж (0,5 л)
			Для підсилення дії на збудників сажкових хвороб	
	Гербіцид	До появи прапорцевого листка	Для підсилення дії на лободу білу	Корвет (50-70 г) + Сулам (0,1-0,2 л)
		До появи другого міжвузля	Для підсилення дії на багаторічні та перерослі двосім'ядольні бур'яни	Меркурій (15 г) + Канцлер (10 г);
				Меркурій (20 г) + Сулам (0,2-0,25 л)
		До кінця кушення		Меркурій (20 г) + Леґіон (80 г)
	Фунгіцид	Профілактично, або за перших ознак захворювання	Для уникнення резистентності та розширення спектру контрольованих грибних хвороб в посівах пшениці, та ріпаку	Меркурій (15 г) + Дікам Плюс (0,5 л)
				Ретардин (0,5 л) + Корнет (0,4-0,5 л)
Соя	Гербіцид	До сходів бур'янів та культури	Для підсилення дії на бур'яни та подовження захисного періоду	Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,2 л)
				Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,2 л)
				Тайфун (1,5-2,0 л) + Рейтар (1,8-2,2 л)
		1-3 трійчастих листки	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни в умовах недостатнього зволоження	Ефес (1,5-2,5 л) + Канцлер (5-8 г)
Горох	Гербіцид	2-3 трійчастих листка	Для кращого контролю стійких та перерослих бур'янів	Ефес (2,0 л) + Юпітер (0,5 л)
				Молтено (0,75 л) + Ефес (2,0 л)
		1-3 трійчастих листки	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни в умовах недостатнього зволоження	Ефес (2,5 л) + Юпітер (0,5 л)
Кукурудза	Гербіцид	1-3 трійчастих листків	Для кращого контролю стійких та перерослих бур'янів	Ефес (2,5 л) + Юпітер (0,5 л)
				Молтено (0,75 л) + Ефес (2,0 л)
		До сходів бур'янів та культури	Для підсилення дії на бур'яни та подовження захисного періоду	Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,5 л)
				Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,5 л)
				Тайфун (1,5-2,0 л) + Рейтар (1,8-2,5 л)
		3-7 листків у культури		Крейсер (50 г) + Сулам (0,5 л) + ПАР Флокс (0,2 л)
				Канцлер (10 г) + Крейсер (40-50 г) + ПАР Флокс (0,2 л)
				Канцлер (10 г) + Нікоміл (0,7-1,0 л)
				Сулам (0,3-0,4 л) + Нікоміл (0,7-1,0 л)
		3-5 листків у культури	Для контролю як злакових, так і двосім'ядольних бур'янів	Крейсер (50 г) + Футурин (150 г) + ПАР Флокс (0,2 л)
				Крейсер (40-50 г) + Дікам Плюс (1,0-1,2 л) + ПАР Флокс (0,2 л)
				Футурин (150 г) + Нікоміл (0,7-1,0 л)
Соняшник	Гербіцид	3-7 листків у культури	Для контролю як злакових, так і двосім'ядольних бур'янів	Дікам Плюс (0,7л) + Нікоміл (0,7-1,0 л)
				Канцлер (10 г) + Сулам (0,4 л) + ПАР Флокс (0,2 л)
				Канцлер (10 г) + Леґіон (60-120 г) + ПАР Флокс (0,2 л)
				Канцлер (10 г) + Дікам Плюс (0,7 л) + ПАР Флокс (0,2 л)
		3-5 листків у культури	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни	Нікоміл (0,7-1,0 л) + Леґіон (120 г)
				Крейсер (50 г) + Леґіон (80 г) + ПАР Флокс (0,2 л)
		3-7 листків у культури	Для знищення злакових бур'янів, та бур'янів родини айстрових (гірчаки, осоти, падалиця соняшнику, амброзія)	Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,5 л)
				Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,5 л)
Буряк	Гербіцид	1-3 пари справжніх листків	Для контролю як злакових, так і двосім'ядольних бур'янів	Тайфун (1,5-2,0 л) + Рейтар (1,8-2,5 л)
				Леґіон (120-200 г) + Стилет (0,8-1,5 л)
				Леґіон (120 г) + Шквал (0,6-1,2 л)
Ріпак	Гербіцид	6-8 листків однорічних бур'янів, розетка-початок стеблуння у багаторічних	Для контролю як злакових, так і двосім'ядольних бур'янів	Леґіон (120 г) + Шквал (0,6-1,2 л)

ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ З ПРИВ'ЯЗКОЮ ДО ФАЗ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ЇХ СУМІШІ З ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ РОСЛИН.

Культури		Фаза розвитку	Мета обробки	Мікродобрива та стимулятори росту – бакова суміш, норма внесення	* Засоби захисту рослин (за умови спільного внесення)
Озимі пшениця та ячмінь	До посіву (обробка насіння)	Закладання та розвиток потужної кореневої системи та забезпечення необхідними елементами живлення на початку росту рослини	Енергія Фреш (0,5-1 кг/т) + (або) Фосфор Фреш (1-2 кг/т)	Мікс Фреш (0,5-1 кг/т)	Фунгіцидний протруйник - Кольчуга Плюс, або Томагавк, або Граніт, або Галеон + інсектицидний протруйник – Ін Сет, або універсальний комбінований протруйник Пентафорс 322 FS
		Підвищення енергії проростання травмованого насіння; захист проростків від післядії гербіцидів, внесених під попередник; високий вміст цинку, міді, заліза та марганцю сприяє гармонійному розвитку та зимостійкості рослин	Ленд Фреш (0,3-1 кг/т), або Гуміленд Фреш (1-3 л/т)		
		Прискорення появи сходів за холодної погоди і (або) пізніх посівів; покращення засвоєння елементів живлення з ґрунту; зимо- та холодостійкість	Ленд Фреш (0,3-1 кг/т), або Гуміленд Фреш (1-3 л/т)		
	Кущення (осінь)	Синтез цукрів, підвищення зимо- та холодостійкості	Калій Фреш (1-2 кг/га)	Фунгіцид – Форсаж, або Ретардин EW	
	Кущення (весна)	Стимуляція кущення (для посівів, що перезимували в фазі сходи - початок кущення)	Флорід Фреш (0,2-0,4 кг/га) + Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	Обробка до застосування засобів захисту рослин	
		Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 кг/га) + (або) Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	1. Гербіцид – Сулам, або Дікам Плюс, або Корвет + фунгіцид - Арбалет, або Баліста, або Корнет, або Ретардин EW, або Форсаж + інсектицид - Ріфос, або Альтекс. 2. Гербіцид – Сулам, або Дікам Плюс, або Футурин, або Меркурій, або Гурон, або Корвет + фунгіцид – Арбалет, або Баліста, або Корнет, або Ретардин EW, або Форсаж + інсектицид – Альтекс	
		Покращення засвоєння елементів живлення з ґрунту; холодостійкість (в умовах затяжної холодної весни)	Ленд Фреш (0,3-1 кг/т), або Гуміленд Фреш (1-3 л/т) + (або) Фреш Калій (1-2 кг/га)		
	Вихід в трубку	Покращення засвоєння елементів живлення з ґрунту; холодостійкість (в умовах затяжної холодної весни)	Ленд Фреш (0,3-1 кг/т), або Гуміленд Фреш (1-3 л/т) + (або) Калій Фреш (1-2 кг/га)	Гербіцид – Сулам, або Меркурій, або Гурон, або Корвет + фунгіцид – Арбалет, або Баліста, або Корнет, або Ретардин EW, або Форсаж	
		Забезпечення макро- та мікроелементами в доступній формі в період інтенсивного росту рослин	Універсал Фреш (1-2 кг/га)		
	Поява прапорцевого листка	Продовження фотосинтезу, підвищення кількісних та якісних показників врожаю	Флорід Фреш (0,2-0,4 кг/га) + Аміно Фреш (0,5-1 л/га)	Фунгіцид – Арбалет, або Баліста, або Корнет, або Ретардин EW	
		Посухостійкість, збільшення врожайності	Калій Фреш (1-2 кг/га)		
	Вихід колосу	Збільшення кількості запилених квіток	Бор Маджестик (0,5 л/га)		
	Молочна стиглість	Підвищення якості зерна, посухостійкість	Аміно Фреш (0,5-1 л/га)	Інсектицид – Дестрой, або Ріфос	
Соняшник	Класична технологія	2-3 пари справжніх листків	Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 л/га) + Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	Фунгіцид – Арбалет, або Корнет + Форсаж, або Форсаж + інсектицид (при необхідності) Ін Сет, або Ріфос, або Альтекс
		3-5 пар справжніх листків	Закладання більшої кількості квіток; усунення дефіциту бору	Бор Маджестик (1-1,5 л/га)	
		«Зірочка» - початок цвітіння	Максимальне запилення квіток, виповненість насіння; усунення дефіциту бору		
			Посухостійкість, збільшення врожайності; усунення дефіциту калію	Калій Фреш (1-2 кг/га)	
	технологія ClearField та ExpressSun	3-4 пари справжніх листків	Усунення фітотоксичності після застосування гербіцидів	Ленд Фреш (0,3-1 кг/га), або Гуміленд Фреш (1-3 л/га), або Аміно Фреш (0,5-1 л/га)	Фунгіцид – Арбалет, або Корнет + Форсаж, або Форсаж + інсектицид (при необхідності) Ін Сет, або Ріфос, або Альтекс
			Закладання більшої кількості квіток; усунення дефіциту бору	Бор Маджестик (1-1,5 л/га)	
		«Зірочка» - початок цвітіння	Максимальне запилення квіток, виповненість насіння; усунення дефіциту бору		
			Посухостійкість, збільшення врожайності, усунення дефіциту калію	Калій Фреш (1-2 кг/га)	
Кукурудза	3-5 листків	Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 л/га) + Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	Гербіцид – Сулам, або Футурин, або Дікам Плюс, або Крейсер, або Нікоміл	
	6-9 листків	Стимулювання росту; посухостійкість; усунення дефіциту цинку, міді, заліза та марганцю	Мікс Фреш (0,5-1 кг/га)	Гербіцид – Сулам, або Крейсер, або Нікоміл	
	10 листків - викидання волоті	Посухостійкість, збільшення врожайності; усунення дефіциту калію	Калій Фреш (1-2 кг/га)	Інсектицид – Альтекс, або Ріфос	
Ріпак	2-4 справжніх листки	Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 л/га) + Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	Гербіцид – Пропозит, або Шквал, або Легіон	
	3-6 справжніх листків	Профілактика дулистості; стимулювання утворення цукрів; зимо- та морозостійкість	Бор Маджестик (1-1,5 л/га) + Калій Фреш (1-2 кг/га)	Ретардант та фунгіцид – Ретардин EW	
	Відновлення розетки, початок росту стебла	Стимулювання росту; усунення дефіциту цинку, міді, заліза та марганцю	Мікс Фреш (0,5-1 кг/га)	Ретардант та фунгіцид – Ретардин EW + інсектицид – Ріфос, або Альтекс	
		Покращення засвоєння елементів живлення з ґрунту; холодостійкість (в умовах затяжної холодної весни)	Ленд Фреш (0,3-1 кг/га), або Гуміленд Фреш (1-3 л/га) + (або) Калій Фреш (1-2 кг/га)		
Бутонізація	Максимальне запилення квіток, виповненість насіння; усунення дефіциту бору	Бор Маджестик (1-1,5 л/га)	Інсектицид – Дестрой		
Соя	1-3 трійчастих листки	Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 л/га) + Фосфор Фреш (1-2 кг/га)	Гербіцид – Юпітер, або Ефес	
	Бутонізація	Закладання більшої кількості квіток; усунення дефіциту бору	Бор Маджестик (1-1,5 л/га)	Фунгіцид – Арбалет, або Корнет + Форсаж + інсектицид (при необхідності) Ін Сет, або Ріфос, або Альтекс	
		Стимулювання гілкування	Флорід Фреш (0,2-0,4 кг/га) + Універсал Фреш (1-2 кг/га), або Аміно Фреш (0,5-1,0 л/га) + Універсал Фреш (1-2 кг/га)		
	Цвітіння - початок достигання	Посухостійкість, підвищення врожайності	Калій Фреш (1-2 кг/га)		

* Вибір препаратів та норм використання залежить від виду шкідливого об'єкту, його чисельності, та фази розвитку



СОНЯШНИК AGS 103 HO

Оригіатор

Аспрія Сідс для компанії

Тип

Агросфера ЛТД

Стиглість

простий

Особливості

надранній
високоолеїновий гібрид

Потенційна врожайність ц/га

52

Вегетаційний період

98 днів

Олійність

50%

Висота рослини

155 сантиметрів

Рекомендована норма висіву

50-55 для посушливих зон

(тисяч зерен/га)

60-65 для зон достатнього

зволоження

65-70 для зрошення



СОНЯШНИК AGS 104 OR

Оригіатор

Аспрія Сідс для компанії

Тип

Агросфера ЛТД

Стиглість

простий

Особливості

середньоранній
стійкий до вовчка OR 7

Потенційна врожайність ц/га

52

Вегетаційний період

100 днів

Олійність

50%

Висота рослини

150 сантиметрів

Рекомендована норма висіву

50-55 для посушливих зон

(тисяч зерен/га)

60-65 для зон достатнього

зволоження

65-70 для зрошення



СОНЯШНИК AGS 101 OR



Оригіатор

Аспрія Сідс для компанії

Тип

Агросфера ЛТД

Стиглість

простий

Особливості

ранньостиглий
стійкий до вовчка OR 7

Потенційна врожайність ц/га

54

Вегетаційний період

101 день

Олійність

54%

Висота рослини

165 сантиметрів

Рекомендована норма висіву

50-55 для посушливих зон

(тисяч зерен/га)

60-65 для зон достатнього

зволоження

65-70 для зрошення



СОНЯШНИК AGS 102 CL

Оригіатор

Аспрія Сідс для компанії

Тип

Агросфера ЛТД

Стиглість

простий

Особливості

ранньостиглий
ClearField гібрид стійкий до

імідазолінів



Потенційна врожайність ц/га

53

Вегетаційний період

101 день

Олійність

50%

Висота рослини

150 сантиметрів

Рекомендована норма висіву

50-55 для посушливих зон

(тисяч зерен/га)

60-65 для зон достатнього

зволоження

65-70 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок (за допомогою IMI)					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Стійкий до вовчка
- Висока олійність
- Дуже високий потенціал
- Добре адаптований до північних зон

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Стійкий до водного стресу
- Висока олійність
- Добре адаптується до північних зон

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Висока олійність
- Дуже високий потенціал
- Добре адаптується до північних зон

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок (за допомогою IMI)					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Стійкий до вовчка - 9 (IMI)
- Висока енергія росту на початок періоду
- Висока олійність
- Висока стійкість до грибкових хвороб
- Добре адаптується до північних зон



OR (5, 6, 7) – стійкість до вовчка

* - у нормі до 50 г/га одноразово

Безкоштовний дзвінок: 0 800 20 42 42
www.agrosfera.ua



СОНЯШНИК AGS 106 SU OR

NEW

Оригіатор

Аспрія Сідс для компанії
Агросфера ЛТД
простий
ранньостиглий
стійкий до гербіцидів з д.р.
трибенурон-метил (**Меркурій**)*
стійкий до вовчка OR 5



Тип

Стиглість

Особливості

Потенційна врожайність ц/га

52

Вегетаційний період

101 день

Олійність

50%

Висота рослини

165 сантиметрів

Рекомендована норма висіву
(тисяч зерен/га)

50-55 для посушливих зон
60-65 для зон достатнього
зволоження
65-70 для зрошення



СОНЯШНИК AGS 107 SU OR

NEW

Оригіатор

Аспрія Сідс для компанії
Агросфера ЛТД
простий
середньоранній
стійкий до гербіцидів з д.р.
трибенурон-метил (**Меркурій**)*
стійкий до вовчка OR 6



Тип

Стиглість

Особливості

Потенційна врожайність ц/га

52

Вегетаційний період

104 дні

Олійність

52%

Висота рослини

165 сантиметрів

Рекомендована норма висіву
(тисяч зерен/га)

50-55 для посушливих зон
60-65 для зон достатнього
зволоження
65-70 для зрошення



СОНЯШНИК НС СУМО 2017

Оригіатор

Нові Сад
простий
середньоранній
стійкий до гербіцидів з д.р.
трибенурон-метил (**Меркурій**)

Тип

Стиглість

Особливості

Потенційна врожайність ц/га

45

Вегетаційний період

103-107 днів

Олійність

50%

Висота рослини

170 сантиметрів

Рекомендована норма висіву
(тисяч зерен/га)

55-60 для посушливих зон
60-65 для зон достатнього
зволоження
65-70 для зрошення



СОНЯШНИК AGS 105 CL

Оригіатор

Аспрія Сідс для компанії
Агросфера ЛТД
простий
середньоранній
ClearField гібрид стійкий до
імідазолінонів



Тип

Стиглість

Особливості

Потенційна врожайність ц/га

52

Вегетаційний період

110 днів

Олійність

51%

Висота рослини

160 сантиметрів

Рекомендована норма висіву
(тисяч зерен/га)

50-55 для посушливих зон
60-65 для зон достатнього
зволоження
65-70 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Висока олійність
- Висока стійкість до грибних хвороб
- Високий потенціал
- Добре адаптується до північних зон

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Висока олійність
- Висока стійкість до грибних хвороб
- Високий потенціал
- Добре адаптується до північних зон

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Висока олійність
- Стійкий до водного стресу
- Стійкий до вовчка - OR7

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА ВОВЧКА	5	6	7	8	9
Несправжня борошниста роса					
Фомопсис					
Іржа					
Фомоз					
Вовчок (за допомогою IMI)					
Склеротиніоз кошика					
Склеротиніоз стебла					
Склеротиніоз шийки					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Висока олійність
- Висока стійкість до грибних хвороб
- Високий потенціал



КУКУРУДЗА AGS 501

Оригіатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера ЛТД
Тип	трёхлінійний
Зерно	кременисто-зубоподібне
Потенційна врожайність ц/га	130
ФАО	210
Стиглість	дуже ранній
Рядів у качані	14
Зерен у ряду	38
Висота рослини	235 сантиметрів
Висота кріплення качана	75 сантиметрів
Напрямок використання	зерно, силос, карнаж
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	70-80 для посушливих зон 90-100 для зон достатнього зволоження 100-110 для зрошення



КУКУРУДЗА AGS 502

Оригіатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера ЛТД
Тип	трёхлінійний
Зерно	зубоподібне
Потенційна врожайність ц/га	145
ФАО	250
Стиглість	середньоранній
Рядів у качані	14-16
Зерен у ряду	44
Висота рослини	240 сантиметрів
Висота кріплення качана	50 сантиметрів
Напрямок використання	зерно, силос, карнаж
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	70-80 для посушливих зон 80-90 для зон достатнього зволоження 90-100 для зрошення



КУКУРУДЗА КОРУНД ДН

Оригіатор	Інститут сільського господарства степоної зони НААН України
Тип	трёхлінійний
Зерно	зубоподібне
Потенційна врожайність ц/га	130
ФАО	250
Стиглість	середньоранній
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	32
Висота рослини	250 сантиметрів
Висота кріплення качана	90 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	70-80 для посушливих зон 80-90 для зон достатнього зволоження 90-100 для зрошення



КУКУРУДЗА Білозірський 295 СВ

Оригіатор	Інститут сільського господарства степоної зони НААН України
Тип	трёхлінійний
Зерно	зубоподібне
Потенційна врожайність ц/га	130
ФАО	290
Стиглість	середньоранній
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	36
Висота рослини	270-280 сантиметрів
Висота кріплення качана	105-115 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	45-50 для посушливих зон 65-70 для зон достатнього зволоження 70-75 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	830
Силос (32% сухої речовини)	1405
Зерно (35% вологості)	1605

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Висока виповненість качана

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	880
Силос (32% сухої речовини)	1500
Зерно (35% вологості)	1660

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Високий потенціал

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологості)	1740

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Відносно скоростиглий
- Швидке зневоднення
- Швидкий початковий розвиток

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологості)	1740

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Швидкий початковий розвиток
- Швидке зневоднення



КУКУРУДЗА Подільський 274 СВ

Оригіатор	Інститут сільського господарства степової зони НААН України
Тип	простий
Зерно	зубоподібне
Потенційна врожайність ц/га	125
ФАО	290
Стиглість	середньоранній
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	37
Висота рослини	240-250 сантиметрів
Висота кріплення качана	100-105 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	45-50 для посушливих зон 70-75 для зон достатнього зволоження 75-80 для зрошення



КУКУРУДЗА AGS 503

Оригіатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера ЛТД
Тип	трюхлінійний
Зерно	зубоподібне
Потенційна врожайність ц/га	163
ФАО	300
Стиглість	середньостиглий
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	43
Висота рослини	240 сантиметрів
Висота кріплення качана	65 сантиметрів
Напрямок використання	зерно, силос, карнаж
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	70-80 для посушливих зон 90-100 для зон достатнього зволоження 100-110 для зрошення



КУКУРУДЗА Солонянський 298 СВ

Оригіатор	Інститут сільського господарства степової зони НААН України
Тип	трюхлінійний
Зерно	зубоподібне
Потенційна врожайність ц/га	120
ФАО	310
Стиглість	середньостиглий
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	36
Висота рослини	250-260 сантиметрів
Висота кріплення качана	80-90 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	45-50 для посушливих зон 70-75 для зон достатнього зволоження 75-80 для зрошення



КУКУРУДЗА AGS 504

Оригіатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера ЛТД
Тип	трюхлінійний
Зерно	зубоподібне
Потенційна врожайність ц/га	150
ФАО	320
Стиглість	середньостиглий
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	32
Висота рослини	240 сантиметрів
Висота кріплення качана	70 сантиметрів
Напрямок використання	зерно, силос, карнаж
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	70-80 для посушливих зон 80-90 для зон достатнього зволоження 90-100 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологості)	1740

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стиглість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

	5	6	7	8	9
Стиглість до фузаріозу					
Стиглість до пухирчастої сажки					
Стиглість до летючої сажки					
Стиглість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Дуже стійкий при перестойі і може використовуватись для зимового збирання
- Найбільш посухостійкий гібрид з високою врожайністю в степу України
- Відносно скоростиглий
- Швидкий початковий розвиток
- Швидке зневоднення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	895
Силос (32% сухої речовини)	1560
Зерно (35% вологості)	1710

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стиглість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

	5	6	7	8	9
Стиглість до фузаріозу					
Стиглість до пухирчастої сажки					
Стиглість до летючої сажки					
Стиглість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Високорослий гібрид
- Добрий стан стебла у кінці циклу
- Розвинений габітус

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологості)	1740

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стиглість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

	5	6	7	8	9
Стиглість до фузаріозу					
Стиглість до пухирчастої сажки					
Стиглість до летючої сажки					
Стиглість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Найбільш розповсюджений гібрид вітчизняної селекції
- Швидкий початковий розвиток
- Національний стандарт в офіційному сортопробуванні України
- Швидке зневоднення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	895
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологості)	1710

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі (Stay green)					
Енергія початкового росту					
Стиглість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ

	5	6	7	8	9
Стиглість до фузаріозу					
Стиглість до пухирчастої сажки					
Стиглість до летючої сажки					
Стиглість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Високий потенціал



КУКУРУДЗА АКВОЗОР ДН

Оригіатор	Інститут сільського господарства степоної зони НААН України
Тип	простий
Зерно	зубоподібне
Потенційна врожайність ц/га	130
ФАО	320
Стиглість	середньостиглий
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	40-45
Висота рослини	205-215 сантиметрів
Висота кріплення качана	80-90 сантиметрів
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	70-80 для посушливих зон 80-90 для зон достатнього зволоження 90-100 для зрошення



КУКУРУДЗА AGS 505

Оригіатор	Аспрія Сідс для компанії Агросфера ЛТД
Тип	простий
Зерно	кременисто-зубоподібне
Потенційна врожайність ц/га	154
ФАО	340
Стиглість	середньостиглий
Рядів у качані	16
Зерен у ряду	32
Висота рослини	260 сантиметрів
Висота кріплення качана	100 сантиметрів
Напрямок використання	зерно, силос, карнаж
Рекомендована норма висіву (тисяч зерен/га)	70-80 для посушливих зон 80-90 для зон достатнього зволоження 90-100 для зрошення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологості)	1740

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Низька збиральна вологість зерна
- Швидкий початковий розвиток
- Відносно скоростиглий
- Швидке зневоднення

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІД ПРЯМИЙ ПОСІВ

СУМА ЕФЕКТИВНИХ ТЕМПЕРАТУР (БАЗА 6 ГРАДУСІВ С)

До цвітіння	890
Силос (32% сухої речовини)	1510
Зерно (35% вологості)	1740

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5	6	7	8	9
Достигання на зеленому стеблі					
Енергія початкового росту					
Стійкість до вилягання					
Посухостійкість					
Холодостійкість					
Вологовіддача					

СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ	5	6	7	8	9
Стійкість до фузаріозу					
Стійкість до пухирчастої сажки					
Стійкість до летючої сажки					
Стійкість до гельмінтоспориозу					

ПЕРЕВАГИ ГІБРИДУ

- Середньорослий гібрид
- Добрий стан стебла у кінці циклу
- Висока невибагливість

ДЛЯ НОТАТОК:

ГЕРБІЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ОДНОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ І ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ В ПОСІВАХ БОБОВИХ КУЛЬТУР ТА СОНЯШНИКУ, СТІЙКОГО ДО ГЕРБІЦИДІВ З ХІМІЧНОЇ ГРУПИ ІМІДАЗОЛІНОНИ.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: імазамокс, 40 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ: Пластикові каністри 10л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Максимально широкий спектр знищення злакових та дводольних бур'янів, в тому числі всіх рас вовчка.
- Новий стандарт захисту ІМІ-соняшнику.
- Більший ефект – менша післядія.
- Має контактнo-системну та ґрунтову дію, при достатній вологості ґрунту стримує появу наступних хвиль бур'янів
- Висока вибірковість по відношенню до культурних рослин.
- Сумісний в бакових сумішах з інсектицидами, фунгіцидами, регуляторами росту та мікродобривами.
- Стимує багаторічні бур'яни, в тому числі осот жовтий і пирій повзучий

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Імазамокс, як і інші гербіциди групи імідазолінонів, проникає в бур'яни через коріння і листя і пересувається по флоємі і ксилемі, накопичуючись в меристематичних ділянках. У чутливих рослин інгібує фермент ацетолактатсинтазу, що призводить до зниження в рослинних тканинах рівня амінокислот – валіну, лейцину і ізолейцину – з подальшим порушенням синтезу білка і нуклеїнових кислот. Ріст чутливих бур'янів зупиняється вже через кілька годин після обробки.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ МОЛТЕНО, РК

Культура	Шкідливий об'єкт	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб, час обробки, обмеження	Кратність обробок
Горох	Злакові та двосім'ядольні бур'яни	0,75-1,0	Обприскування посівів у фазу 3-5 справжніх листків у культури (злакові бур'яни у фазі 1-3 листки, дводольні – 2-4 листки)	1
Соє		0,75-1,0	Обприскування посівів у фазу 2-3 трійчастих листка у культури (злакові бур'яни у фазі 1-3 листки, дводольні – 2-4 листки)	
Соняшник		1,0-1,2	Обприскування посівів у фазі від 2 до 8 справжніх листків у культури (злакові бур'яни у фазі 1-3 листки, дводольні – 2-4 листки)	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ МОЛТЕНО, РК

Як правильно проводити обробку препаратом?

Обробку слід проводити на ранніх стадіях росту бур'янів при оптимальній вологості повітря і ґрунту з низьким робочим тиском оприскувача, робочий розчин потрібно рівномірно нанести на поверхню поля. Для ефективної ґрунтової дії препарату, ґрунт повинен бути вологим та мати дрібногрудкувату структуру.

Які візуальні ознаки гербіцидної дії препаратом?

Зазвичай ознаками дії гербіциду є хлороз молодого листя і відмирання точок росту.

Взаємодія гербіциду Молтено, РК з іншими препаратами:

- Забороняється застосовувати спільно з фосфорорганічними інсектицидами (Ріфос, КЕ)
- Не допускається спільне внесення з грамїніцидами
- Після обробки препаратом протягом усього сезону забороняється застосування гербіцидів з групи сульфонілсечовин
- Для кращого контролю стійких та перерослих бур'янів в посівах бобових культур можна застосовувати бакову суміш з гербіцидом Ефес, РК

Застереження!

Після застосування препарату можна висівати:

- через 4 місяці – пшениця озима;
- через 9 місяців – пшениця яру, овес, ячмінь ярий та озимий;
- через 11 місяців – кукурудзу, соняшник, сорго, рис;
- через 16 місяців – цукрові та кормові буряки, ріпак озимий та ярий, овочеві культури.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас небезпечності (малотоксичний), небезпечний для водних організмів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 3 роки з дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: від +1°C до +35°C

	Оптимальні температури для застосування		Приготування робочого розчину
	Від +15 до +25°C		Рекомендована норма витрати робочого розчину при наземних обробках – 200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Опади, що випали через 1 годину після застосування, не знижують ефективності препарату.		Не проводити обприскування при швидкості вітру більше 5 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

- Нут – 0,75-1,0 л/га. Обприскування посівів в ранні фази росту бур'янів (1-3 справжніх листків) і 1-3 справжніх листків культури.
- Люцерна – 1,0 л/га. Обприскування посівів в фазу 1-4 трійчастих листка, в ранні фази росту бур'янів
- Люпин – 1,0 л/га. Обприскування ґрунту до сходів, після посіву культури
- Конюшина – 0,75-1,0 л/га. Обприскування посівів до сходів, після посіву культури, або в фазі 1-2 трійчастих листки в ранні фази росту бур'янів



Agrosfera®

Територія професійного захисту

- ✓ Покупка за лічені хвилини
- ✓ Онлайн чат з агрономом
- ✓ Зручний пошук
- ✓ Готові системи захисту сільськогосподарських культур
- ✓ Незамінний помічник агрономів та власників господарств



Безкоштовні дзвінки 0 800 20 42 42 • www.agrosfera.ua

2019

Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД	ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД	ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД	ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД	ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД	ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6	1 2 3	1 2 3	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5	1 2
7 8 9 10 11 12 13	4 5 6 7 8 9 10	4 5 6 7 8 9 10	8 9 10 11 12 13 14	6 7 8 9 10 11 12	3 4 5 6 7 8 9
14 15 16 17 18 19 20	11 12 13 14 15 16 17	11 12 13 14 15 16 17	15 16 17 18 19 20 21	13 14 15 16 17 18 19	10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27	18 19 20 21 22 23 24	18 19 20 21 22 23 24	22 23 24 25 26 27 28	20 21 22 23 24 25 26	17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31	25 26 27 28	25 26 27 28 29 30 31	29 30	27 28 29 30 31	24 25 26 27 28 29 30

Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД	ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД	ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД	ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД	ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД	ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4	1	1 2 3 4 5 6	1 2 3	1
8 9 10 11 12 13 14	5 6 7 8 9 10 11	2 3 4 5 6 7 8	7 8 9 10 11 12 13	4 5 6 7 8 9 10	2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21	12 13 14 15 16 17 18	9 10 11 12 13 14 15	14 15 16 17 18 19 20	11 12 13 14 15 16 17	9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28	19 20 21 22 23 24 25	16 17 18 19 20 21 22	21 22 23 24 25 26 27	18 19 20 21 22 23 24	16 17 18 19 20 21 22
29 30 31	26 27 28 29 30 31	23/30 24 25 26 27 28 29	28 29 30 31	25 26 27 28 29 30	23/30 24/31 25 26 27 28 29

Дніпропетровська обл.
(067) 635 15 94

Вінницька обл.
(067) 634 89 56

Житомирська обл.
(067) 635 02 48

Запорізька обл.
(067) 635 14 42

Київська обл.
(067) 841 61 51

Кіровоградська обл.
(067) 635 14 89

Миколаївська обл.
(067) 635 08 61

Херсонська обл.
(067) 635 02 40

Одеська обл.
(067) 635 01 46

Полтавська обл.
(067) 635 89 26

Сумська обл.
(067) 635 24 84

Харківська обл.
(067) 635 24 84

Хмельницька обл.
(067) 635 02 48

Черкаська обл.
(067) 635 12 97

Чернігівська обл.
(067) 560 85 16

