

# АЛЬТЕКС®

**АЛЬТЕКС** – піретроїдний інсектицид контактно-шлункової дії для захисту широкого спектру культур від комплексу шкідників. Активний компонент препарату викликає параліч нервової системи і внаслідок цього загибель комах. Піретроїди застосовують для швидкого зниження чисельності шкідливих комах – вони мають сильний «нокдаун – ефект», за механізмом дії є контактними препаратами.

**Склад:** Альфа-циперметрин, 100 г/л.

**Упаковка:** 3 мл та 15 мл (емульгуючий концентрат).

**Переваги препарату:**

- **Миттєва дія та надійний ефект**
- **Знищення широкого спектра шкідників на багатьох культурах**
- **Дія не залежить від стадії розвитку комах**

**АЛЬТЕКС** високоактивний проти абсолютної більшості комах – шкідників, застосовується на багатьох с/г культурах.

**АЛЬТЕКС** застосовується в малих дозах, стійкий до змивання дощем, безпечний для бджіл, оскільки має по відношенню до них яскраво виражений репелентний ефект.

**АЛЬТЕКС** набагато ефективніше знищує личинок лускокрилих (метеликів) ніж неонікотинοїди (імідаклоприд, тіаклоптід, тіаметоксам, клотіанідін).

**Оптимальна температура застосування від +10°C до +25°C**

## Інсектицид



**Рекомендації щодо застосування:**

| Культура                                    | Шкідник                                   | Норма витрати     | Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів | Максимальна кратність обробок |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Капуста                                     | Міль, совки, білани                       | 3 мл на 10 л води | 30                                               | 2                             |
| Пасльонові<br>(Картопля, томати, баклажани) | Колорадський жук                          | 3 мл на 10 л води | 20                                               |                               |
| Яблуня                                      | Плодожерки, листовійки, попелиці, щитівки | 3 мл на 10 л води | 45                                               |                               |

**Норми витрати:**

Вміст пакету з препаратом розвести в 10 л води. Розчин готувати безпосередньо перед застосуванням в кількостях, необхідних для обробки.

Витрата робочого розчину при обробці капусти і пасльонових: 5 л на сотку, на яблуні: 2 л на молоді, 5 л на дорослі дерева.

Обробку проводять свіжоприготовленим розчином в безвітряну суху погоду, краще в ранковий або вечірній час, коли відсутній літ бджіл. Обробку проводять обприскувачем, досягаючи рівномірного покриття розчином листя і стебел. Препарат має репелентні (відлякуючі) властивості по відношенню до корисних комах, тому після обробки інсектицид безпечний для бджіл.

**Світовий досвід застосування, городні культури:**

Препарати з аналогічною дією речовиною використовуються для захисту столових та цукрових буряків (довгоносики, попелиці), гороху (зернівка горохова, попелиці, трипси).

**Світовий досвід застосування, декоративні культури та газон:**

| Культура       | Шкідник                                                 | Норма витрати     | Період обробки                                                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хвойні рослини | Пильщик, п'ядун сосновий, шкідники шишок                | 3 мл на 10 л води | Профілактична обробка: навесні та восени.<br>Лікувальна: на протязі всього вегетаційного сезону |
| Троянди        | Розанна цикадка, трояндова листовійка, розанна попелиця |                   |                                                                                                 |