

# ДЕСТРОЙ®

ДЕСТРОЙ – системно-контактний, надзвичайно потужний інсектицид, що містить дві діючі речовини.

Склад: Імідаклоприд, 250 г/л + Лямбда-цигалотрин, 80 г/л.

Упаковка: 3 мл, 20 мл та 100 мл (концентрат суспензії).

Переваги препарату:

- **Висока швидкість дії**
- **Ефективне знищення «проблемних» шкідників, таких як колорадський жук, оленка волохата, яблунева плодожерка та ін.**
- **Тривалий захисний період**
- **Відсутність звикання шкідників до препарату**
- **Ефективність за низьких температур**

Препарат відрізняється широким спектром знищуваних шкідників, має побічну дію на дорослі стадії кліщів.

На відміну від інших інсектицидів ефективно діє при підвищених і низьких температурах і посушливих умовах. Захисний період становить понад 20 днів. Контактна діюча речовина проникає через кутикулу шкідників, приводячи до їх загибелі (нокдаун – ефект). Системно діюча речовина протягом години потрапляє в рослину, де накопичується в точках росту, забезпечуючи тривалий захист всієї рослини і молодих підростаючих пагонів.

Оптимальна температура застосування від +10°C до +25°C

## Інсектицид



### Рекомендації щодо застосування:

Культура	Шкідник	Норма витрати	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Пасльонові (Картопля, томати, баклажани)	Колорадський жук	3 мл на 10 л води	30	2
Яблуна	Плодожерки, листовійки, попелиці, щитівки			
Капуста	Білани, капуста міль, совка, попелиця, блішки			
Виноградники	Листкова філоксера, багатодіний трубокочрут			
Цибуля	Цибулева муха, трипси			

**Норми витрати:** Вміст пакету, 3 мл розвести в 10 л води. Розчин готувати безпосередньо перед застосуванням в кількостях, необхідних для обробки. Витрата робочого розчину при обробці пасльонових: 5 л на сотку, на яблуні: 2 л на молоді, та 5 л на дорослі дерева.

**Фази внесення:** на овочах – перші ознаки появи шкідників; яблуна – 2 обробки: 1-ша при величині центральної зав'язі – горошина, 2-га – лісовий горіх

**Світовий досвід застосування, городні культури:** Препарати з аналогічною діючою речовиною використовуються для захисту столових та цукрових буряків (довгоносики, блішки, попелиці, щитоноски), гороху (зернівка горохова, попелиці, горохова плодожерка).

### Світовий досвід застосування, декоративні культури та газон:

Культура	Шкідник	Норма витрати	Період обробки
Хвойні рослини	Пагов'юн, хермес, попелиця, борошнистий червець, щитівка та ложнощитівка, стовбурові шкідники	3 мл на 10 л води	На протязі всього сезону вегетації
Троянди	Розана цикадка, трояндова листовійка, розанна попелиця, акацієва ложнощитівка		
Газон	Мурахи, цикадки, блішки, попелиці		За необхідністю
Декоративні рослини	Цикадки, блішки, попелиці, мінуоча міль, стовбурові шкідники		На протязі всього сезону вегетації