

IN CET® **NEW**

IN CET (протруйник) – поєднує в собі надзвичайно ефективний захист картоплі, овочів, саду від шкідників одночасно з «антистресовим» ефектом стимуляції рослин. Вперше в Україні втричі більша концентрація.

Склад: Імідаклопрід, 700 г/кг.

Упаковка: 5 г та 30 г (гранули, що диспергуються у воді).

Для обробки: 30 та 180 кг картоплі відповідно.

Переваги препарату:

- **30 г препарату достатньо для протруєння 180 кг картоплі**
- **Захист від колорадського жука з появи сходів до цвітіння**
- **Знищення ґрунтових шкідників**
- **Висока швидкість дії**
- **Безпечний для корисних комах та навколишнього середовища**
- **Можливість застосування з фунгіцидними препаратами**

Це препарат для обробки бульб картоплі перед посадкою та замочування кореневої системи овочевих культур. Запобігає поширенню таких шкідників як колорадський жук, дрітляники, несправжні дрітляники, личинки хрущів, цикадки, попелиці, трипси, молі, блішки. При цьому контроль над шкідниками здійснюється з самого початку вегетації та, як мінімум, до кінця цвітіння картоплі, а овочів – щонайменше 30 днів з дня замочування. Діюча речовина препарату рухається по рослині тільки знизу вгору, тому не може потрапляти в молоді бульби!

IN CET має в своєму складі прилипач, що дозволяє рівномірно і надійно розподілити препарат по оброблюваній поверхні, і запобігає його осипання після висихання бульб.

Оптимальна температура застосування від +10°C до +25°C

Протруйник



Рекомендації щодо застосування:

Культура	Шкідник	Норма витрати	Спосіб обробки
Картопля	Колорадський жук	5 г на 0,3 л води на 30 кг картоплі 30 г на 1,8 л води на 180 кг картоплі	Розкласти посадковий матеріал одним шаром і рівномірно обробити робочим розчином за допомогою обприскувача, перемішати, дати обсохнути і висадити в ґрунт
Насіння капусти, моркви, цибулі	Блішки, капустяна муха, морквяна муха, морквяна листоблішка, цибулева муха, трипси	2,5 г препарату на 100 мл води на 1 кг насіння	Насіння розкласти одним шаром і рівномірно обробити робочим розчином за допомогою обприскувача, перемішати, дати обсохнути

Світовий досвід застосування:

Приготування бовтанки при посадці саду: 5 г препарату + 1 л води + 0,7 кг глини + 0,8 кг перегною – (консистенція сметана) – вистачає для обробки кореневої системи 25-30 саджанців (личинки жуків, дротяників, капустянка, попелиця, щитівки).

Світовий досвід застосування декоративні культури та газон:

Культура	Шкідник	Норма витрати	Період обробки	Максимальна кратність обробок
Газон	Капустянка, дротяники, личинки хруща, земляні бджоли	5 г на 10 л води	На протязі всього сезону вегетації	За необхідністю
Хвойні, декоративні рослини, троянди	Капустянка, дротяники, личинки хруща, земляні бджоли, галові нематоди троянд, трипси			

Замочування кореневої системи розсади овочевих культур:

25 г препарату на 10 л води – (томат, перець, баклажан, капуста від дротяників, капустянки, колорадського жука, трипсів, попелиці, капустяної молі, хрестоцвітних блішок) в розчині препарату при температурі +18 ... +20°C протягом 4-5 годин.

Робочий розчин готується безпосередньо перед застосуванням, період захисної дії становить близько 30 днів.