

ВУЛКАН® ПЛЮС

ВУЛКАН ПЛЮС – гербіцид суцільної дії для повного знищення однорічних та багаторічних злакових та двосім'ядольних бур'янів (осоту, берізки, пирію та ін.).

Склад: Гліфосат у формі ізопропіламінної солі, 480 г/л.

Упаковка: 100 мл (розчинний концентрат).

Переваги препарату:

- **Знищення кореневої системи багаторічних бур'янів**
- **Простота боротьби з бур'янами**
- **Низький рівень піноутворення**
- **Низька чутливість до жорсткості води**

Гліфосат проникає у рослину через надземну її частину та активно розноситься по всіх органах, у тому числі і у коріння. Бур'яни гинуть за рахунок поліпшеної формуляції **ВУЛКАНУ ПЛЮС** вже через 4-8 діб. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються через 3-5 днів, спочатку у вигляді пожовтіння, потім в'янення листя.

III клас небезпечності (малотоксичний). Нетоксичний для бджіл.

Оптимальна температура застосування від +15°C до +25°C

Гербіцид



Рекомендації щодо застосування:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, мл на сотку	Максимальна кратність обробок
Пари	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	20-40	1
	Багаторічні бур'яни	40-60	
На присадибних ділянках призначених під посів і висадку овочевих культур, обробка міжрядь плодових садів та виноградників	Однорічні бур'яни	20-40	
	Багаторічні бур'яни	40-60	

Норми витрати:

З пляшки відібрати об'єм препарату, необхідний для обробки 1 сотки і розвести в 5 літрах води. Розчин готувати безпосередньо перед застосуванням в кількостях, необхідних для обробки. Витрата робочого розчину при обробці присадибних ділянок під посів і посадку овочевих культур – 5 л на сотку. Обприскування проводити по вегетуючих бур'янах в період їх інтенсивного росту. При проведенні боротьби з однорічними бур'янами норму встановлюють залежно від висоти рослин (5-10 см – 20-30 мл/сотку, більше 10 см – 30-40 мл/сотку). Для багаторічних бур'янів норму 40-50 мл/сотку застосовують в період відростання, в більш пізні фази розвитку вона повинна відповідати максимальній – 50-60 мл/сотку.

Світовий досвід застосування:

Препарати з аналогічною діючою речовиною використовуються для знищення бур'янів на присадибних ділянках під посів і посадку овочевих культур та картоплі; для знищення бур'янів в садах, виноградниках та ягідниках за умови захисту культурних рослин.