

ДРУЖНЕ ЦВІТІННЯ

ДРУЖНЕ ЦВІТІННЯ – регулятор росту для овочевих, ягідних, плодових дерев, винограду та квітів.

Склад: Екстракт морських водоростей 150г/л, амінокислоти – 6г/л, індолілмасляна кислота, гіберелін, бурштинова кислота, солі гумінових і фолієвих кислот (0,05-0,5г/л) та допоміжна складова: N-10%, P(2)O(5)-10%, K(2)O-10% та мікроелементи: MgO, B, Cu (EDTA), Mn (EDTA), Fe (EDTA), Mo (молібдат), Zn (EDTA)-(0,008-0,15%).

Упаковка: 250 мл (рідина).

Переваги регулятору росту:

- Стимулює активність
- Збільшує масу надземної частини
- До складу регулятору росту входить азот, фосфор та калій – важливі елементи для коригування та регулювання процесів живлення
- Підсилює системні реакції стійкості рослин
- Підвищує імунітет
- Активізує поділ клітин, ріст кореня, цвітіння та плодоношення
- Оптимізує та відновлює функції ослабленої рослини та підсилює ріст рослини у нормальних умовах
- Рекомендований для застосування в бакових сумішах, для покращення ефективності обробки
- Екологічно безпечне

Регулятор росту



У процесі росту і розвитку, рослини часто піддаються стресам, викликаним як природними умовами (заморозки, низькі і високі температури, град, посуха, затоплення, засолення і т.д.), так і інфекційними захворюваннями та шкідниками, які можуть призводити до погіршення якості і навіть загибелі рослин.

Регулятор росту містить:

- Полісахариди, які покращують проникнення поживних речовин і води в клітині рослин, а також є джерелом запасу енергії. Основна їхня функція – підвищення природного порогу опірності захворюванням та потовщення стінок клітин.
- Амінокислоти стимулюють метаболічні процеси, засвоєння поживних речовин і самі є готовим енергетичним резервом для біологічного процесу росту і розвитку. Також вони виконують транспортні функції з доставки поживних речовин при листовому підживленні, системи поглинання води, підвищують стійкість рослин до низьких та високих температур.
- Глутамінова кислота, яка входить до складу **ДРУЖНЕ ЦВІТІННЯ**, впливає на пори рослин, відновлює їх функціонування в стресових умовах є підсилювачем метаболічної ефективності сільськогосподарських культур, допомагаючи їм досягти свого генетичного потенціалу і тим самим підвищити якість і урожайність.
- Індолілмасляна кислота, гормон, який стимулює утворення коренів у рослин.

Рекомендації щодо застосування:

Культура	Норма витрати препарата на 1 сотку	Спосіб та час обробки
Кореневе живлення		
Овочеві, ягідні	Розчинити 10 мл у 10 л води	1 раз на 10-15 днів
Виноград, плодові, декоративні дерева		
Квіти (з березня по вересень)		
Квіти кімнатні (в зимку та восени)		1 раз на 3 тижні
Листкове живлення		
Овочеві, ягідні	Розчинити 5 мл у 10 л води	1 раз на 15-20 днів
Виноград, плодові, декоративні дерева		
Квіти (з березня по вересень)		
Квіти кімнатні (в зимку та восени)		1 раз на 4 тижні

Рекомендовано до застосування при підживленні всіх культур протягом вегетації.

Найкращий ефект застосування препарату **ДРУЖНЕ ЦВІТІННЯ** досягається при його сумісному внесенні з повним мінеральним добривом при позакореновому підживленні рослин. Також доцільно використовувати препарат у складі бакової суміші з мікродобривами та засобами захисту рослин для досягнення максимального ефекту від обробки.

Культура	Норма витрати препарату на 1 сотку	Спосіб та час обробки
Картопля	10-15 мл на 5 л води	Обприскування в період активного росту рослин, до початку цвітіння 1-2 рази з інтервалом 10 -15 днів