



Standard  
Стандартна серія

# Канцлер®, ВГ

**ГЕРБІЦИД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА КУКУРУДЗИ**

**ДІЮЧА РЕЧОВИНА:**

тифенсульфурон-метил, 750 г/кг

**ФОРМУЛЯЦІЯ:**

гранули, що диспергуються у воді

**УПАКУВАННЯ:**

250 г у пластиковій пляшці

**ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:**

- Знищення широкого спектру двосім'ядольних бур'янів
- Широке вікно застосування
- Відсутність обмежень у вивозі
- Нешкідливий для теплокровних

**МЕХАНІЗМ ДІЇ:**

Діюча речовина гербіциду проникає у рослини через листя, стебла та корені, поглинається ними і пересувається по рослині через флоему та ксилему і накопичується у точках росту, припиняючи поділ клітин, ріст пагонів та коріння. Наявні симптоми дії препарату (знебарвлення, пожовтіння) з'являються вже через декілька днів, а повний гербіцидний ефект настає за 2-3 тижні. Малочутливі та перерослі бур'яни можуть не загинути, проте їх ріст і подальший розвиток припиняються. Ефективність гербіцидної обробки підвищується при теплій вологій погоді, а при сухій та холодній - уповільнюється.



Найчутливіші бур'яни	Помірночутливі бур'яни	Стийкі бур'яни
<ul style="list-style-type: none"> <li>• вероніка види</li> <li>• вика посівна</li> <li>• гібіскус трійчастий</li> <li>• гірчак види</li> <li>• гірчиця чорна та польова</li> <li>• грицики звичайні</li> <li>• жабрій види</li> <li>• зірочник середній</li> <li>• канатник Теофраста</li> <li>• комеліна види</li> <li>• кропива види</li> <li>• курай</li> <li>• лобода біла</li> <li>• лобода гібридна</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• лутига розлога</li> <li>• незабудка польова</li> <li>• нетреба види</li> <li>• портулак городній</li> <li>• приворотень</li> <li>• редька види</li> <li>• роман собачий</li> <li>• ромашка види</li> <li>• рутка лікарська</li> <li>• соняшник однорічний</li> <li>• талабан польовий</li> <li>• фіалка види</li> <li>• щавель (види)</li> <li>• щиріця (види)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• амброзія полинолиста (до 2-х листочків)</li> <li>• мак дикий</li> <li>• осот польовий</li> <li>• підмаренник чіпкий</li> <li>• рутка лікарська</li> <li>• берізка польова</li> <li>• дурман звичайний</li> <li>• паслін чорний</li> </ul>

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

**ГЕРБІЦИД КАНЦЛЕР, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:**

Культура	Строк обробки	Норма витрати препарату, г/га
Пшениця озима	Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури включно	15-20 г/га + ПАР Флокс, РК
Ячмінь ярий	Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до виходу в трубку культури	10-15 г/га + ПАР Флокс, РК
Кукурудза	У фазі 3-7 листків кукурудзи	10 г/га + ПАР Флокс, РК або 15 г/га без ПАР Флокс, РК



**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

- Не застосовувати Канцлер, ВГ на насінневі кукурудзі.
- Не застосовувати Канцлер, ВГ, якщо температура в ніч перед внесенням була нижче, ніж +6°C, або ж очікувана у день внесення чи у день після обробки вище +25°C.
- Не застосовувати Канцлер, ВГ на полях кукурудзи, що були чи будуть оброблені системними фосфорорганічними інсектицидами протягом 14 днів.
- Застосовуйте Канцлер, ВГ один раз на сезон з нормою витрати не більше 25 г/га.

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ КАНЦЛЕР, ВГ:**

**Який період захисної дії препарату Канцлер, ВГ?**

Канцлер, ВГ володіє гербіцидним ефектом по відношенню до двосім'ядольних бур'янів до 30 діб.

**Коли треба застосовувати Канцлер, ВГ для досягнення максимальної гербіцидної ефективності?**

Слід пам'ятати, що максимальна ефективність препарату досягається при застосуванні його в ранні фази (2-4 листки для однорічних рослин) розвитку бур'янів. При застосуванні препарату в більш пізні строки суттєво затримується тільки ріст та розвиток бур'янів.

**Як швидко Канцлер, ВГ може знищити оброблені ним бур'яни?**

Ріст чутливих рослин призупиняється через декілька годин, перші ознаки гербіцидного ефекту спостерігаються через 5-10 діб, повна загибель - 15-25 діб.

**Чи можна використовувати Канцлер, ВГ у бакових сумішах з іншими гербіцидами?**

З метою посилення гербіцидної дії препарату можливе його використання в сумішах з іншими препаратами. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з врахуванням видового складу та чисельності бур'янів в посівах. Проте доцільно перед виробничим використанням сумішей гербіцидів провести попередню перевірку сумісності з конкретним препаратом. При використанні у посівах льону не використовувати з грамініцидами та ПАР Флокс, РК - це може викликати фітотоксичність. Не застосовувати після внесення препарату Юпітер, РК у посівах сої.

**Для підвищення ефективності**

Якщо посіви зріджені, за високої чисельності та наявності стійких бур'янів, а також в жарку, суху погоду, слід обов'язково використовувати поверхнево-активну речовину Флокс, РК, що покращує змочування бур'янів робочим розчином і, таким чином, покращує гербіцидний ефект.

**КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:**

III клас (малотоксичний). Малотоксичний для теплокровних. Малонебезпечний для риб та птахів. Нетоксичний для бджіл.

**ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:**

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

**ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:** Від -10°C до +35°C

	<b>Оптимальні температурні умови застосування</b>		<b>Приготування робочого розчину</b>
	Від +6°C до +25°C		200-400 л/га. В разі високого рівня забур'яненості потрібно врахувати максимальну норму витрати робочої рідини
	<b>Погодні умови в період застосування</b>		
	Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Дощ протягом 2-3 годин після застосування може знизити ефективність дії препарату		

**СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:**

Культура	Строк обробки	Норма витрати препарату, г/га
Соя	Після розкриття першого трійчастого листка до початку бутонізації культури, бур'яни: у фазі 2-4 листки, капустяні до 15 см	6-8 г/га + ПАР Флокс, РК, 200 мл/га
Льон-довгунець, льон олійний	5-12 см (фаза ялинки)	15-25 г/га

**ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:**

- Кукурудза: Канцлер, ВГ (10 г/га) + Крейсер, ВГ (30-50 г/га) + ПАР Флокс, РК (200 мл/га)
- Кукурудза: Канцлер, ВГ (10 г/га) + Дікам Плюс, РК (0,75 л/га) + ПАР Флокс, РК (200 мл/га)
- Соя: Канцлер, ВГ (6-8 г/га) + Ефес, РК (1,5-2,0 л/га)



Гербіциди