

# Вулкан® Плюс, РК

ГЕРБИЦИД СУЦІЛЬНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПОВНОГО  
ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ  
ЗЛАКОВИХ ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ



## ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

гліфосат у формі ізопропіламіної солі, 480 г/л

## ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинний концентрат

## УПАКУВАННЯ:

20 л пластикова канистра

## ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Легкий шлях до чистого поля
- Низький рівень піноутворення
- Зменшена чутливість до рівня жорсткості води
- Можливість авіаційних внесень

## МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гліфосат є інгібітором ферментативної системи, яка відповідає за синтез необхідних для життєдіяльності рослин ароматичних амінокислот. Гліфосат поглинається надземною частиною рослин та активно розноситься по всіх органах, у тому числі і в коріння. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються через 2-4 дні, спочатку у вигляді пожовтіння, потім – в'янення листя.

## СПЕКТР ДІЇ ГЕРБИЦИДУ ВУЛКАН ПЛЮС, РК:

Здатний повністю знищувати однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни.

## ГЕРБИЦИД ВУЛКАН ПЛЮС, РК ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ:

| Культура   | Шкідливі об'єкти                            | Норми витрати препарату, л/га |                        | Максимальна кратність обробок |
|--|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|  |   | наземним устаткуванням        | авіацією (літаки АН-2) |                               |
| Пари   | Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни | 2,0-4,0                       | 6,0                    | 1                             |
|  | Багаторічні бур'яни                         | 4,0-6,0                       |                        |                               |
| Поля, призначені під посіви ярих зернових  | Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни | 2,0-4,0                       | 6,0                    | 1                             |
|  | Багаторічні бур'яни                         | 4,0-6,0                       |                        |                               |
| Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насапи) | Однорічні та багаторічні рослини            | 3,0-6,0                       |                        |                               |

## ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБИЦИДУ ВУЛКАН ПЛЮС, РК:

### Як правильно встановити норму витрати препарату?

Норма витрати препарату встановлюється залежно від видового складу бур'янів, їх фізіологічного стану, прогнозованої ефективності гербіцидної обробки та погоднo-кліматичних умов проведення обприскування. Мінімальні норми витрати використовуються при домінуванні чутливих видів бур'янів.

### Коли саме слід застосовувати препарат восени чи навесні?

Гербіцид Вулкан Плюс, РК застосовують восени після збирання попередника до проведення основної обробки ґрунту та навесні на полях, призначених під сівбу ярих культур, за 14 днів до проведення передпосівної культивування.

### Яким чином можна досягти максимальної ефективності від застосування препарату?

Найбільший гербіцидний ефект від застосування препарату досягається за умов теплої погоди. Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площі і рясне змочування рослин під час внесення препарату.

### Коли бур'яни найчутливіші до гербіциду?

До препарату найчутливіші однорічні бур'яни в період їх активного росту і розвитку, багаторічні – у період відростання та активного росту.

## КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Нетоксичний для бджіл.

## ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

## ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від +1°C до+ 35°C

| Оптимальні температурні умови застосування  | Приготування робочого розчину  |
|---|--|
| Від +15°C до +25°C  | при наземному застосуванні – 200-400 л/га<br>при авіаційному – 50 л/га |
| Погодні умови в період застосування   |  |
| Умовою ефективною дії Вулкан Плюс, РК є відсутність опадів після внесення препарату протягом 3 годин. Препарат доцільно застосовувати у вечірні години або вранці |  |

## СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТИВ-АНАЛОГІВ:

| Культура                | Спосіб внесення  | Бур'яни                                  | Норма внесення, л/га | Максимальна кратність обробок |
|-------------------------|--|--|----------------------|-------------------------------|
| Плодові та виноградники | Направлене обприскування вегетуючих бур'янів весною або влітку                     | Однорічні злакові та дводольні бур'яни   | 2,0-4,0              | 1                             |
|                         |  | Багаторічні злакові та дводольні бур'яни | 4,0-8,0              |                               |
| Картопля                | Обприскування до сходів культури   | Однорічні та багаторічні бур'яни         | 2,0                  | 1                             |
| Лісове господарство     | Обприскування вегетуючих бур'янів при підготовці поля під хвойні та листяні породи |  | 2,0-4,0              |                               |

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для обприскування вегетуючих бур'янів на полях, призначених під посіви соняшнику, ріпаку, люцерни, багаторічних трав, хмелю, цукрових буряків, овочевих, сої, льону, баштанних культур.

## ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га) + Сулам, СЕ (0,4 л/га)
- Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га) + Шквал, КЕ (0,5 л/га)