



Територія професійного захисту



ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН



Компанія **Agrosfera** провідна українська компанія, яка веде свою діяльність з 2001 року. Наші висококваліфіковані фахівці постійно розробляють інноваційні рішення для потреб сільгоспвиробників.

Основні напрямки діяльності компанії є розробка, виробництво та продаж:

- Засобів захисту рослин
- Мікродобрив
- Регуляторів росту рослин
- Посівного матеріалу, а саме: гібриди кукурудзи та соянишнику

На сьогодні асортимент Компанії налічує 61 препарат, вісім із-поміж них – унікальні. Серед інноваційних розробок – продукти для зернових, сої, кукурудзи та технічних культур:

- протруйники ГАЛЕОН, ПЕНТАФОРС, ТОМАГАВК
- гербіциди НІКОМІЛ, ФУТУРИН
- фунгіцид АРБАЛЕТ
- регулятор росту ФРЕШ ЕНЕРГІЯ.

Працюючи з нами ви отримуєте:

- Якісні продукти від виробника
- Готові системи захисту польових культур
- Послугу «Листкова діагностика», що дає змогу:
 - встановити фактичну недостачу елементів живлення;
 - розробити оптимальні рекомендації внесення добрив для формування максимального та якісного врожаю;
 - якісно коригувати умови вирощування сільськогосподарських культур методом позакореневого внесення добрив нашої компанії.
- Професійний агрономічний супровід на всіх етапах, від консультації до збору врожаю
- Безкоштовну доставку продукції
- Можливість зберігання продукції в сучасному ліцензійному складському комплексі нашої компанії
- Зручність роботи з компанією:
 - Ви можете працювати з торговим працівником.
 - здійснити покупку самостійно на сайті компанії або через мобільний додаток.

Мета нашої Компанії – якісний продукт за оптимальною ціною.


Для перевірки якості продукції, ми співпрацюємо з провідним європейським науково-дослідницьким центром «ALDIP», сучасне обладнання якого дозволяє проводити повний аналіз фізико-хімічних характеристик всіх діючих речовин та препаративних форм.

Компанія має представництва по всій території України, що робить нас більшими до кожного клієнта.

Agrosfera дбає про своїх клієнтів і вчасно вирішує питання пов'язані з захистом врожаю.

ЗАВАНТАЖУЙ ОФІЦІЙНИЙ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК!

ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР
DJI В УКРАЇНІ



ПРОДАЖ АГРОДРОНІВ



App Store



Google Play



Agrosfera^{AS}[®]



З електронним
документообігом
покупки дешевше на 5%



Вигідно. Сучасно. Швидко



Agrosfera^{AS}[®]
Територія професійного захисту

ПІНА
БІЛЬШЕ
НЕ
ПРОБЛЕМА

0 800 20 42 42
www.agrosfera.ua

ПОЛІДИМЕТИЛСИЛОКСАН

40%



Побачити
результат роботи
піногасника →



ЗАПРОШУЄМО ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИКІВ

стань професіоналом, разом з нами!



КОНТАКТИ:

0675523771, Ольга
kudlach@agrosfera.ua

Зміст

Протруйники насіння		
• • Галеон, ТН	(дифеноконазол, 92 г/л + азоксистробін, 27 г/л)	12
• Гранівіт, ТН	(карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л)	14
• Ін сет SC, КС	(імідаклоприд, 600 г/л)	16
• Кольчуга Плюс, ТН	(тебуконазол, 120 г/л)	20
• • Пентафорс 322 FS, ТН	(імідаклоприд, 160 г/л + лямбда-цигалотрин, 25 г/л + флутріафол, 30 г/л + тирам, 100 г/л + тебуконазол, 7 г/л)	22
• • Томагавк, ТН	(тебуконазол, 60 г/л + флутріафол, 85 г/л)	24
• Форсаж, КС	(карбендазим, 500 г/л)	26
Гербіциди		
• • Аболір, РГ	(гліфосат, у вигляді амонійної солі, 757 г/кг)	28
• • Вулкан Плюс, РК	(гліфосат у формі ізопропіламінної солі, 480 г/л)	32
• • Гурон, ВГ	(тифенсульфурон-метил, 375 г/кг + триbenuron-метил, 375 г/кг)	34
• • Деліт, РК	(гліфосату калійна сіль, 613 г/л)	36
• • Дікам Плюс, РК	(2,4-Д у формі диметиламінної солі, 344 г/л + дикамба у формі диметиламінної солі, 120 г/л)	38
• • Екстрем, КЕ	(ацетохлор, 900 г/л)	40
• • Еліот, МД	(мезотріон, 75 г/л + нікосульфурон, 30 г/л)	42
• • Ефес, РК	(бентазон, 480 г/л)	44
• • Канцлер, ВГ	(тифенсульфурон-метил, 750 г/кг)	46
• • Корвет, КС	(флуметусулам, 100 г/л + флорасулам, 75 г/л)	48
• • Легіон, ВГ	(клопірапід, 750 г/кг)	52
• • Меркурій, ВГ	(триbenuron-метил, 750 г/кг)	54
• • Молтено, РК	(імазамокс, 40 г/л)	56
• • Нікоміл, МС	(нікосульфурон, 60 г/л)	58
• • Пропозит, КЕ	(пропіохлор, 720 г/л)	60
• • Рейтар, КС	(прометрин, 500 г/л)	62
• • Стилет, КЕ	(клетодим, 120 г/л)	64
• • Сулам, СЕ	(2,4-Д-2-етилгексиловий ефір, 452,42 г/л + флорасулам, 6,25 г/л)	66
• • Футурин, ВГ	(дикамби натрієва сіль, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 60 г/кг)	68
• • Хантер, РК	(імазапір, 15 г/л + імазамокс, 33 г/л)	70
• • Шквал, КЕ	(хізалофоп-П-етил, 125 г/л)	72
• • Юпітер, РК	(імазетапір, 100 г/л)	74
Інсектициди		
• • Альтекс, КЕ	(альфа-циперметрин, 100 г/л)	76
• • Дестрой, КС	(імідаклоприд, 250 г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л)	78



Професійна
серія



Стандартна
серія



Унікальні
препарати



Можливо внесення
агродроном

• • Ріфос, КЕ • Штурм, ЗП	(хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) (піридабен, 200 г/кг)	82 84	• • Енергія Фреш, П • Ленд Фреш, П • Мікс Фреш, П • • Флорід Фреш, П	(індолілмасляна кислота – 40 г/кг, азот (N) – 5,4%, фосфор (P_2O_5) – 5%, калій (K_2O) – 8% та мікроелементи) (солі фульвокислот – 500 г/кг, азот (N) – 3%, фосфор (P_2O_5) – 5%, калій (K_2O) – 10% та мікроелементи) (амінокислоти – 150 г/кг, азот (N) – 10%, фосфор (P_2O_5) – 5%, калій (K_2O) – 8% та мікроелементи) (екстракт морських водоростей – 500 г/кг, амінокислоти – 15 г/кг, азот (N) – 3%, фосфор (P_2O_5) – 5%, калій (K_2O) – 16% та мікроелементи)	125 126 127 128
Фунгіциди					
• • Арбалет, КС • Корнет, КС • Ретардин EW, EB • Ретардин, ВГ • Форсаж, КС • Юнкер, ЗП	(азоксистробін, 200 г/л + флутріафол, 120 г/л) (флутріафол, 250 г/л) (тебуконазол, 250 г/л) (тебуконазол, 500 г/кг) (карбендазим, 500 г/л) (металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг)	86 88 90 92 94 96			
Десиканти					
• Аболір, РГ • Везувій, РК • Вулкан Плюс, РК • Деліт, РК	(гліфосат, у вигляді амонійної солі, 757 г/кг) (дикват дібромід, 150 г/л) (гліфосат у формі ізопропіламінної солі, 480 г/л) (гліфосату калійна сіль, 613 г/л)	98 100 102 104	• Порядок приготування бакових сумішей • Бакові суміші Варіанти застосування • мікродобрив та стимуляторів росту		129 130 131
Фуміганти					
• Фостер, ТБ	(фосфід алюмінію, 560 г/кг)	106			
ПАР					
• Флокс, РК • Флокс, Експерт, РК • Флокс, Профі, РК	(етоксилат ізодецилового спирту, 90%) (поліефір трисилоксан) (поліефір полісилоксан)	108 110 112			
АД'ЮВАНТИ					
• Ленс	(полідиметилсилоксан, 40%)	114			
Мікродобрива					
• Бор Маджестик, Рід • Цинк Маджестик, Рід • Калій Фреш, П • Універсал Фреш, П • Фосфор Фреш, П	(бор (B) – 11%, азот (N) – 4,8%, фосфор (P_2O_5) – 2%, калій (K_2O) – 4% та мікроелементи) (цинк (Zn) – 13%, солі гумінових кислот – 10 г/л, азот (N) – 5%, фосфор (P_2O_5) – 2%, калій (K_2O) – 4% та мікроелементи) (гіберелін – 10 г/к, азот (N) – 5%, фосфор (P_2O_5) – 15%, калій (K_2O) – 38% та мікроелементи) (буруштинова кислота – 40 г/кг, азот (N) – 20%, фосфор (P_2O_5) – 20%, калій (K_2O) – 20% та мікроелементи) (індолілмасляна кислота – 10 г/кг, азот (N) – 10%, фосфор (P_2O_5) – 40%, калій (K_2O) – 11% та мікроелементи)	116 118 120 121 122			
Регулятори росту					
• Аміно Фреш, Рід. • Гуміленд Фреш, Рід.	(амінокислоти – 150 г/л, азот (N) – 11%, фосфор (P_2O_5) – 2%, калій (K_2O) – 4% та мікроелементи) (солі гумінових кислот – 120 г/л, солі фульвокислот – 60 г/л, азот (N) – 2,5%, фосфор (P_2O_5) – 2%, калій (K_2O) – 4% та мікроелементи)	123 124			
Бакові суміші					
Системи захисту рослин					
• Буряки цукрові • Виноградники • Горох • Картопля • Кукурудза • Пшениця та ячмінь • Ріпак • Соняшник • Соя • Яблуна					132 133 134 135 136 138 140 142 144 146
Довідкова інформація					
• Найважливіші фенологічні «критичні» фази • Фізіологічна потреба основних сільськогосподарських культур в мікроелементах та сірці • Чутливість бур'янів до гербіцидів • Спектр дії фунгіцидів і протруйників насіння • Заходи безпеки					147 147 148 152 154



Professional
Професійна серія

Галеон[®], ТН

**ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ФУНГІЦИДНИЙ
ПРОТРУЙНИК НА ОСНОВІ ДВОХ ДІЮЧИХ
РЕЧОВИН ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ
ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА СОЇ ВІД ШИРОКОГО
СПЕКТРУ ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

дифеноконазол, 92 г/л + азоксистробін, 27 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат, який тече, для обробки насіння

УПАКУВАННЯ:

5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Високоефективний проти збудників хвороб, стійких до металаксилу та похідних триазолу
- Швидкі та дружні сходи, завдяки відсутності ретардантної дії та ростостимулюючим властивостям
- Стабільна фунгіцидна активність препарату в найбільш вразливі фази вегетації на початку росту рослин
- М'яко діє на рослини – забезпечує дружні сходи та прискорює їх появу на 1-2 дні
- Відмінна дія на збудників сажок, кореневих гнилей (в тому числі пітіозної) та пліснявіння насіння

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Дифеноконазол належить до хімічної групи триазоли. Його дія полягає в пригнічені процесу диметилулювання ергостеролу, що відіграє важливу роль в процесі утворення клітинної оболонки грибів та розвитку міцелію. Азоксистробін пригнічує мітохондріальне дихання, блокуючи транспорт електронів в ланцюзі цитохромів. Поєднання дифеноконазолу та азоксистробіну забезпечує розширення спектру контролюваних хвороб, довготривалість захисної дії та високу фунгіцидну ефективність.

ГАЛЕОН, ТН ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:

Культура	Способ та строки застосування	Збудники хвороб	Норма внесення, л/т насіння
Пшениця	Протруювання насіння до висівання	Летюча і тверда сажки, гельмінтоспоріозна, фузаріозна і пітіозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз	0,55-0,75
Ячмінь		Летюча і кам'яна сажка, гельмінтоспоріозна, фузаріозна кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз, темно-бура плямистість	
Соя		Фузаріоз, аскохітоз, антракноз, сіра гниль, переноспороз, фузаріозна коренева гниль, пліснявіння насіння	



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ГАЛЕОН, ТН:

Завдяки чому досягається максимальний захист насіння від хвороб?

Завдяки вдалому поєднанню двох компонентів з різних хімічних груп, що вдало підсилюють дію один одного. Дифеноконазол як системний фунгіцид швидко проникає в насіння та надійно захищає від збудників летючої сажки та хвороб сходів та має кращу серед триазолів ефективність проти кореневих гнилей та пліснявіння насіння. Азоксистробін є високоефективним фунгіцидом з найширшим спектром дії, що контролює збудників хвороб, що належать до чотирьох класів грибів в тому числі несправжніх, та завдяки відмінній контактній дії захищає рослини від твердої сажки, кореневих гнилей (в тому числі пітіозної) та пліснявіння насіння.

Які переваги крім надійного захисту від хвороб має препарат?

Проникаючи всередину насінини азоксистробін підвищує ефективність використання поживних речовин і води та покращує засвоєння азоту, що сприяє підвищенню польової схожості навіть за несприятливих погодних умов. Дифеноконазол, на відміну від переважної більшості триазолів, не впovільнює появу сходів, оброблене ним насіння проростає на дві доби швидше, сходи з'являються одночасно, посилюється кущистість та збільшується кількість продуктивних стебел.

Приготування та норми витрати, робочого розчину:

Необхідно пам'ятати, що ефективність протруєння насіння залежить від ретельного дотримання правил регулювання обладнання, приготування робочого розчину та організації проведення робіт.

Перед обробкою обов'язково перевірити справність обладнання протрюювача, промити бак та провести регулювання робочих органів.

Чи можна застосовувати Галеон, ТН з іншими препаратами?

Під час обробки насіння протруйник можна застосовувати сумісно, або послідовно з іншими препаратами інсектицидної, стимулюючої дії та мікродобривами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +2°C	До норми препарату на 1 т насіння додати 5-10 літрів води



Летюча сажка пшениці



Тверда сажка



Борошниста роса пшениці



Гельмінтоспоріозна коренева гниль

Standard
Стандартна серія

Гранівіт[®], ТН

**УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОТРУЙНИК НАСІННЯ
ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА КУКУРУДЗИ ВІД
ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ
ХВОРОБ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, який тече, для обробки насіння

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Можливість сівби навіть за посушливих умов
- Висока енергія проростання та схожості насіння
- Підвищення стійкості сходів та проростків до несприятливих умов
- Ростостимулююча дія за рахунок карбоксіну
- Довготривалий ефект

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Універсальність цього протруйника визначається компонентами препарату, до складу якого входять карбоксин та тирам. Системна діюча речовина карбоксин відзначається високими фунгіцидними властивостями по відношенню до збудників сажкових хвороб рослин завдяки активному блокуванню ферментативного комплексу мітохондрій клітин фітопатогенних грибних організмів. У свою чергу, контактна діюча речовина тирам має високу ефективність в обмеженні розвитку збудників пліснявіння та загнивання сходів, кореневих та стеблових гнилей, септоріозу.



Пшениця



Ячмінь



Кукурудза

**ГРАНІВІТ, ТН ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:**

Культура	Способ та строки застосування	Збудники хвороб	Норми внесення, л/т насіння
Пшениця, ячмінь	Протруйовання насіння до висівання	Тверда та летюча сажки, комплекс збудників кореневих гнилей, пліснявіння сходів	2,5-3,0
Кукурудза		Пухирчаста та летюча сажки, комплекс збудників кореневих і стеблових гнилей, пліснявіння	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ГРАНІВІТ, ТН**Чи проявляє протруйник фітотоксичну дію?**

Препарат не спричиняє пригнічення рослин. В обробленого препаратом насіння підвищуються енергія проростання та схожість. Проростаюче насіння, що протруєне препаратом Гранівіт, ТН, характеризується комплексною стійкістю до несприятливих умов проростання.

Коли доцільно протруювати насіння препаратом?

Насіння краще інкрустувати препаратом до висівання. Проте оброблене насіння може тривалий час зберігатися без зниження насінневих якостей.

Від чого залежить якість обробки насіння?

Якість протруйовання препаратом залежить від низки факторів, а саме: насінневий матеріал перед протруйованням має бути відкалиброваним, звільненим від домішок. Важливо перед протруйованням правильно приготувати робочий розчин та відрегулювати протруювач.

Чи можливо застосовувати Гранівіт, ТН з іншими препаратами?

Під час обробки насіння протруйник можна застосовувати сумісно або послідовно з іншими препаратами інсектицидної та стимулюючої дії.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

2 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +2°C		До норми витрати препарату на 1 т насіння додати до 10 л води

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Способ та строки застосування	Збудники хвороб	Норми витрати, л/т насіння
Жито	Протруйовання насіння до висівання	Летюча, стеблова сажки, кореневі гнилі, снігова пліснява	2,5-3,0
Ріпак		Пліснявіння насіння, альтернаріоз, коренева гниль	2,0-3,0
Льон-довгунець		Анtrakноз, плямистості	1,5-2,0
Горох		Кореневі гнилі	2,5



Пліснявіння сходів пшениці



Тверда сажка



Пухирчаста сажка кукурудзи



Летюча сажка кукурудзи



Standard
Стандартна серія

Ih Сет® SC, KC

**ПРОТРУЙНИК КОНТАКТНО-СИСТЕМНОЇ
ДІЇ ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОГО ПРОТРУЄННЯ
НАСІННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імідаклоприд, 600 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат сусpenзїї

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знищенння шкідників насіння та сходів - від сівби до проростання
- Висока швидкість дії
- Не проявляє фітотоксичну дію на рослини
- Можливість застосування з більшістю фунгіцидних протруйників
- Зручна препаративна форма

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина препарату Ih Сет SC, KC - імідаклоприд належить до групи неонікотиноїдів, діє як антагоніст постсинаптичних нікотинових рецепторів у центральній нервовій системі шкідника, з послідувачим її руйнуванням. В результаті комаха припиняє рухатись, харчувається і гине протягом доби.

Ih Сет SC, KC ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:

Культура	Спосіб та строки застосування	Шкідники	Норми витрати, л/т насіння
Кукурудза		Дротянки, шведська муха	3,5-6,0
Соняшник		Дротянки	4,0-7,0
Пшениця	Обробка насіння перед висіванням	Злакові мухи, цикади	0,3-1,0
		Хлібна жужелиця	1,0-1,5
Ріпак		Хрестоцвітні блішки та ґрунтovі шкідники	3,0-4,0



Дротянок



Хлібна жужелиця



Попелиці



Злакова муха

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ IH CET SC, KC:

Як досягти максимальної ефективності від обробки протруйником Ih Сет SC, KC?

Перед застосуванням препарат слід розбавити в такій пропорції: 8-10 л води + норма витрати препарату на тонну насіння. Під час обробки необхідно ретельно перемішувати робочий розчин. Обов'язковою вимогою є забезпечення рівномірного покриття насіння плівкою робочого розчину. Протруєне насіння повинно зберігатись у прохолодному, сухому приміщенні з вентиляцією, висіватись як можна в більш короткий період часу після протруєння.

Чи можна використовувати Ih Сет SC, KC в бакових сумішах з іншими препаратами?

Препарат можна використовувати з більшістю фунгіцидних протруювачів для розширення спектру дії проти грибкових хвороб.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +2°C	До норми витрати препарату на 1 т насіння необхідно додати 8-10 л води

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Ih Сет SC, KC (0,9 л/т) + Томагавк, ТН (0,4-0,5 л/т)
- Ih Сет SC, KC (0,9 л/т) + Кольчуга Плюс, ТН (0,2-0,25 л/т)
- Ih Сет SC, KC (0,9 л/т) + Форсаж, КС (0,8-1,2 л/т)



Standard
Стандартна серія

Кольчуга Плюс[®], ТН

**ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ФУНГІЦІДНИЙ
ПРОТРУЙНИК НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ТА
ЯЧМЕНЮ ВІД ШИРОКОГО СПЕКТРА
ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
тебуконазол, 120 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, який тече, для обробки насіння

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Подвійна концентрація діючої речовини
- Неперевершене пригнічення збудників сажкових хвороб
- Підвищення життєздатності рослин
- Довготривалий ефект



МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат Кольчуга Плюс, ТН – системний протруйник насіння із захисними та лікувальними властивостями. Діюча речовина препарату тебуконазол є високоактивним інгібітором життєво важливого для фітопатогенних грибів ергостеролу, який є незамінним компонентом клітинних мембран. Тебуконазол швидко поглинається проростками і розподіляється переважно в надземній частині рослин. Завдяки таким властивостям діючої речовини препарат забезпечує довготривалий захисний ефект в обмеженні розвитку сажкових хвороб, іржі, борошнистої роси, гельмінтоспоріозу та септоріозу.

КОЛЬЧУГА ПЛЮС, ТН ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:

Культура	Спосіб та строки застосування	Збудники хвороб	Норми витрати, л/т
Пшениця озима та яра, ячмінь ярий	Протруювання насіння до висівання	Тверда та летюча сажка, комплекс збудників кореневих гнилей, гельмінтоспоріоз	0,2-0,25



Фузаріозна коренева гниль



Гельмінтоспоріозна коренева гниль



Септоріоз пшениці



Летюча сажка пшениці

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ КОЛЬЧУГА ПЛЮС, ТН:

У чому проявляється довготривалий захисний ефект при використанні протруйника Кольчуга Плюс, ТН?

Довготривалий ефект фунгіцидної дії дозволяє ефективно контролювати розвиток хвороб листя навіть на початку росту та розвитку рослин та зменшити кількість обробок рослин фунгіцидами або повністю виключити їх.



На які структурні показники вріжаю зернових впливає препарат?

При застосуванні препарату покращуються структурні показники продуктивності посівів зернових колосових (густота посівів, кущистість рослин, продуктивність колосся) що, в свою чергу, позначається на збільшенні врожайності культур.

За яких умов проявляється найвищий ефект від застосування препаратору?

Якісна обробка насіння препаратом зі своєчасним висіванням в добре підготовленій вологий ґрунт забезпечують високий ефект дії препаратору.

Від чого залежить якість обробки насіння?

Якість протруювання препаратом залежить від низки факторів, а саме: насіннєвий матеріал перед протруюванням має бути відкаліброваним, звільненим від домішок. Важливо перед протруюванням правильно приготувати робочий розчин та відрегулювати протруювач.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

 Оброблене насіння може зберігатись протягом року, проте його схожість та енергія проростання залежатимуть від фізичних умов зберігання. При використанні протруєного насіння, що зберігалося тривалий час, необхідно перевірити його схожість.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас небезпечної (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +2°C		До норми витрати препаратору на 1 т насіння додати 5-10 л води

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

Кольчуга Плюс, ТН (0,2 л/т) + Форсаж, КС (0,5 л/т)



Борошниста роса ячміню



Борошниста роса пшениці



Тверда сажка



Professional
Професійна серія

Пентафорс 322 FS[®], ТН

**ЄДИНІЙ П'ЯТИКОМПОНЕНТНИЙ
ПРОТРУЙНИК СИСТЕМНОЇ ТА КОНТАКТНОЇ
ДІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ГРИБНИХ
ХВОРОБ ТА КОМПЛЕКСУ ШКІДНИКІВ
ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ, ПРОФІЛАКТИКИ
БАКТЕРІАЛЬНИХ ТА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

імідаклоприд, 160 г/л + лямбда-цигалотрин, 25 г/л
+ флутріафол, 30 г/л + тирам, 100 г/л + тебуконазол, 7 г/л



ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат, який тече, для обробки насіння

УПАКУВАННЯ:

10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Найповніший захист від насіннєвих, ґрунтових та аерогенних інфекцій
- Знищує не тільки наземних, а й ґрунтових шкідників
- Обмежує поширення бактеріальних і вірусних захворювань

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

В препараті містяться діючі речовини контактної та системної дії. Поєднання системних фунгіцидів групи триазолів: флутріафол, посилений тебуконазолом, ефективно контролюють збудників твердої і летучої сажки, іржі, септоріозу, гельмінтоспоріозу і фузаріозу, плямистостей шляхом пригнічення синтезу ергостеролу в клітинах патогенів. Контактний фунгіцид тирам надзвичайно ефективний проти кореневих, стеблових гнилей, пліснявіння насіння. Контроль понад 20 видів грибних хвороб.

Захист насіння і сходів від ґрунтових та наземних шкідників здійснюється за рахунок синергічної взаємодії інсектицидів з різним хімічними групами: неонікотиноїди (імідаклоприд) і синтетичні пиретроїди (лямбда-цигалотрин). Механізм дії на шкідників: блокування постсинаптичних нікотинових рецепторів в центральній нервовій системі та порушення функції нейронів через натрієві канали.

ПЕНТАФОРС 322 FS, ТН ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати, л/т
Пшениця озима	Комплекс насіннєвих та ґрунтових збудників хвороб: сажки, пліснявіння насіння, кореневі гнилі, септоріоз, листова іржа, борошниста роса. Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників посівів: дротянки, совка, совка озима, турун хлібний, злакові мухи, блішки, цикадки, попелиці	1,5-2,0
Ячмінь ярий	Комплекс насіннєвих та ґрунтових збудників хвороб: сажки, пліснявіння насіння, кореневі гнилі, септоріоз, листова іржа, борошниста роса, плямистість, гельмінтоспоріоз. Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників посівів: дротянки, совка озима, турун хлібний, злакові мухи, блішки, цикадки, попелиці	1,5-2,0

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ПЕНТАФОРС 322 FS, ТН:

В чому полягає комплексна дія препарату?

Завдяки поєднанню п'яти компонентів забезпечується максимальний захист проти найбільш широкого спектру хвороб та шкідників серед протруйників, що є на ринку України:

- Наявність складових з різних хімічних груп та з різним механізмом дії унеможлилює виникнення резистентності до препарату.
- Крім захисту від грибних інфекцій препарат має бактерицидну дію, обумовлену присутністю тираму.
- Захищаючи сходи від попелиць та цикадок, імідаклоприд тим самим зупиняє поширення вірусних хвороб.
- Лямбда-цигалотрин дозволяє посилити дію протруйника проти ґрунтових шкідників, в тому числі з родини лусокрилих.

Які передумови ефективної дії препарату Пентафорс 322 FS, ТН?

Для того, щоб протруйник повністю проявив свою дію потрібно дотримуватись рекомендацій по підготовці насіння та приготуванню робочого розчину.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +2°C		До норми витрати препарату на 1 т насіння додати води, довівши кількість робочого розчину до 10 л



Дротянок



Совка підгризаюча



Попелиці



Цикадки



Пліснявіння сходів пшениці



Летуча сажка пшениці



Тверда сажка пшениці



Борошниста роса



Professional
Професійна серія

Томагавк[®], ТН

**ФУНГІЦИДНИЙ ПРОТРУЙНИК НАСІННЯ
НА ОСНОВІ ДВОХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН
ДЛЯ ОБРОБКИ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ ВІД
ШИРОКОГО СПЕКТРУ ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ
ХВОРОБ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

тебуконазол, 60 г/л + флутратіфол, 85 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат, який тече, для обробки насіння

ПАКУВАННЯ:

5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Не має аналогів
- Широкий спектр контролюваних хвороб
- Тривалий захисний ефект

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діючі речовини препарату – тебуконазол та флутратіфол – належать до хімічної групи триазоли. Їхня дія полягає в пригніченні процесу диметилювання ергостеролу, що відіграє важливу роль в процесі утворення клітинної оболонки грибів та розвитку міцелію. Флутратіфол характеризується найвищою рухливістю в порівнянні з іншими триазолами. Його поєднання з тебуконазолом забезпечує розширення спектру контролюваних хвороб, довготривалість захисної дії та високу фунгіцидну ефективність.

ТОМАГАВК, ТН ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:



Пшениця



Ячмінь



Культура	Способ та строки застосування	Збудники хвороб	Норми внесення, л/т насіння
Пшениця	Протруювання насіння до висівання	Тверда та летуча сажки, гельмінтоспоріоз, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, септоріоз	0,4-0,5
Ячмінь		Летуча та тверда сажки, гельмінтоспоріозна та фузаріозна, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, січаста плямистість	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ТОМАГАВК, ТН:

Які заходи проводяться при роботі з препаратом Томагавк, ТН?

Ефективність протруювання насіння залежить від ретельного дотримання правил регулювання обладнання, приготування робочого розчину та організації проведення робіт. Перед обробкою обов'язково перевірити справність обладнання протруювача, промити бак та провести регулювання робочих органів. Після проведення робіт – ретельно промити бак протруювача чистою водою. Використану воду утилізують у спеціально відведеніх місцях. Перед приготуванням робочого розчину вміст каністри ретельно перемішати. Робочий розчин готують в таких пропорціях: до норми витрати препарату на тонну насіння додають води до 5-10 л залежно від типу протруювача та виробничих умов. Насіння інкрустується препаратом до висівання. Під час обробки необхідно ретельно перемішувати робочий розчин. Обов'язковою вимогою є забезпечення рівномірного покриття насіння піл'юкою робочого розчину.

З якою метою проводиться обробка насіння зернових культур препаратом Томагавк, ТН?

Протруювання пшениці та ячменю препаратом Томагавк, ТН дозволяє уникнути розповсюдження грибних хвороб через інфіковане насіння, отримати дружні сходи та підвищити стійкість рослин до ураження хворобами. Застосування препарату Томагавк, ТН забезпечує зменшення кількості обробок посівів фунгіцидами або повністю включає їх.

Чи можливе сумісне використання препарату Томагавк, ТН з іншими пестицидами і агрохімікатами та за яких умов?

Препарат можна застосовувати у суміші із інсектицидами, стимулаторами росту та мікродобревими. При змішуванні протруйника з іншими компонентами необхідно пам'ятати, що pH робочого розчину повинна становити від 5,0 до 8,0.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: від +1°C до +30°C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +2°C	До норми витрати препарату на 1 т насіння додати 5-10 л води



Фузаріозна коренева гниль



Гельмінтоспоріозна коренева гниль



Січаста плямистість ячменю



Летуча сажка пшениці



Борошниста роса ячменю



Борошниста роса пшениці



Тверда сажка



Standard
Стандартна серія

Форсаж[®], КС

**СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦІДНИЙ ПРОТРУЙНИК
ЗАХИСНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
карбендазим, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат сусpenзії

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Захист насіння, проростків та рослин від широкого спектру хвороб
- Дружність та однорідність сходів протруєного насіння
- Довготривала дія

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Фунгіцидний протруйник Форсаж, КС з діючою речовиною карбендазим забезпечує високу ефективність в обмеженні розвитку широкого спектру хвороб рослин, які передаються через насіння та ґрунт. Системні властивості діючої речовини активно обмежують розвиток збудників сажкових хвороб, пліснявіння та загнивання сходів, кореневих гнилей.

ФОРСАЖ, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ ТАКИХ КУЛЬТУР:

Культура	Способ та строки застосування	Збудники хвороб	Норми витрати, л/т насіння
Пшениця та ячмінь	Протруювання насіння до висівання	Кореневі гнилі, снігова пліснявія, сажкові хвороби	1,0-1,2
Соняшник		Сіра та біла гнилі, фомоз, пліснявіння	0,8-1,5



Біла гниль соняшнику



Фузаріозна коренева гниль



Летюча сажка ячменю

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФОРСАЖ, КС:

Проти яких збудників хвороб даний протруйник має найвищу ефективність? Протруйник Форсаж, КС відзначається виключно високою ефективністю проти збудників снігової пліснявія та кореневих гнилей зернових колосових, сірої та білої гнилі, фомозу соняшнику.

Чи можна застосовувати Форсаж, КС з іншими препаратами?

Під час обробки насіння протруйник можна застосовувати сумісно або послідовно з іншими препаратами інсектицидної та стимулуючої дії.

Коли доцільно протруювати насіння препаратом?

Насіння краще інкрустувати препаратом до висівання. Проте оброблене насіння може тривалий час зберігатися без зниження насінневих якостей.

Від чого залежить якість обробки насіння?

Якість протруювання препаратом залежить від низки факторів, а саме: насінневий матеріал перед протруюванням має бути відкалібрований і очищений від домішок. Важливо перед протруюванням правильно приготувати робочий розчин та відрегулювати протруювач.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +2°C		
	До норми витрати препарату на 1 т насіння додати води, довівши кількість робочого розчину до 10 л		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Способ та строки застосування	Збудники хвороб	Норми витрати, л/т насіння
Жито, Овес	Протруювання насіння до висівання	Фузаріозно-гельмінторспоріозна коренева гниль, снігова пліснявія, сажкові хвороби	1,5
Картопля	Обприскування бульб до висадки	Суха гниль (фузаріозна), ризоктоніоз	0,08-0,12

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

Форсаж, КС (0,5 л/т) + Кольчуга Плюс, ТН (0,2 л/т)



Сіра гниль соняшнику



Борошниста роса пшениці



Снігова пліснявіння

 Professional
Професійна серія

Аболір[®], РГ

СИСТЕМНИЙ ГЕРБІЦІД З ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДІЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

гліфосат, у вигляді амонійної солі, 757 г/кг у кислотному еквіваленті, 687 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинні гранули

УПАКУВАННЯ:

10 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Швидке знищенння бур'янів (однорічні – 12 годин, багаторічні – 5 днів)
- Найнижча норма застосування
- Опади не знижують ефективність дії препарату через годину після застосування
- Відмінна розчинність
- Найбільш досконала формула діючої речовини
- Висока ефективність за несприятливих погодних умов

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина – гліфосат є інгібітором ферментативної системи, яка відповідає за синтез ароматичних амінокислот. Гліфосат проникає у рослину через надземну її частину та активно розноситься по всіх органах, у тому числі і у коріння . Бур'яни гинуть за рахунок поліпшеної формулляції вже через 8-10 діб. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються через 7 днів, спочатку у вигляді пожовтіння, потім в'янення листя. Препарат є ефективним у широкому діапазоні концентрації природних катіонів кальцію і магнію у воді.

ГЕРБІЦІД АБОЛІР, РГ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ НА СЛІДУЮЧИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Способ, час обробки, обмеження	Норми витрати, кг/га	Максимальна кратність обробок
Парі	Однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів	1,5-2,0	1
Поля призначенні під посів ярих зернових та олійних культур		Обприскування вегетуючих бур'янів восени, після збирання попередника або навесні, за 2 тижні до висівання	1,5-2,0	
Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуждження, ліній електропередач, газотафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні наспи)		Обприскування вегетуючих бур'янів	1,5-2,0	



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АБОЛІР, РГ:

Як правильно приготувати робочий розчин гербіциду Аблір, РГ?

З необхідної кількості препарату спочатку готують маточний розчин в заповненому на 1/3 баку обприскувача. Через 15 хвилин долити водою до повного об'єму бака.

Як встановити норму витрати препарату?

Норма витрати препарату встановлюється за результатами обстеження на виявлення чисельності, видового складу та встановлення стадії росту і розвитку бур'янів. При проведенні боротьби з однорічними односім'ядольними та двосім'ядольними бур'янами норму витрати встановлюють в залежності від висоти рослин.

З метою знищення багаторічних бур'янів норма витрати встановлюється мінімальною, в період відростання бур'янів, максимальна в більш пізні фази росту і розвитку рослин. Для боротьби з березкою польовою норму витрати встановлють максимальну.

Чи залежить ефективність обробки від жорсткості води?

Завдяки досконалій формулі гербіциду Аблір, РГ добре працює навіть у жорсткій воді, та не потребує додавання у бакову суміш спеціальних компонентів для її пом'якшення.

Як впливають на дію гербіциду складні погодні умови?

За дощової погоди опади майже не знижують гербіцидний ефект вже через годину після внесення препарату. Також як посушлива так і холодна погода істотно не позначаються на його ефективності.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (високостійкий у воді). Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C	
	Не проводити внесення при швидкості віtru понад 3-4 м/с	50-300 л/га

Вулкан[®] Плюс, РК

ГЕРБІЦІД СУЦІЛЬНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПОВНОГО ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

гліфосат у формі ізопропіламінної солі, 480 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Легкий шлях до чистого поля
- Низький рівень піноутворення
- Зменшена чутливість до рівня жорсткості води
- Можливість авіаційних внесень

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гліфосат є інгібітором ферментативної системи, яка відповідає за синтез необхідних для життєдіяльності рослин ароматичних амінокислот. Гліфосат поглинається надземною частиною рослин та активно розноситься по всіх органах, у тому числі і в коріння. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються через 2-4 дні, спочатку у вигляді пожовтіння, потім - в'янення листя.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦІДУ ВУЛКАН ПЛЮС, РК:

Здатний повністю знищувати однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни.

ГЕРБІЦІД ВУЛКАН ПЛЮС, РК ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату, л/га		Максимальна кратність обробок
		наземним устаткуванням	авіацією (літаки АН-2)	
Парі	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2,0-4,0	6,0	1
	Багаторічні бур'яни	4,0-6,0		
Поля, призначенні під посіви ярих зернових	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2,0-4,0	6,0	1
	Багаторічні бур'яни	4,0-6,0		
Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні наспи)	Однорічні та багаторічні рослини	3,0-6,0		



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦІДУ ВУЛКАН ПЛЮС, РК:

Як правильно встановити норму витрати препарату?

Норма витрати препарату встановлюється залежно від видового складу бур'янів, їх фізіологічного стану, прогнозованої ефективності гербіцидної обробки та погодно-кліматичних умов проведення обприскування. Мінімальні норми витрати використовуються при домінуванні чутливих видів бур'янів.

Коли саме слід застосовувати препарат восени чи навесні?

Гербіцид Вулкан Плюс, РК застосовують восени після збирання попередника до проведення основної обробки ґрунту та навесні на полях, призначених під сівбу ярих культур, за 14 діб до проведення передпосівної культивації.

Яким чином можна досягти максимальної ефективності від застосування препарату?

Найбільший гербіцидний ефект від застосування препарату досягається за умов теплої погоди. Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площа і ясне змочування рослин під час внесення препарату.

Коли бур'яни найчутливіші до гербіциду?

До препарату найчутливіші однорічні бур'яни в період їх активного росту і розвитку, багаторічні - у період відростання та активного росту.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від +1°C до + 35°C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
		Від +15°C до +25°C при наземному застосуванні – 200-400 л/га при авіаційному – 50 л/га
		Погодні умови в період застосування Умовою ефективної дії Вулкан Плюс, РК є відсутність опадів після внесення препарату протягом 3 годин. Препарат доцільно застосовувати у вечірні години або вранці

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Способ внесення	Бур'яни	Норма внесення, л/га	Максимальна кратність обробок
Плодові та виноградники	Направлене обприскування вегетуючих бур'янів весною або влітку	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	2,0-4,0	1
		Багаторічні злакові та дводольні бур'яни	4,0-8,0	
Картопля	Обприскування до сходів культури		2,0	
Лісове господарство	Обприскування вегетуючих бур'янів при підготовці поля під хвойні та листяні породи	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0-4,0	

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для обприскування вегетуючих бур'янів на полях, призначених під посіви соняшнику, ріпаку, люцерни, багаторічних трав, хмеля, цукрових буряків, овочевих, сої, льону, баштанних культур.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га) + Футурин, ВГ (0,15 кг/га)
- Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га) + Сулам, СЕ (0,4 л/га)
- Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га) + Дікам Плюс, РК (0,5-1,0 л/га)
- Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га) + Шквал, КЕ (0,5 л/га)

 Professional
Професійна серія

Гурон[®], ВГ

ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ ПРОТИ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

тифенсульфурон-метил, 375 г/кг + трибенурон-метил, 375 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:

гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:

1 кг фольгований пакет (10 пакетиків по 100 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Широке вікно застосування (до прапорцевого листка)
- Ефект дії від +10°C до +25°C
- Відсутність післядії

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Гербіцид Гурон, ВГ є комбінованим препаратом, який поєднує дві високоекспективні діючі речовини: тифенсульфурон-метил та трибенурон-метил. Завдяки цьому препарат має розширеній спектр дії, добре контролює стійкі бур'яни, виключає виникнення резистентності до гербіциду.

Препарат проникає у рослини через листя, стебла і корені та потрапляє до точок росту рослини через 3 години після внесення, припиняючи поділ клітин, ріст пагонів та коренів. Симптоми дії з'являються через декілька днів, повний гербіцидний ефект настає за 2-3 тижні. Малочутливі та перерослі бур'яни можуть не загинути, проте їх ріст і подальший розвиток значно уповільнюється.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦІДУ ГУРОН, ВГ:

Чутливі бур'яни	Середньочутливі бур'яни	Малочутливі бур'яни
<ul style="list-style-type: none"> амброзія полінолиста (фаза сім'ядоль – 2 справжніх листка) біофора промениста волошка синя гірчиця польова гірчак (види) горошок (види) грицики звичайні дворядник (види) жабрій (види) жовтець польовий жовтозілля (види) зірочник середній кропива (види) кукулюція біла кучерявець (види) лобода біла (до 2 справжніх листочків) <ul style="list-style-type: none"> лутига розлога мак дикий морква дика м'ята польська незабудка польська осот польовий горобейник польовий королиця (види) лобода (види) до 6 лист череда трироздільна 	<ul style="list-style-type: none"> вероніка (види) герань (види) морська дика петрушка собача підмаренник чіпкий редька дика ріпак (падалиця) роман польовий ромашка (види) соняшник падалиця сухоребрик лікарський талабан польовий шпергель звичайний щавель (види) цириця звичайна фіалка польська 	<ul style="list-style-type: none"> березка польова паслін чорний рутка лікарська

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"



ГУРОН, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, г/га	Строк обробки
Пшениця озима, ячмінь озимий	30-40	Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до появи прапорцевого листка культури включно



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ГУРОН, ВГ:

Терміни застосування та норми.

Найбільшу ефективність препарат має на початкових (3-6 листків для однорічних, фаза розетки – для багаторічних) стадіях розвитку бур'янів.

Найкращий ефект проти зимуючих та весняних сходів підмаренника чіпкого досягається при застосуванні препарату у фазу 2-3 кільця.

Максимальна норма препарату Гурон, ВГ, доцільна при високому ступені забур'яненості (більше 50 бур'янів на 1м²) та проти підмаренника чіпкого (зимуюча форма).

Бакові суміші.

Препарат сумісний з більшістю пестицидів та рідких добрив . Перед приготуванням бакових сумішей доцільно перевірити оцінку їх сумісності. Не рекомендується сумісне застосування з фосфорорганічними інсектицидами.

Для підвищення ефективності.

Якщо посіви зріджені, за високої чисельності та наявності стійких бур'янів, а також в жарку, суху погоду, слід обов'язково використовувати поверхнево-активну речовину Флокс, РК, що покращує змочування бур'янів робочим розчином і, таким чином, покращує гербіцидний ефект.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Не рекомендується:

- застосування препарату Гурон, ВГ протягом 14 днів до чи після обробки фосфорорганічними інсектицидами;
- проводити обробку, якщо культура знаходитьться у стресовому стані (дія хвороб, шкідників, посухи та спеки).

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний). Малотоксичний для теплокровних, риб та птахів.
Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від -10°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
	Від +12°C до +25°C. Забороняється використання препарату при температурі нижче +10°C і вище +25°C	200-400 л/га. У разі високого рівня забур'яненості потрібно застосовувати максимальну норму витрати робочого розчину
	Погодні умови в період застосування	
	Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Умовою ефективної дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 3 годин. Не проводити обробку, якщо культура мокра від роси чи дощу	

 Professional
Професійна серія

Деліт[®], РК

НЕСЕЛЕКТИВНИЙ ПІСЛЯСХОДОВИЙ ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ БУР'ЯНІВ. ДЕСИКАНТ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

гліфосату калійна сіль, 613 г/л,
у кислотному еквіваленті, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висококонцентрована препаративна форма
- Менша норма застосування
- Містить прилипач нового покоління
- Краще проникнення в рослину
- Швидша дія за рахунок більш рухомої діючої речовини
- Знищенння багаторічних бур'янів з коренем

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гліфосат є інгібітором ферменту (EPSPS), який відповідає за синтез необхідних для життєдіяльності рослин ароматичних аміокислот. Препарат дифузно проникає через листову поверхню і розподіляється по всій рослині, включаючи кореневища, при контакті з ґрунтом розкладається на нетоксичні сполуки. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються через 2-3 дні, спочатку у вигляді пожовтіння, потім в'янення листя. Завдяки вмісту у препараті гліфосату в калійній формі стало можливим підвищити концентрацію діючої речовини та знизити норму витрати у порівнянні з традиційними формами гліфосату (наприклад ізопропіламіної).

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦІДУ ДЕЛІТ, РК:

Має здатність знищувати як однорічні так і багаторічні рослини в залежності від норми внесення.

ГЕРБІЦІД ДЕЛІТ, РК ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ДЕСИКАНТУ НА НАСТУПНИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Пари	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2,0	1
	Багаторічні бур'яни	4,0	
Поля призначенні під посіви ярих зернових	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,0-4,0	
Землі нesільськогосподарського призначення (смуги відчуждення, ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залізничні насили)	Однорічні та багаторічні бур'яни	2,4-4,0	



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦІДУ ДЕЛІТ, РК:

Як правильно встановити норму витрати препарату?

Норма витрати залежить від видового складу бур'янів, віку рослин. При переважній кількості однорічних бур'янів можна застосовувати мінімальні норми препарату. При сильному забур'яненні земель багаторічними бур'янами, особливо такими як ваточник сирійський, хвощ польовий слід використовувати максимальні норми препарату в суміші з іншими протидводольними гербіцидами, наприклад з Сулам, СЕ та Футурин, ВГ.

Для підсилення дії проти перерослих бур'янів та застосування в засушливих умовах в бакову суміш необхідно додавати аміачну селітру або сечовину.

Коли краще застосовувати препарат?

Застосовувати гербіцид Деліт, РК для очищення земель від багаторічних бур'янів краще восени, так як сокорух рослин переважно має низхідний напрямок, що дозволяє ефективніше знищити кореневу систему рослини.

Коли бур'яни найбільш чутливі до дії гербіциду?

Однорічні бур'яни найбільш чутливі у фазу активного розвитку, багаторічні - у період відростання та активного росту.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Не токсичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
	Від +15°C до +25°C	100-200 л/га
	Погодні умови в період застосування	
	Ефективно умовою застосування препарату Деліт, РК є відсутність опадів протягом 3 годин після внесення. Препарат доцільно вносити у вечірні години або вранці, але до випадання роси	

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Способ внесення	Бур'яни	Норма внесення, л/га	Максимальна кратність обробок
Картопля	Обприскування до сходів культури	Однорічні бур'яни	1,5	1
		Багаторічні бур'яни	3	
Плодові та виноградники	Направлене обприскування вегетуючих бур'янів	Однорічні бур'яни	1,5	
		Багаторічні бур'яни	3	
Лісове господарство	Обприскування вегетуючих бур'янів при підготовці поля під хвойні та листяні породи	Однорічні та багаторічні бур'яни	2-3	

Також препарати з аналогічною дією речовиною використовують для обприскування вегетуючих бур'янів на полях, призначених під посіви соняшнику, ріпаку, люцерни, багаторічних трав, хмелю, цукрових буряків, овочевих, сої, льону, баштанних культур та для десикації кукурудзи.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Деліт, РК (3 л/га) + Футурин, ВГ (0,15 кг/га)
- Деліт, РК (2-3 л/га) + Шквал, КЕ (0,5 л/га)





Дікам Плюс[®], РК

ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ
ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ
КОЛОСОВИХ ТА КУКУРУДЗИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

2,4-Д, (2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота) у формі диметиламінної солі, 344 г/л + дикамба у формі диметиламінної солі, 120 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

10л, 20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знищенння широкого спектру двосім'ядольних бур'янів
- Висока швидкість дії
- Ефективність проти підмаренника чілкого, осотів та березки польової
- Проти бур'янів, стійких до 2,4-Д та МЦПА

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат Дікам Плюс, РК - системний гербіцид для знищенння двосім'ядольних бур'янів у посівах пшениці, ячменю та кукурудзи. Вдало підібрани речовини з гербіцидними властивостями (2,4-Д та дикамба) та їх співвідношення в препаративній формі забезпечують неперевершений ефект у боротьбі з бур'янами, навіть зі стійкими до дії гербіцидів на основі 2,4-Д та 2M-4X. Діючі речовини належать до синтетичних ауксінів, проникають у рослини через тканини надземних органів та коренів. Діють як інгібтори росту.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ДІКАМ ПЛЮС, РК:

Чутливі бур'яни	Середньочутливі бур'яни	Малочутливі бур'яни
<ul style="list-style-type: none"> амброзія поліноміста волошка синя галінсога (види) гірчиця польова грицики звичайні зірочник середній кучеривець Софії лобода (види) лутига (види) <ul style="list-style-type: none"> підмаренник чілкий полин звичайний редка дика рутка лікарська спориш звичайний талабан польовий хрінниця крапковидна шпергель звичайний щавель горобиний 	<ul style="list-style-type: none"> березка польова гірчак (види) дурман звичайний жабрій (види) осот жовтий польовий осот рожевий осот щетинистий паслін чорний ромашка не пахуча щиріця (види) 	<ul style="list-style-type: none"> вероніка (види)

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦІД ДІКАМ ПЛЮС, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Способ внесення	Шкідливі об'єкти	Норма внесення, л/га
Пшениця	Обприскування посівів навесні від фази кущення до виходу в трубку культури	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні, у тому числі стійкі до препаратів на основі тільки 2,4-Д та 2M-4X кислот	0,8
Ячмінь			0,5-0,7
Кукурудза	Обприскування посівів у фазі 3-5 листків		1,5



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДІКАМ ПЛЮС, РК:

В якій фазі розвитку рослин потрібно використовувати Дікам Плюс, РК?

У посівах пшениці, ячменю препарат застосовується одноразово від фази кущення до виходу в трубку рослин, кукурудза обробляється одноразово у фазі рослин 3-5 листків.



Як досягти максимальної ефективності від обробки гербіцидом Дікам Плюс, РК?

Найвищий рівень ефективності (80-90%) гербіцидної дії досягається у разі обробки посівів у ранні фази розвитку (2-4 листки) бур'янів. Слід пам'ятати, що при застосуванні препарату в більш пізні фази розвитку бур'янів, особливо проти видів гірчаків, ромашки непахучої, зірочки середнього, підмаренника чілкого, ефективність гербіциду істотно зменшується.



Яку норму витрати препарату слід встановити при використанні в посівах ячменю?

Норму витрати на ячмені слід встановлювати з урахуванням чисельності бур'янів та стану посівів культурних рослин. При невисокій чисельності тільки чутливих бур'янів (до 10 шт./м²) та при добре розвинутих культурних рослинах в посівах препарат доцільно використовувати з нормою витрати 0,5 л/га, у разі високої чисельності (більше 50 шт./м²) бур'янів – 0,7-0,8 л/га.

Чи можна використовувати Дікам Плюс, РК в бакових сумішах з іншими гербіцидами?

Препарат Дікам Плюс, РК сумісний з багатьма гербіцидами, його можна використовувати в бакових сумішах для підвищення рівня рентабельності гербіцидної обробки в посівах пшениці, ячменю та кукурудзи.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30 °C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
	Від +15°C до +25°C	
	Погодні умови в період застосування	200-400 л/га

Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Способ внесення	Бур'яни	Норма внесення, л/га	Максимальна кратність обробок
Жито	Обприскування посівів навесні від фази кущення до виходу в трубку культури	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні	0,6-0,8	1
			0,5-0,7	

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Пшениця, ячмінь: Дікам Плюс, РК (0,5-0,6 л/га) + Меркурій, ВГ (0,015 кг/га)
- Пари, обробка до та після сівби: Дікам Плюс, РК (0,5-1,0 л/га) + Вулкан Плюс, РК (3-4 л/га)

 Standard
Стандартна серія

Екстрем[®], КЕ

ГЕРБІЦІД ҐРУНТОВИЙ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ, СОНЯШНИКУ ТА СОЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
ацетохлор, 900 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Містить антидот
- Ефективно контролює бур'яни
- Дозволяє зменшити кількість механічних обробок ґрунту

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Діюча речовина ацетохлор ґрунтового гербіциду Екстрем, КЕ відзначається високою гербіцидною активністю щодо однорічних злакових та деяких двосім'ядольних бур'янів. Ацетохлор діє на проростаючі бур'яни, проникає у тканини шилець і коренів, активно гальмує ріст і поділ клітин, порушує в них білковий та ліпідний обмін. Порушення обміну речовин у рослинах бур'янів, спричинене ацетохлором, є незворотнім процесом, в результаті чого проростки зупиняють ріст та гинуть.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦІДУ ЕКСТРЕМ, КЕ:

Чутливі бур'яни	Середньочутливі бур'яни	Малочутливі бур'яни
<ul style="list-style-type: none"> • галінсога дрібноквіткова • грицики звичайні • лобода біла • мишій зелений • мишій сизий • плоскуха звичайна 	<ul style="list-style-type: none"> • зірочник середній • паслін чорний • суріпиця звичайна • талабан польовий • щириця звичайна 	<ul style="list-style-type: none"> • амброзія полінолиста • березка польова • будяк польовий • вівсюг звичайний • гірчак широколистий

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦІД ЕКСТРЕМ, КЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Способ внесення	Шкідливі об'єкти	Норма внесення, л/га
Кукурудза, соняшник, соя	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури	Однорічні злакові	1,5-3,0
Землі несільськогосподарського призначення (смуги відчуження ліній електропередач, газо- та нафтопроводів, узбіччя доріг, залишні наспи)	Обприскування ґрунту до появи сходів бур'янів. Забороняється випасання худоби та заготівля сіна у зоні 300 м від оброблених територій протягом 15 діб. Забороняється обробка земель несільськогосподарського використання на відстані менша 300 м від місць постійного перебування людей.	та двосім'ядольні, а також проростки багаторічних бур'янів з насіння	3,0



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕКСТРЕМ, КЕ:

Які технологічні вимоги існують при підготовці ґрунту перед внесенням гербіциду?

На прояв гербіцидного ефекту впливає стан ґрунту перед внесенням гербіциду, а саме: ґрунт має бути оброблений згідно з рекомендаціями і бути перед внесенням дрібногрудкуватим, з ретельно подрібненими рослинними рештками.

Чи необхідна заробка гербіциду в ґрунт після його внесення?

Після внесення гербіцид доцільно відразу заробити середніми або легкими боронами.

Від чого залежить норма витрати препарату Екстрем, КЕ?

Норма витрати препарату встановлюється залежно від типу ґрунтів та їх механічного складу. На малогумусних, легких за механічним складом ґрунтах норма витрати становить 1,5-2,0 л/га, на суглинкових ґрунтах із вмістом гумусу менше 4% – 2,0-2,5 л/га, а на важких суглинкових ґрунтах із вмістом гумусу 4-5% та торф'яніках – 2,5-3,0 л/га.

Як застосовувати гербіцид в умовах недостатнього зволоження ґрунту?

В умовах посухи для посилення гербіцидного ефекту гербіцид доцільно вносити під передпосівну культивацию на глибину 5 см. Якщо препарат вноситься після сівби, то після заробки гербіциду боронами необхідно провести коткування для ущільнення ґрунту.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

II клас (малотоксичний), помірнонебезпечний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C	
	Погодні умови в період застосування	Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с
	Оптимальні умови для внесення – після дощу або зрошення за нормою 10-20 мм	

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Екстрем, КЕ (2,0 л/га) + Рейтар, КС (2,0 л/га)



Галінсога



Мишій зелений



Щириця запрокинута




 Professional
Професійна серія


Еліот[®], МД

**ПІСЛЯСХОДОВИЙ СИСТЕМНИЙ ГЕРБІЦІД
З ГРУНТОВОЮ ДІЄЮ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ¹
ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ ТА ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ
У ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

мезотріон, 75 г/л + нікосульфурон, 30 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

масляна дисперсія

УПАКУВАННЯ:

20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Контроль однорічних та багаторічних двосім'ядольних і злакових бур'янів протягом сезону
- Найширше вікно застосування – від 2 до 8 листків
- Високоефективний проти злісних багаторічних бур'янів
- Добре контролює перерослі бур'яни
- Не фітотоксичний для культури

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Мезотріон – гербіцид, що належить до хімічної групи трикетонів, є інгібітором синтезу каротиноїдів; нікосульфурон – з хімічної групи сульфонілсечовин, припиняє поділ клітин в точках росту. Діючі речовини проникають в середину рослин бур'янів через листя та поширяються як акропетально, так і базипетально. Препарат, що потрапив в ґрунт, абсорбується корінням та проростками. Результатом синергічної дії складових гербіциду є припинення росту чутливих бур'янів через 1-2 дні та наступна їх загибель.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦІДУ ЕЛІОТ, МД:

Вівсюг звичайний, гірчиця (види), грицики звичайні, зірочник середній, просо куряче, мишій (види), пальчатка (види), пирій повзучий, портулак городній, просо (види), редька дика, роман польовий, ромашка (види), щириця (види), амброзія (види), гірчак (види), кропива глуха пурпуррова, курячий цвіт польовий, осот городній, підмаренник чіпкий, переліска однорічна, чистець (види), шпергель звичайний, канатник Теофраста, лобода розлога, лобода біла, дурман звичайний, галінсога дрібноквіткова, падалица соняшнику (звичайного, IMI- і сульфостійкого), паслін чорний, нетреба звичайна, ваточник сирійський.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦІДУ ЕЛІОТ, МД:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Способ і строки застосування
Кукурудза	Однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	1,25-2,0	Обприскування посівів від 2 до 8 листків у культури включно, на ранніх фазах росту бур'янів (2-6 листків у однорічних бур'янів та за висоти 10-20 см у багаторічних злакових бур'янів)

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦІДУ ЕЛІОТ, МД:****Як визначити необхідну норму застосування гербіциду?**

Якщо на полі переважає однорічний тип забур'яненості на ранніх етапах розвитку бур'янів, оптимальна норма застосування становитиме 1,4-1,5 л/га. У випадку, якщо переважають багаторічні бур'яни, або при внесенні після появи 5-го листка у кукурудзи, коли більшість однорічних бур'янів переросла, норма повинна бути збільшена до 1,75-2,0 л/га. Оптимальний термін обприскування посівів - фаза 3-5 листків у кукурудзи, коли бур'яни знаходяться в фазі 2-4 справжніх листків, осоти - розвинена розетка, при висоті пирію повзучого 15 см.

Як проявляється ґрунтована дія препарату?

За рахунок ґрунтової дії препарат може контролювати появу деяких двосім'ядольних бур'янів за наявності вологи в ґрунті.

Як швидко діє препарат?

70-80% препарата проникає в рослину протягом 24 годин та викликає зупинку росту бур'янів протягом 1-2 днів. Перші симптоми дії гербіциду – знебарвлення точок росту, згодом хлороз поширюється на всю рослину та відбувається некроз тканин. Повна загибель настає на протязі 1-3 тижнів, в залежності від виду бур'янів та їх фізіологічного стану на момент обробки.

Який захисний період препарату?

Мінімальний захисний період препарату становить 20 днів.

Чи може гербіцид викликати фітотоксичність у рослин кукурудзи?

За певних стресових умов (холодна і волога погода, денна температура нижче +20° С, різкі перепади денної і нічної температур) після обробки препаратом на листках культури може проявитися короткочасний хлороз, в основному в середній частині листка.

В таких умовах у рослин кукурудзи відбувається уповільнення метаболізму, і селективні діючі речовини нерівномірно розподіляються по рослині. Однак ці симптоми швидко проходять без негативного впливу на ріст і врожайність культури. За нормальніх умов гербіцид швидко розкладається та виводиться рослинами кукурудзи. Більшість дослідів доводять підвищення врожайності зерна та зеленої маси кукурудзи після застосування гербіциду.

Обмеження в сівозміні:

При необхідності пересіву в рік застосування можна висівати тільки кукурудзу. Не рекомендується висівати на наступний рік цукрові буряки, столові й кормові буряки, бобові культури, томати і гречку.

Соняшник, сою та ріпак в сівозміні рекомендується висівати після оранки.

Сумісність з іншими препаратами:

Завжди перевіряйте препарати на сумісність перед приготуванням бакової суміші.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не рекомендується застосовувати гербіцид на ділянках гібридизації без попереднього тесту на фітотоксичність.

Не застосовуйте препарат в тих випадках, коли проводилася обробка насіння і/або посівів кукурудзи фосфорорганічними інсектицидами та мікроелементами, зокрема цинком у будь-якій формі.

Не проводьте обробку за рясної роси та в дощову погоду.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас небезпечності.**ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:** 3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.**ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:** Від +0°C до +35°C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +12°C до +25°C	200-300 л/га
Погодні умови в період застосування	Обприскування проводити при швидкості вітру не більше 3-4 м/с



Standard
Стандартна серія

Ефес®, РК

**ГЕРБІЦІД КОНТАКТНОЇ ДІЇ ДЛЯ
ЗАСТОСУВАННЯ В ПОСІВАХ ГОРОХУ ТА СОЇ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
бентазон, 480 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока швидкість дії
- Тривалий захисний ефект
- Висока селективність до культурних рослин
- Пригнічення бур'янів, стікіх до 2,4-Д та 2М-4Х

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Гербіцид контактної дії для боротьби з однорічними двосім'ядольними бур'янами, в тому числі стікими до препаратів на основі 2,4-Д та 2М-4Х кислот в посівах гороху та сої. Бентазон призводить до порушення функціонування другої фотосинтетичної системи з подальшим припиненням розвитку і поділу клітин.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦІДУ ЕФЕС, РК:

Гербіцид використовується для пригнічення та знищенння широкого спектра двосім'ядольних бур'янів та рослин з родини осикових.



Чутливі бур'яни	Середньочутливі бур'яни
<ul style="list-style-type: none"> амброзія полинолиста галинога дрібноквіткова гірчиця польова гречка татарська дурман звичайний жабрій <ul style="list-style-type: none"> нетреба звичайна паслін чорний підмаренник чіпкий полин звичайний портулакгородній редъка дика <ul style="list-style-type: none"> роман ромашка (види) смікавець круглий шириця (види) <ul style="list-style-type: none"> кропива (види) фалка польова 	

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦІД ЕФЕС, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Способ, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Горох (на насіння)	Однорічні двосім'ядольні	Обприскування посівів в фазу 5-6 листків культури	3,0	1
Соя	Однорічні двосім'ядольні	Обприскування посівів в фазу 1-3 справжніх листків культури	1,5-3,0	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЕФЕС, РК:

Що впливає на ефективність роботи гербіциду Ефес, РК?

Ефективність гербіцидної обробки залежить від якісного внесення препарату. Тому слід ретельно дотримуватися правил регулювання обладнання для внесення препарату, приготування робочого розчину та організації проведення робіт по застосуванню пестицидів.

У якій фазі культури потрібно застосовувати препарат Ефес, РК?

В посівах гороху препарат застосовується одноразово у фазі 5-6 листків культури. Соя обробляється одноразово у фазі 1-3 справжніх листків культури. При цьому максимальна норма витрати в посівах сої використовується у разі переростання бур'янів (від фази більше 4-х листків для однорічних, фази стебування - для багаторічних).

Чи можна використовувати Ефес, РК в бакових сумішах з іншими гербіцидами?

З метою підсилення гербіцидної дії препарату можливе його використання в сумішах з іншими гербіцидами, які застосовують у період вегетації культури. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з урахуванням видового складу та чисельності бур'янів в посівах.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Гербіцид не рекомендується застосовувати в баковій суміші з протизлаковими препаратами на основі діючої речовини клетодим.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас (малотоксичний). Помірно небезпечний для теплокровних, безпечний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +15°C до +25°C Тепла погода підсилює гербіцидну дію препарату		
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	За умов вологої погоди ефективність внесення препарату зростає, але дощ протягом 3 годин після обприскування може знизити його активність. Негативно впливає на дію препарату довготривалий посушливий період.		Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Способ, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Пшениця озима та яра, жито, ячмінь, овес	Однорічні двосім'ядольні, у т. ч. стікі до 2М-4Х та 2,4-Д бур'яни	Обприскування посівів весною у фазі кущення культури	2,0-4,0	1
Просо	Однорічні двосім'ядольні у т. ч. стікі до 2М-4Х та 2,4-Д бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3-х листків культури		
Рис	Бульбоочерет та інші болотні бур'яни	Обприскування посівів у фазі кущення культури		
Кукурудза	Однорічні двосім'ядольні, у т. ч. стікі до 2М-4Х та 2,4-Д бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3-5 листків культури		
Льон-довгунець	Однорічні двосім'ядольні, у т. ч. стікі до 2М-4Х бур'яни	Обприскування посівів у фазі «ялинки» за висоти культури 3-10 см	3,0-4,0	
Хміль (віком понад 3 роки)	Однорічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування після 1-го обортання за висоти бур'янів 10-15 см	4,0	

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту м'ятої перцевої, райграсу однорічного, конюшини польової 1-го та 2-го років вегетації та насіннєвих посівів конюшини польової, повзучої, гібридної; люцерни 1-го року вегетації (насінні); ярих зернових (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом люцерни або конюшини.





Канцлер[®], ВГ

ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ
ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА КУКУРУДЗИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
тифенсульфурон-метил, 750 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:
гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:
250 г у пластиковій пляшці

- ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:**
- Знищенння широкого спектру двосім'ядольних бур'янів
 - Широке вікно застосування
 - Відсутність обмежень у сівозміні
 - Нешкідливий для теплокровних

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гербіциду проникає у рослини через листя, стебла та корені, поглинається ними і пересувається по рослині через флоему та ксилему і накопичується у точках росту, припиняючи поділ клітин, ріст пагонів та коріння. Наявні симтоми дії препарату (знебарвлення, пожовтіння) з'являються вже через декілька днів, а повний гербіцидний ефект настає за 2-3 тижні. Малочутливі та перерослі бур'яни можуть не загинути, проте їх ріст і подальший розвиток припиняються. Ефективність гербіцидної обробки підвищується при теплій вологій погоді, а при сухій та холодній - уповільнюється.



Найчутливіші бур'яни	Помірочутливі бур'яни	Стійкі бур'яни
<ul style="list-style-type: none"> • абутилон Теофраста • вероніка види • вика посівна • гібікус трійчатий • горчак види • горчиця чорна та польова • грицики звичайні • жабрій види • зірочник середній • комеліна види • кропива види • кудрявий • лобода біла • лобода гібридна 	<ul style="list-style-type: none"> • лугтига розлога • незабудка польова • нетреба види • портулак городній • приворотень • редька види • роман собачий • ромашка види • рутка лікарська • соняшник однорічний • талабан польовий • фіалка види • щавель (види) • щириця (види) 	<ul style="list-style-type: none"> • амброзія полінолиста (до 2-х листочків) • мак дикий • осот польовий • підмаренник чіпкий • рутка лікарська

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦІД КАНЦЛЕР, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Строк обробки	Норма витрати препарату, г/га
Пшениця озима	Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до появи пропорцевого листка культури включно	15-20 г/га + ПАР Флокс, РК
Ячмінь ярий	Обприскування посівів, починаючи з фази 2-3 листків до виходу в трубку культури	10-15 г/га + ПАР Флокс, РК
Кукурудза	У фазі 3-7 листків кукурудзи	10 г/га + ПАР Флокс, РК або 15 г/га без ПАР Флокс, РК

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Не застосовувати Канцлер, ВГ на насінневій кукурудзі.
- Не застосовувати Канцлер, ВГ, якщо температура в ніч перед внесенням була нижче, ніж +6°C, або ж очікувана у день внесення чи у день після обробки вище +25°C.
- Не застосовувати Канцлер, ВГ на полях кукурудзи, що були чи будуть оброблені системними фосфорорганічними інсектицидами протягом 14 днів.
- Застосуйте Канцлер, ВГ один раз на сезон з нормою витрати не більше 25 г/га.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ КАНЦЛЕР, ВГ:

Який період захисної дії препарату Канцлер, ВГ? Канцлер, ВГ володіє гербіцидним ефектом по відношенню до двосім'ядольних бур'янів до 30 діб.

Коли треба застосовувати Канцлер, ВГ для досягнення максимальної гербіцидної ефективності?

Слід пам'ятати, що максимальна ефективність препарату досягається при застосуванні його в ранні фазах (2-4 листки для однорічних рослин) розвитку бур'янів. При застосуванні препарату в більш пізні строки суттєво затримується тільки ріст та розвиток бур'янів.

Як швидко Канцлер, ВГ може знищити оброблені ним бур'яни?

Ріст чутливих рослин призупиняється через декілька годин, перші ознаки гербіцидного ефекту спостерігаються через 5-10 діб, повна загибель – 15-25 діб.

Чи можна використовувати Канцлер, ВГ у бакових сумішах з іншими гербіцидами?

З метою посилення гербіцидної дії препарату можливе його використання в сумішах з іншими препаратами. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з врахуванням видового складу та чисельності бур'янів в посівах. Проте доцільно перед виробничим використанням суміші гербіцидів провести попередню перевірку сумісності з конкретним препаратом. При використанні у посівах льону не використовувати з грамініцидами та ПАР Флокс, РК – це може викликати фітотоксичність. Не застосовувати після внесення препарату Юпітер, РК у посівах сої.

Для підвищення ефективності

Якщо посіві зриджені, за високої чисельності та наявності стійких бур'янів, а також в жарку, суху погоду, слід обробляти сумішев'язковою використовувати поверхнево-активну речовину Флокс, РК, що покращує змочування бур'янів робочим розчином і, таким чином, покращує гербіцидний ефект.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас (малотоксичний). Малотоксичний для теплокровних, риб та птахів. Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від -10°C до +35°C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +6°C до +25°C	200-400 л/га. В разі високого рівня забур'яненості потрібно враховувати максимальну норму витрати робочої рідини
Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Дощ протягом 2-3 годин після застосування може знизити ефективність дії препарату	

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Строк обробки	Норма витрати препарату, г/га
Соя	Після розкриття першого трійчастого листка до початку бутонізації культури, бур'яни: у фазі 2-4 листки, капустяні до 15 см	6-8 г/га + ПАР Флокс, РК, 200 мл/га
Льон-довгунець, льон олійний	5-12 см (фаза ялинки)	15-25 г/га

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Кукурудза: Канцлер, ВГ (10 г/га) + Дікам Плюс, РК (0,75 л/га) + ПАР Флокс, РК (200 мл/га)
- Соя: Канцлер, ВГ (6-8 г/га) + Ефес, РК (1,5-2,0 л/га)

Корвет[®], КС

**ПІСЛЯСХОДОВИЙ СЕЛЕКТИВНИЙ
ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З
ОДНОРІЧНИМИ ТА ДЕЯКИМИ БАГАТОРІЧНИМИ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ БУР'ЯНАМИ В ПОСІВАХ
ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

флуметусулам, 100 г/л + флорасулам, 75 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:

500 мл пластикова пляшка

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока ефективність проти перерослих бур'янів, в тому числі проблемних (підмаренник, мак, сокирки, падалиця соняшнику, стійкого до сульфонілсечовин та імідазоліонів, та ін.)
- Широке вікно застосування – до появи пропорцевого листка
- Не має обмежень у сівозміні
- Сумісний з більшістю засобів захисту рослин та добрив
- Ефективний при температурах від +5°C

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Корвет, КС – гербіцид системної дії, комбінація двох діючих речовин з хімічного класу триазолпіримідини, які за механізмом дії відносяться до групи інгібіторів синтезу ацетолактатсинтази (АЛС) – основний фермент в біосинтезі незамінних амінокислот: лейцин, ізолейцин та валін. Завдяки такому поєднанню досягається високий рівень контролю навіть стійких бур'янів, таких як підмаренник чіпкий, види ромашок та інші.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦІДУ КОРВЕТ, КС:

Високу чутливість до дії препарату проявляють види бур'янів: амброзія полінолиста, адоніс літній, вика польова, волошки сині, гірчак березковидний, горобейник польовий, грицики звичайні, зірочник середній (мокрець), кислиця польова, кучерявець Софії, мак-самосів, нагідки звичайні, паслін чорний, підмаренник чіпкий, редька дика, ромашки види, падалиця соняшнику, спориш звичайний, талабан польовий, щириця біла.

Середній чутливість до дії препарату проявляють такі види бур'янів: гібікус трійчастий, гречка татарська, жабрій звичайний, осот жовтий, рутка лікарська, фіалка польова.

Низьку чутливість до дії препарату проявляють слідуючі види бур'янів: види вероніки, види жовтецю та інші.

Препарат не діє на злакові бур'яні.

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦІДУ КОРВЕТ, КС****В які фази розвитку бур'яни є найбільш чутливими до дії гербіциду?**

Максимальна ефективність досягається при обробці молодих бур'янів на початкових етапах їх розвитку, коли умови середовища (температура, вологість) найбільш сприятливі для активного зростання. Обприскування слід проводити в момент активного росту бур'янів. Рослини чутливих видів бур'янів, які знаходяться на стадії активного зростання в фазі від 2 до 8 справжніх листків, є найбільш чутливими до дії препарату.

Чи ефективний гербіцид проти перерослих бур'янів?

Корвет, КС є найбільш ефективним гербіцидом в контролі підмаренника чіпкого, забезпечуючи знищення бур'яну на стадіях більше 5 кілець. Препарат в максимальних нормах витрати забезпечує високу ефективність на перерослих чутливих бур'янах при застосуванні в фазу виходу в трубку культури.

Коли настає повна загибель бур'янів після застосування гербіциду Корвет, КС?

Ріст рослин чутливих бур'янів припиняється на протязі доби після обробітку. Перші видимі симптоми дії препарату проявляються уже через 1-2 дні після обприскування. Остаточного контролю чутливих бур'янів можна очікувати через 2-3 тижні в залежності від видового складу та стадії розвитку бур'янів під час обприскування, густоти стояння культури, умов навколошнього середовища до, під час та після обприскування та ін.

Який період захищеної дії препарату?

Контролює тільки ті рослини чутливих видів бур'янів, сходи яких зазнали безпосередньої обробки препаратом. Крім того, має місце нетривалий (2-3 тижні) ґрунтову дію препарату на нові сходи деяких видів бур'янів за рахунок поглинання його корінням.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Уникайте застосування препарату при очікуванні заморозків в ніч після обробки або відразу ж після них. Не застосовувати на посівах, які знаходяться в стресовому стані (в період тривалої посухи, при сильному ураженні хворобами, при сильному пошкодженні шкідниками).

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +8°C до +25°C		Рекомендована норма витрати робочого розчину при наземних обробках – 150-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Опади, що випали через 2 години після застосування, не знижують ефективності препарату.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

Корвет, КС (0,05-0,07 л/га) + Сулам, СЕ (0,1-0,2 л/га) – бакова суміш за наявності великої кількості лободи білої.

Культура	Шкідливий об'єкт	Спосіб, час обробки, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Кратність обробок
Пшениця озима та яра	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яні	Під час вегетації, починаючи від фази 2-3 листків до фази пропорцевого листка включно	0,05-0,07	1
Ячмінь озимий та ярий				

Standard
Стандартна серія**Легіон[®], ВГ**

ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ КОРЕНЕПАРОСТКОВИХ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ З РОДИН АЙСТРОВИХ, ГУБОЦВІТИХ ТА ПАСЛЬОНОВИХ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: клопіралід, 750 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ: 2 кг фольгований пакет (20 пакетиків по 100 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Найкращий у боротьбі з айстровими
- Винищує осоти на будь-якій стадії розвитку
- Незамінний у системах захисту буряків та ріпаку

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Легіон, ВГ - селективний системний гербіцид. Проникає у рослини через листя і корені та накопичується в меристематичних тканинах. Діюча речовина гербіциду - клопіралід - належить до класу синтетичних ауксинів, які спричиняють незворотні порушення гормональної регуляції у рослинах. Гербіцидна дія препарату проявляється у вигляді потовщення, згинання та скручування пагонів і стебел, гофрованості листя, утворення нарости та тріщин на стеблах та загибелі рослин.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ЛЕГІОН, ВГ:

Гербіцид використовується для пригнічення та знищенння широкого спектру однорічних двосім'ядольних та багаторічних коренепаросткових бур'янів, що належать до родини айстрових, губоцвітих, пасльонових та деяких видів родини гречкових.

Найчутливішими до препарату виявились такі бур'яни: амброзія поліноміста, волошка синя, вика посівна, гірчак розлогий, молокан польовий, нагідки звичайні, осот жовтий, осот городній, осот рожевий, падалиця соняшнику, роман польовий, види ромашок, короліца посівна, нетреба звичайна, паслін чорний та інші.

ГЕРБІЦІД ЛЕГІОН, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, кг/га	Максимальна кратність обробок
Пшениця, ячмінь	Однорічні двосім'ядольні, в т. ч. стійкі до 2,4-Д та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури	0,06-0,12	1
Цукрові буряки		Обприскування у фазі 1-3 справжніх листків у культури	0,12-0,2	
Ріпак	Однорічні двосім'ядольні та багаторічні, в т. ч. коренепаросткові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 6-8 листків у однорічних бур'янів, у фазі розетки - початку формування генеративного пагону 2-8 см (проти осотів)	0,12-0,2	

Строки виходу на поле після обприскування: для проведення механізованих робіт – 3 дні, ручних робіт – 7 діб.



УВАГА! При пересів основної культури в рік застосування гербіциду Легіон, врахувати, що безпечний пересів соняшником можливий не раніше ніж через 120 днів, а бобовими через 240 днів.

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЛЕГІОН, ВГ:****Коли доцільно використовувати гербіцид Легіон, ВГ?**

Максимальна ефективність препарату досягається при застосуванні його в ранні фази розвитку бур'янів: для однорічних - 2-4 листки; для багаторічних, коренепаросткових - від фази розетки до висоти рослин 10-15 см. При високій забур'яненості посівів осотами, гірчаком та при висоті рослин більше 15 см потрібно використовувати максимальну норму витрати препарату.

Як вплине несвоєчасне внесення препарату на ефективність гербіцидної обробки? При застосуванні препарату в більш пізні строки розвитку бур'янів гербіцидна дія може знизитися.

Упродовж якого часу проявляється гербіцидна дія препарату? Ріст чутливих рослин призупиняється через декілька годин, перші ознаки гербіцидного ефекту спостерігаються через 5-10 діб, повна загиbelь - через 15-25 діб. Ефективність дії препарату залежить від видового складу та стадії розвитку бур'янів, густоти стояння культури та погодно-кліматичних умов під час обприскування.

Чи можна використовувати гербіцид у суміші з іншими пестицидами?

Гербіцид Легіон, ВГ за необхідності можна використовувати в бакових сумішах з препаратами інших хімічних груп та рідкими добриками. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з врахуванням видового складу та чисельності шкідливих об'єктів в посівах. Проте необхідно перед виробничим використанням суміші гербіцидів провести попередню перевірку сумісності з конкретним препаратом.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас (малотоксичний). Малотоксичний для ссавців. Малонебезпечний для риб та птахів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від -10°C до +35°C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +10°C до +25°C	При наземному обприскуванні 200-400 л/га. В разі високого рівня забур'яненості потрібно використовувати максимальну норму витрати робочої рідини
Погодні умови в період застосування	Погодні умови в період застосування
Однією з умов ефективної дії препарату є відсутність опадів після внесення препарату протягом 2 годин.	Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, кг/га	Максимальна кратність обробок
Кукурудза, капуста, гарчиця	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів у фазі "розетки" (за висоти осотів 15-20 см) від фази 2 листків у культури. Обприскування посівів від фази 3-4 листків до появи бутонів у культури	0,2	
Пророцтво, овес	Однорічні двосім'ядольні та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування від фази кущення до виходу в трубку культури	0,06-0,12	
Льон-довгунець (на технічні цілі)	Однорічні двосім'ядольні та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування у фазі «ялинки» культури	0,04-0,12	
Часник, цибуля (окрім «на перо»)	Однорічні двосім'ядольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів у фазі «розетки» (за висоти осотів 15-20 см) від фази 2 листків у культури	0,1-0,16	
Газони	Однорічні та багаторічні двосім'ядольні бур'яни (кульбаба, подорожник, щавель, деревій, ромашка та ін.)	Обприскування по вегетуючим бур'ям після первого покосу	0,12-0,25	

1

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Буряки цукрові: Легіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га) + Стилет, КЕ (0,8-1,5 л/га)
- Буряки цукрові: Легіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га) + Шквал, КЕ (0,6-1,2 л/га)
- Кукурудза: Легіон, ВГ (0,1 кг/га) + Сулам, СЕ (0,4 л/га)



Standard

Стандартна серія

Меркурій[®], ВГ

**ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ
З ОДНОРІЧНИМИ ТА ДЕЯКИМИ
БАГАТОРІЧНИМИ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ
БУР'ЯНАМИ В ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: трибенурон-метил, 750 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ: 1 кг фольгований пакет (20 пакетиків по 50 г) та 500 г пластикова пляшка



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знищенння бур'янів, стійких до 2,4-Д
- Тривалий період застосування – від 2-3 листків до появи пропорцевого листка культури
- Для препарату не обмежується погодними та ґрунтовими умовами
- Відсутність фітотоксичності
- Зручність внесення
- Відсутність обмежень у сівозміні

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Гербіцид проникає у рослини через листя і корені. На клітинному рівні дія препарату проявляється у припиненні ділення і порушенні диференціації клітин у точках росту рослини. Візуально гербіцидний ефект проявляється у вигляді призупинення росту рослин через 5-8 днів, з послідуючою їх загибеллю через 1-2 тижні. Тепла та волога погода підвищує швидкість дії гербіциду, а прохолодна та суха – уповільнює її.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦІДУ МЕРКУРІЙ, ВГ:

Чутливі бур'яни: амброзія полінолиста (сім'ядолі – 2 листки), біфора промениста, гірчиця (види), грицики звичайні, дворядник (види), жабрій звичайний, жовтець (види), жовтозілля звичайне, зірочник середній, злинка канадська, кислиця (види), кропива глуха, кукіль звичайний, латук (молокан) компасний, льонок (види), мак дикий, редька дика, ріпак (падалиця), роман (види), ромашка (види), соняшник однорічний, спориш звичайний, сухоребрик (види), талабан польовий, фіалка польова, хрінниця (види), щириця розлога, шпергель звичайний.

Середньочутливі: будяк польовий, волошка синя, гірчак березковидний, калачики, королиця (види), кульбаба лікарська, лобода біла, осот жовтий (польовий), підмаренник чіпкий (3-4 міжвузля), фіалка триколірна, щавель (види).

Стійкі бур'яни: березка польова, вероніка плющолиста, рутка лікарська, всі види злакових бур'янів.

ГЕРБІЦІД МЕРКУРІЙ, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Способ, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, г/га	Максимальна кратність обробок
Озима пшениця	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядолині, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур'яни	Обприскування посівів від фази 2-3 листків до появи пропорцевого листка включно	15-25	1
Ярий ячмінь		Обприскування посівів від фази 2-3 листків до виходу в трубку культури	15-20	
Соняшник (гібриди стійкі до трибенурон-метилу)		Обприскування в фазі від 2 до 8 справжніх листків культури та ранні фази росту бур'янів	20-50 + ПАР Флокс, РК (0,1л/100 л води)	

УВАГА! При використанні гербіциду Меркурій на соняшнику стійкому до сульфоніл-сечовин, не рекомендується сумісне використання в бакових сумішах з протизлаковими гербіцидами. Контроль злакових бур'янів можна проводити за 5-7 днів до або після застосування препарату Меркурій.



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ МЕРКУРІЙ, ВГ:

Норма витрати та строки застосування.

Найкращий гербіцидний ефект досягається при обробці посівів в період активного росту молодих бур'янів (2-4 листки – для однорічних, розетки – для багаторічних). Норма витрати препарату залежить від фази розвитку та видового складу бур'янів. Максимальна норма витрати доцільна при наявності перерослих (більше 4-х листків для однорічних, стеблування – для багаторічних) чутливих бур'янів або значній кількості середньо чутливих і стійких до препарату бур'янів. Застосування в умовах жаркої сухої погоди:

- збільшити норму робочого розчину до 250-300 л/га;
- збільшити норму ПАР Флокс, РК;
- проводити обробіток посівів у вечірній та нічний час.

Ознаки дії гербіциду на бур'яни.

- Візуальні ознаки гербіцидного ефекту залежать від виду бур'яну, стадії росту та погодних умов. Перші симптоми у вигляді хлорозу, некрозу з'являються через декілька днів після обробки, через 2-3 тижні бур'яни гинуть. Деякі середньочутливі бур'яни залишаються зеленими протягом тривалого часу, однак їх розвиток пригнічено.
- При обробці помірночутливих бур'янів в більш пізні строки розвитку та за посушливої погоди ознаки дії гербіциду з'являються пізніше.
- Строки виходу після обприскування для механізованих робіт – 3 дні.

Бакові суміші.

- З метою підсилення гербіцидної дії препарату можливе використання його в сумішах з іншими гербіцидами, та рідкими добревами. Зазвичай використовується наступна пропорція: 10-15 г/га Меркурій, ВГ + 1/2-2/3 гектарної норми одного з препаратів: Дікам Плюс, РК, Легіон, ВГ, Сулам, СЕ.
- Не рекомендується сумісне застосування з фосфорорганічними інсектицидами.

Для підвищення ефективності.

Якщо посів зріджений, за високої чисельності та наявності стійких бур'янів, а також в жарку, суху погоду, слід обробляти засідання поверхнево-активною речовиною Флокс, РК, що покращує змочування бур'янів робочим розчином і, таким чином, покращує гербіцидний ефект.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас (малотоксичний), помірно небезпечний для теплокровних, безпечний для бджіл, птахів, риб.

ГАРАНТИЙНИЙ СТРОК ЗБЕРІГАННЯ: 6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від -10°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C.	
		200-300 л/га

Погодні умови в період застосування		
<ul style="list-style-type: none"> • Тепла та волога погода підсилює активність препарату, але довготривалий посушливий період знижує його активність. • Дощ який випадає протягом трьох годин після внесення препарату може змити його з поверхні листків ще до повного проникнення, що також знижує активність його дії. 		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Способ, час обробок, обмеження	Норма витрати препарату, г/га	Максимальна кратність обробок
Жито	Однорічні та багаторічні двосім'ядолині бур'яни	Обприскування посівів від фази 2-3 листків до появи пропорцевого листка включно	20-25	1
Просо, овес, тритикале	Однорічні двосім'ядолині та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування посівів в фазі кущення культури Обприскування бур'янів у стадії росту 2-6 листків	15-20	



 Professional
Професійна серія

Молтено[®], РК

ГЕРБІЦІД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ОДНОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ І ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ В ПОСІВАХ БОБОВИХ КУЛЬТУР ТА СОНЯШНИКУ, СТІЙКОГО ДО ГЕРБІЦІДІВ З ХІМІЧНОЇ ГРУПИ ІМІДАЗОЛІНОНІ.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імазамокс, 40 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Максимально широкий спектр знищенння злакових та двосім'ядольних бур'янів, в тому числі всіх рас вовчка
- Новий стандарт захисту ІМІ-соняшнику
- Більший ефект – менша післядія
- Має контактно-системну та ґрунтову дію, при достатній вологості ґрунту стримує появу наступних хвиль бур'янів
- Висока вибірковість по відношенню до культурних рослин
- Сумісний в бакових сумішах з інсектицидами, фунгіцидами, регуляторами росту та мікродобривами
- Стримує багаторічні бур'яни, в тому числі осот жовтий і пирій повзучий

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Імазамокс, як і інші гербіциди групи імідазоліонів, проникає в бур'яни через коріння і листя і пересувається по флоемі і ксилемі, накопичуючись в меристематичних ділянках. У чутливих рослин інгібує фермент ацетолактатсінтазу, що призводить до зниження в рослинних тканинах рівня амінокислот – валіну, лейцину і ізолейцину - з подальшим порушенням синтезу білка і нуклеїнових кислот. Ріст чутливих бур'янів зупиняється вже через кілька годин після обробки.

ГЕРБІЦІД МОЛТЕНО, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливий об'єкт	Спосіб, час обробки, обмеження	Норма витрати препарату, л/га	Кратність обробок
Горох	Злакові та двосім'ядольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу 3-5 справжніх листків у культури (злакові бур'яни у фазі 1-3 листки, дводольні – 2-4 листки)	0,75-1,0	1
Соя		Обприскування посівів у фазу 2-3 трійчастих листка у культури (злакові бур'яни у фазі 1-3 листки, дводольні – 2-4 листки)	0,75-1,0	
Соняшник		Обприскування посівів у фазі від 2 до 8 справжніх листків у культури (злакові бур'яни у фазі 1-3 листки, дводольні – 2-4 листки)	1,0-1,2	



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦІДУ МОЛТЕНО, РК:

Як правильно проводити обробку препаратом?

Обробку слід проводити на ранніх стадіях росту бур'янів при оптимальній вологості повітря і ґрунту з низьким робочим тиском оприскувача, робочий розчин потрібно рівномірно нанести на поверхню поля. Для ефективної ґрунтової дії препарату, ґрунт повинен бути вологим та мати дрібногрудкувату структуру.

Які візуальні ознаки гербіцидної дії препарату?

Зазвичай ознаками дії гербіциду є хлороз молодого листя і відмирання точок росту.

Взаємодія гербіциду Молтено, РК з іншими препаратами:

- Забороняється застосовувати спільно з фосфорорганічними інсектицидами (Ріфос, КЕ)
- Не допускається спільне внесення з грамініцидами
- Після обробки препаратом протягом усього сезону забороняється застосування гербіцидів з групи сульфонілсечовин
- Для кращого контролю стійких та перерослих бур'янів в посівах бобових культур можна застосовувати бакову суміш з гербіцидом Ефес, РК

Застереження!

Після застосування препарату можна висівати:

- через 4 місяці – озиму пшеницю;
- через 9 місяців – пшеницю яру, овес, ячмінь ярий та озимий;
- через 11 місяців – кукурудзу, соняшник, сорго, рис;
- через 16 місяців – цукрові та кормові буряки, ріпак озимий та ярий, овочеві культури.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас небезпечності (малотоксичний), небезпечний для водних організмів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки з дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +15 до +25°C		
	Погодні умови в період застосування Опади, що випали через 1 годину після застосування, не знижують ефективності препарату		
	Погодні умови в період застосування Не проводити обприскування при швидкості вітру більше 5 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

- Нут – 0,75-1,0 л/га. Обприскування посівів в ранні фази росту бур'янів (1-3 справжніх листків) і 1-3 справжніх листків культури.
- Люцерна – 1,0 л/га. Обприскування посівів в фазу 1-4 трійчастих листка, в ранні фази росту бур'янів.
- Люпин – 1,0 л/га. Обприскування ґрунту до сходів, після посіву культури.
- Конюшина – 0,75-1,0 л/га. Обприскування посівів до сходів, після посіву культури, або в фазі 1-2 трійчастих листків в ранні фази росту бур'янів.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

Молтено, РК (0,7 л/га) + Ефес, РК (2,0 л/га)




Professional
Професійна серія

Нікоміл[®], МС

ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ І БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ ТА ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

нікосульфурон, 60 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

сусpenзія, що змішується з олією

УПАКУВАННЯ:

10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знижені норми витрати завдяки високій концентрації
- Стійкість до змивання опадами за рахунок уdosконаленої системи ПАР
- Уникальна селективність до рослин кукурудзи
- Широкий період застосування – від 3 до 10 листків кукурудзи
- Сучасна препаративна форма
- Рослинна олія у якості розчинника

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина нікосульфурон проникає у рослини через листя, стебла та корені, швидко пересувається по рослині через флоему та ксилему до точок росту та пригнічує активність ферментів: ацетолактатсинтетази (ALS) та синтази ацетогідроксикислоти (AHAS). Внаслідок цього порушується синтез амінокислот валіну та ізолейцину, що приводить до припинення поділу клітин та росту рослини.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦІДУ НІКОМІЛ, МС:**Чутливі бур'яни:**

- злакові: вівсюг звичайний, гумай (сорго алепське), мишай (види), пажитниця (види), пальчатка кровосплююча, пирій повзучий, плоскуха звичайна, просо волосовидне, райграс, тонконіг однорічний;
- двосім'ядольні: абутилон Теофраста, галінсога дрібноквіткова, гірчак (види), гірчиця польова, грицики звичайні, дурман звичайний, жабрій звичайний, зірочник середній, лобода біла, паслін чорний, портулак городній, редька дика, ріпак (падалиця), суріпиця звичайна, череда трироздільна, щириця звичайна.

Малочутливі бур'яни:

березка польова, осот (види), хвощ польовий.

ГЕРБІЦІД НІКОМІЛ, МС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату, л/га	Строк обробки
Кукурудза	Однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	0,7-1,0	Обприскування у фазі 3-10 листків у культури

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦІДУ НІКОМІЛ, МС:****На яких фазах розвитку бур'яни найбільше чутливі до гербіциду Нікоміл, МС?**

Гербіцид використовується для пригнічення та знищення широкого спектру однорічних і багаторічних злакових та двосім'ядольних бур'янів. Найбільшу ефективність препарат має на початкових стадіях розвитку бур'янів, в фазу 2-4 листків у однорічних широколистих, 3-5 листків у злакових бур'янів та при висоті багаторічних злакових бур'янів 20-30 см.

Що необхідно пам'ятати при роботі з препаратом Нікоміл, МС:

- Не застосовувати препарат на полях кукурудзи протягом 14 днів до чи після обробки фосфорорганічними інсектицидами.
- Не проводити обробку, якщо культура сильно ушкоджена хворобами, шкідниками, посухою та спекою.
- Не проводити обробку, якщо культура мокра від роси чи дощу.

Чи можливе використання препарату в бакових сумішах з іншими гербіцидами?

З метою підсилення гербіцидної дії препарату можливе його використання в бакових сумішах з гербіцидами на основі сульфонілсечовини та дикамбі. Підбір компонентів в бакових сумішах здійснюється цілеспрямовано, з врахуванням видового складу та чисельності бур'янів в посівах. Проте доцільно, перед виробничим використанням суміші гербіцидів, провести попередню перевірку сумісності з конкретним препаратом. Несумісний в бакових сумішах з гербіцидами на основі піридату, бентазону (викликає опіки), 2,4-Д (знижує дію на злакові бур'яни), а також з фосфорорганічними інсектицидами.

Чому, на відміну від інших післясходових гербіцидів Нікоміл, МС не пригнічує рослини кукурудзи до 10 листа включно?

Діюча речовина препарату Нікоміл, МС нікосульфурон належить до групи сульфонілсечовини, але відрізняється специфічною дією на фізіологічні процеси культури. Навіть на більш пізніх стадіях розвитку кукурудзи (фаза 6-10 листків), вона стікає до нікосульфурону завдяки селективності метаболізму (цитохром P450, збуджений піримідин-5-гідроксилюванням) із послідувачим сполученням з глукозою.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: III клас небезпечності.**ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:** 3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.**ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:** Від +1°C до +35°C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
 Від +15°C до +30°C	200-300 л/га. В разі високого рівня забур'яненості потрібно застосовувати максимальну норму витрати робочого розчину
 Погодні умови в період застосування	Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Умовою ефективної дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 3 годин. Не проводити обробку якщо культура мокра від роси чи дощу

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Нікоміл, МС (0,7-1,0 л/га) + Футурин, ВГ (0,15 кг/га)
- Нікоміл, МС (0,7-1,0 л/га) + Сулам, СЕ (0,3-0,4 л/га)



Вівсюг звичайний



Гірчиця польова



Гірчак почечуйний

 Professional
Професійна серія

Пропозит[®], КЕ

**ГРУНТОВИЙ ГЕРБІЦІД ДЛЯ БОРОТЬБИ З
ОДНОРІЧНИМИ ЗЛАКОВИМИ ТА ДЕЯКИМИ
ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ БУР'ЯНАМИ В
ПОСІВАХ ОСНОВНИХ ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР.
ПІСЛЯХОДОВИЙ СЕЛЕКТИВНИЙ ГЕРБІЦІД
В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: пропізохлор, 720 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ: 20 л пластикова каністра



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Контроль однорічних злакових та деяких двосім'ядольних бур'янів
- Гнучкі терміни застосування: до сходів, а на кукурудзі і на ранніх стадіях розвитку
- Поєднання високої гербіцидної активності з відсутністю прояву фітотоксичності у культурних рослин за умов дотримання регламентів застосування
- Тривала захисна дія (30-60 днів)

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Пропізохлор, гербіцид системної дії, абсорбується корінням та проростками, пригнічує поділ клітин шляхом блокування синтезу білків та нуклеїнових кислот. Як і інші сполуки родини хлорацетамідів, пропізохлор також інгібуюте утворення вищих жирних кислот. Рослини кукурудзи особливо толерантні до дії пропізохлору, це дозволяє використовувати препарат навіть по сходам кукурудзи до 3-4 листка (фаза бур'янів: однорічні злакові – проростання – перший листок, однорічні двосім'ядольні – сім'ядолі).

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦІДУ ПРОПОЗИТ, КЕ:

Чутливі ефективність (85-95%)	Середньочутливі ефективність (70-85%)	Середньостійкі ефективність (50-70%)
<ul style="list-style-type: none"> • вівсяг • галінсога, види • гумай (сорго алепське) з насіння • мишій зелений • мишій сизий • пальчатка, види • плоскуха звичайна • щириця, види 	<ul style="list-style-type: none"> • волошка синя • гірчак почечуйний • грицики звичайні • кучерявець Софії • лобода біла • мак, види • пасльон чорний • підмаренник чіпкий • ромашка, види 	<ul style="list-style-type: none"> • гірчак розлогий • гірчиця польова • зірочник середній • кропива глуха • лутига розлога • редька польова

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦІД ПРОПОЗИТ, КЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Способ застосування	Норми внесення, л/га	Кратність обробки
Соняшник, ріпак, цукровий буряк, кукурудза	Однорічні злакові та деякі двосім'ядольні бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	2,0-3,0	1
Кукурудза		Обприскування у фазі до 3-4 листків у культури		

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ПРОПОЗИТ, КЕ:

Які технологічні особливості застосування гербіциду?

Поверхня ґрунту повинна бути вирівняна, та мати дрібногрудкувату структуру. Якщо ґрунт вологий, препарат не потребує заробки в ґрунт, але за тривалої посушливої погоди до сівби, коткування підвищує його ефективність. Після внесення препарату не доцільно проводити міжрядні обробки протягом 2-3 тижнів.

Від чого залежить норма внесення препарату?

На ґрунтах з вмістом гумусу більше 3% необхідно застосовувати максимальну норму препарату.

Чи можна застосовувати гербіцид у бакових сумішах?

Пропозит, КЕ є добрим партнером для ґрунтових гербіцидів з інших хімічних груп, та препаратів на основі сульфонілсечовин та дикамбі (на кукурудзі), але перед використуванням необхідно провести тест на сумісність.

Як готовувати робочий розчин?

Заповніть бак оприскувача до половини водою, додайте необхідну дозу гербіциду та за необхідності компоненти бакової суміші і перемішайте розчин, потім додайте воду що залишилася. Перемішуйте суміш під час всього внесення.



КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування Від +10°C до +25°C		Приготування робочого розчину 200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування Ефективний незалежно від погодних умов, у тому числі понижених вологості ґрунту при дотриманні технології застосування		Погодні умови в період застосування Обприскування доцільно проводити при швидкості вітру не більше 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Способ внесення	Шкідливі об'єкти	Норми внесення, л/га
Соя	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, але до появи сходів культури	Однорічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	2-3
Ріпак	Обприскування посівів у фазі до 2-4 листків у культури		

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

Пропозит, КЕ (2 л/га) + Рейтар, КС (2 л/га)



Рейтар[®], КС

**ГРУНТОВИЙ ГЕРБІЦІД ДЛЯ БОРОТЬБИ З
ОДНОРІЧНИМИ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИМИ ТА
ЗЛАКОВИМИ БУР'ЯНАМИ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
прометрин, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Контроль двосім'ядольних та злакових бур'янів
- Тривала захисна дія
- Ефективність проти бур'янів (амброзія полинолиста, гірчиця польова, редька дика, гірчак (сходи з насіння)

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина ґрунтового гербіциду відзначається високою гербіцидною активністю по відношенню до однорічних двосім'ядольних та деяких злакових бур'янів. Прометрин поглинається проростками та корінцями бур'янів, активно розноситься по ксилемі, накопичується в меристематичних тканинах. Діюча речовина препарату призводить до руйнування фотосинтетичної системи з подальшим припиненням поділу клітин та росту і розвитку рослин.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦІДУ РЕЙТАР, КС:

Буркун лікарський (сходи з насіння), вероніка плющелиста, галінсога, гірчак (сходи з насіння), гірчиця польова, дворядник стеловий, дурман звичайний, жовтозілля звичайне, зірочник середній, калачики, плоскуха звичайна, кропива дводомна, курячі очка польові, лобода біла, осот рожевий (сходи з насіння), паслін чорний, редька дика, пальчатка кровоспиняюча, череда, мишій (види), щириця (види).

ГЕРБІЦІД РЕЙТАР, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Способ внесення	Бур'яни	Норми внесення, л/га
Кукурудза	Обприскування ґрунту до посіву, під час посіву або після, але до появи сходів культури	Однорічні двосім'ядольні та злакові	2,0-4,0
Соняшник			
Картопля	Обприскування ґрунту до появи сходів культури		3,0-4,0



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ РЕЙТАР, КС:

Чи можна використовувати препарат Рейтар, КС в бакових сумішах з іншими ґрунтовими гербіцидами?

Рейтар, КС сумісний в бакових сумішах з іншими ґрунтовими гербіцидами, але в кожному окремому випадку необхідно провести тест на сумісність.

Від чого залежить норма витрати препарату?

Норма витрати препарату регулюється залежно від типу ґрунтів та їх механічного складу:

- мінімальна норма витрати застосовується на малогумусних, легких за механічним складом ґрунтах;
- середня - на суглинкових із вмістом гумусу менше 4%;
- підвищена - на суглинкових і важких із вмістом гумусу 4-5% та торф'яних.

Як досягти найвищої ефективності від застосування перепарату?

На прояв гербіцидного ефекту особливо впливає стан ґрунту перед внесенням гербіциду. Ґрунт перед внесенням препарату має бути оброблений згідно з рекомендаціями (зволоженім, дрібногрудкуватим з ретельно подрібненими рослинними рештками). У разі загрози пересихання верхнього шару ґрунту гербіцид після внесення необхідно заробити легкими або середніми боронами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

II клас (помірнотоксичний). Безпечний для бджіл. Малотоксичний для риб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
			Від +10°C до +25°C
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
			Оптимальні умови для внесення – після дощу

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Способ внесення	Бур'яни	Норми внесення, л/га
Морква	Обприскування ґрунту до висівання, до сходів або у фазі 2 справжніх листків культури	Однорічні двосім'ядольні та злакові бур'яни	2,0-3,0
Коріандр	Обприскування ґрунту до висівання, до сходів або у фазі 2-3 справжніх листків культури		3,0-4,0
Горох на зерно, соя, часник, чина (на кормові цілі)	Обприскування ґрунту до сходів культури		3,0-5,0
Горох овочевий	Обприскування ґрунту до сходів культури		2,0
Квасоля, кріп	Обприскування ґрунту до сходів культури (протягом 2-5 діб після висівання)		3,0-4,0
Петрушка	Обприскування ґрунту до сходів культури		4,0

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту селери, вікі, кормових бобів.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Рейтар, КС (2 л/га) + Екстрем, КЕ (2 л/га)
- Рейтар, КС (2 л/га) + Пропозит, КЕ (2 л/га)



 Standard
Стандартна серія

Сулам[®], СЕ

**ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ
З ОДНОРІЧНИМИ ТА ДЕЯКИМИ
БАГАТОРІЧНИМИ ДВОСІМ'ДОЛЬНИМИ
БУР'ЯНАМИ НА ПОСІВАХ ЗЕРНОВИХ
КУЛЬТУР ТА КУКУРУДЗИ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: 2,4-Д-2-етилгексиловий ефір, 452,42 г/л +
флорасулам, 6,25 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: суспо-емульсія

УПАКУВАННЯ: 5 л пластикова каністра



ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Високий гербіцидний ефект, зумовлений синергічною дією двох діючих речовин
- Широкий період застосування на зернових культурах
- Швидка дія, перші симптоми з'являються через 2-3 дні
- Висока ефективність проти стійких бур'янів (підмаренник чіпкий, ромашка)

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Системний гербіцид Сулам, СЕ – є комбінацією двох діючих речовин з різними механізмами дії: флорасулам та 2,4-Д у формі 2-етилгексилового ефіру. Завдяки такому поєднанню досягається високий рівень контролю навіть стійких бур'янів до дії феноксісполук (2,4-Д), таких як підмаренник чіпкий, ромашка непахуча, зірочник середній, роман польовий та інші. Флорасулам належить до групи тріазолпірідинів, що пригнічують ацетолактатсинтетазу (АЛС) – основний фермент в біосинтезі незамінних амінокислот: лейцин, ізолейцин та валін. 2,4-Д - гербіцид групи феноксищотової кислоти. Завдяки рухомій ефірній його формі (2-етилгексил) швидко поглинається листям, коренями та проростками чутливих видів бур'янів та переміщується у точки росту. В них він діє як інгібітор росту, на гормональному рівні порушуючи ростові процеси рослинних клітин у чутливих бур'янів.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ СУЛАМ, СЕ:

Найчутливіші бур'яни: абутилон Теофраста, амброзія поліноїста, волошка синя, гірчиця польова, грицики звичайні, кардарія крупковидна, кучерявець Софії, лобода біла, мак дикий, нетреба звичайна, ріпак падалиця, редъка дика, соняшник падалиця, сухоребрик Льозеліїв, талабан польовий, щириця види.

Середньочутливі бур'яни: березка польова, бодяк рожевий, осот жовтий

ГЕРБІЦІД СУЛАМ, СЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Способ та час обробки	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Пшениця	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування від фази кущення до утворення 2 міжвузлів культури	0,4-0,6	1
Ячмінь			0,4-0,6	
Кукурудза		Обприскування з фази 3 до фази 7 листків культури, включно	0,4-0,6	

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ СУЛАМ, СЕ:

Чи можна використовувати препарат Сулам, СЕ в бакових сумішах з іншими препаратами?

Препарат сумісний з фунгіцидами, інсектицидами, протидводольними гербіцидами, рідкими азотними добривами та регуляторами росту рослин. Сумісний з грамініцидами на основі ізопротурону та хлортолуруону. Несумісний з грамініцидами на основі феноксапропу, клодинафоп-пропаргілу та діклофопу. Перед приготуванням робочої суміші рекомендується перевірити зміщуваність препаратів у малій ємкості.

Як швидко можна побачити перші прояви дії гербіциду?

Видимі симптоми з'являються вже через 1-3 дні після обробки, повна загиbel настає через 2-3 тижні.

Чи є обмеження у сівозміні після застосування препарату Сулам, СЕ?

При дотриманні регламенту застосування, немає обмежень у сівозміні. Діючі речовини препарату швидко розкладаються у ґрунті до нешкідливих речовин.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).



ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +8°C до +25°C		150-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Не слід проводити обробку відразу після заморозку або при очікуванні заморозків в ніч після обробки		Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Способ, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
Просо	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яни	0,4-0,6	Від фази кущення до виходу в трубку	1
			Фаза 3-5 листків культури	

Professional
Професійна серія

Футурин[®], ВГ

ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ В ПОСІВАХ ПШЕНИЦІ, ЯЧМЕНЮ ТА КУКУРУДЗИ (У ТОМУ ЧИСЛІ СТІЙКИХ ДО 2,4-Д ТА 2М-4Х)

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

дикамбі натрієва сіль, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 60 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:

гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ:

2,5 кг фольгований пакет (10 пакетиків по 250 г)

**ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:**

- Не має аналогів
- Ефект дії від +6°C до +25°C
- Без післядії

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат складається з двох діючих речовин, які у вдалому поєднанні доповнюють одна одну. Діюча речовина тифенсульфурон-метил належить до класу сульфонілсечовин і діє як інгібітор активності ацетолактатсинтетази (АЛС). Потрапляючи у рослини через листя, стебла та корені, вона активно пересувається через флоему та ксилему до точок росту, припиняючи поділ клітин, ріст пагонів та коренів. Діюча речовина дикамба належить до класу синтетичних ауксинів. Поглинаючись листками та корінням рослин, вона швидко розподіляється по тканинах і діє як інгібітор росту.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ФУТУРИН, ВГ:

Абутилон Теофраста, амброзія полінолиста, березка польова, вероніка (види), вика посівна, волошка синя, гірчиця чорна та польова, гірчак (види), гібікус трійчатий, грицики звичайні, жабрій (види), зірочник середній, комеліна (види), кропива (види), курай, лобода біла, лобода гібридна, лутига розлога, мак дикий, незабудка польова, нетреба (види), осот польовий (рання стадія), підмаренник чіпкий, портулак городній, ред'ка (види), роман собачий, ромашка (види), рутка лікарська, соняшник однорічний, спориш, талабан польовий, фіалка (види), цибуля польова, щириця (види), щавель (види).

ГЕРБІЦІД ФУТУРИН, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норми витрати препарату, кг/га	Строки обробки
Озима пшениця, ячмінь ярий	0,15-0,2	Обприскування посівів від фази кущення культури і до входу в трубку
Кукурудза	0,2-0,25	У фазі 3-5 листків культури

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФУТУРИН, ВГ:**Яких умов слід уникати під час використання препарату?**

При використанні гербіциду Футурин, ВГ забороняється:

- застосування на полях кукурудзи протягом 14 днів до чи після обробки фосфороганічними інсектицидами;
- проводити обробку, якщо культура сильно ушкоджена хворобами, шкідниками, посухою та спекою;
- проводити обробку, якщо культура мокра від роси чи дощу.

Яка швидкість дії цього препарату?

Швидкість дії препарату складає 3-7 діб з моменту його застосування.

Який період захисної дії препарату Футурин, ВГ?

Препарат володіє гербіцидним ефектом по відношенню до двосім'ядольних бур'янів впродовж вегетації культури за умови відсутності наступної хвилі бур'янів.

Яких правил необхідно дотримуватись для досягнення високої біологічної ефективності від застосування препарату Футурин, ВГ?

Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Доц протягом 2-3 годин після застосування може знизити ефективність препарату. Слід пам'ятати, що максимальна ефективність препарату досягається при застосуванні його в ранні фази розвитку: 2-4 листків для однорічних рослин та фаза розетки для багаторічних бур'янів. При застосуванні препарату в більш пізні фази розвитку бур'янів його ефективність може помітно знижуватись.

Для підвищення ефективності

Якщо посіви зріджені, за високої чисельності та наявності стійких бур'янів, а також в жарку, суху погоду, слід обв'язково використовувати поверхнево-активну речовину Флокс, РК, що покращує змочування бур'янів робочим розчином і, таким чином, покращує гербіцидний ефект.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний). Малотоксичний для теплокровних. Малонебезпечний для риб та птахів. Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від -10°C до +35°C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +10°C до +25°C Забороняється використання препарату при температурі нижче +6°C і вище +25°C	200-400 л/га. В разі наявності високого рівня забур'яненості потрібно застосовувати максимальну норму витрати робочої рідини
Погодні умови в період застосування	
	Гербіцид необхідно застосовувати у суху погоду. Умовою ефективної дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 2-3 годин. Не проводити внесення по мокрим від дощу чи роси рослинам

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Кукурудза: Футурин, ВГ (0,15 кг/га) + Нікоміл, МС (0,7-1,0 л/га)



 Professional
Професійна серія

Хантер[®], РК

**ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ТА ГРУНТОВОЇ ДІЇ
ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ ТА
ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ ГІБРИДІВ
СОНЯШНИКУ, СТІЙКИХ ДО ДІЮЧИХ
РЕЧОВИН ГРУПИ ІМІДАЗОЛІНОНІ.**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імазапір, 15 г/л + імазамокс, 33 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Знищенння як злакових, так і двосім'ядольних бур'янів
- Одна обробка за сезон
- Контроль вовчка соняшникового
- Добра ґрунтована дія на наступні хвилі сходів бур'янів
- Висока ефективність при застосуванні в мінімальній та нульовій системах обробки ґрунту

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діючі речовини імазапір та імазамокс в короткий термін поглинаються через листя та проникають через кореневу систему рослини. Імазапір та імазамокс потрапляють через ксилему і флоему, діючи як інгібітор ензиму ацетогідроксикацидсінтазу (AHAS) або ацетолактатсінтазу (ALS). AHAS є каталізатором амінокислот: валіну, лейцину та ізолейцину. Вказані амінокислоти є головними для білків, необхідних для росту рослинних клітин. Інгібування AHAS діючими речовинами групи імідазоліноні сприяють зниженню синтезу цих амінокислот, які в свою чергу призводить до загибелі бур'янів.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ХАНТЕР, РК:

Абутилон Теофраста (*Abutilon theophrasti Medicus*), амброзія, види (*Ambrosia spp.*), берізка польова (*Convolvulus arvensis*), вівсюг звичайний (*Avena fatua*), вовчок (*Orobanche Cumana*), гірчак березковидний (*Polygonum convolvulus*), гірчиця польова (*Sinapis arvensis*), грицики звичайні (*Capsella bursa-pastoris*), жабрій звичайний (*Galeopsis tetrahit*), зірочник середній (*Stellaria media*), лобода біла (*Chenopodium album*), мишій, види (*Setaria spp.*), молочай, види (*Euphorbia spp.*), нетреба звичайна (*Xanthium strumarium*), осот жовтий (*Sonchus arvensis*), осот рожевий (*Cirsium arvense*), паслін чорний (*Solanum nigrum*), підмаренник чіпкій (*Galium aparine*), просо куряче (*Echinochloa crus-galli*), просо, види (*Panicum spp.*), редька дика (*Raphanus raphanistrum*), ромашка, види (*Matricaria spp.*), рутка лікарська (*Fumaria officinalis*), талабан польовий (*Thlaspi arvense*), щириця, види (*Amaranthus spp.*).



Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати препарату, л/га	Спосіб і строки застосування
Соняшник (гібриди стійкі до даного гербіциду)	Злакові та двосім'ядольні бур'яни	1,0-1,2	Обприскування у фазі 4 листків культури та на початкових фазах розвитку бур'янів

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ХАНТЕР, РК:

Чи можна застосовувати гербіцид Хантер, РК в сумішах з добривами для позакореневого підживлення або додавати аміачну селітру для покращення дії препарату?

Ні. При застосуванні робочого розчину даного гербіциду в суміші з мінеральними добривами відбувається більш швидке поглинання діючих речовин, що може привести до фітотоксичноності.

Протягом якого часу робочий розчин придатний для використання?

Протягом однієї доби, необхідно його ретельно перемішати перед застосуванням.

Чи має значення жорсткість води при приготуванні робочого розчину?

Іони Ca ++ мають буферну здатність, тому жорсткість води в даному випадку не є проблемою, при використанні м'якої води слід застосовувати мінімальну норму витрати препарату – 1 л/га.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Після застосування гербіциду Хантер, РК важливо дотримуватись наступного чергування культур у сівозміні: без обмежень (гібриди соняшнику, гібриди ріпаку стійкі до діючих речовин групи імідазоліонів); через 4 місяці (пшениця, жито); через 9 місяців* (кукурудза, ячмінь**, овес, рис, соняшник, соя, горох, боби, сорго); через 18 місяців (овочі, картопля); через 24 місяці (цукрові та кормові буряки, ріпак, гречка, просо, інші культури).

* коли pH ґрунту вище 6,2 і сукупна опадів бульща нижче 200 мм.

** якщо сукупна опадів менша ніж 200 мм і pH нижче 6,2, існує небезпека прояву фітотоксичноності, негативні наслідки якої можуть бути знижені за рахунок механічного обробітку ґрунту на глибину не менше 15 см.

За недостатньою кількості опадів та перебування поверхневого шару ґрунту протягом літа в сухому стані, можливе пригнічення осімого пшениці та озимого жита. Слід уникати використання пестицидів групи ALS інгібіторів у попередніх полях та наступній культурі (сульфонілсечовини та інші).

Препарати з групи імідазоліонів не повинні використовуватись на одному полі частіше ніж один раз на три роки.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний). Небезпечний для водних організмів. Препарат помірно токсичний для теплокровних.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га
	У дні з високою температурою, обприскування бажано проводити у вечірні години або ранці. При стандартному застосуванні препарат стійкий до змивання дощем через годину після обприскування.		Не проводити внесення при швидкості вітру понад 3-4 м/с





Шквал[®], КЕ

ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: хізалофоп-П-етил, 125 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ: 20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Повне знищення однорічних та багаторічних злакових бур'янів
- Застосування незалежно від фази розвитку культури
- Ефективність навіть при помірно низьких температурах (+10 °C)
- Швидкість поглинання діючої речовини

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина препарату проникає в рослину через листки та стебла і пересувається по ній через флюему та ксилему до точок росту. Препарат знищує як надземну, так і підземну (кореневу) частини злаків, запобігаючи відростанню багаторічних видів. Не викликає фітотоксичності у культурних рослин, на яких рекомендованій до застосування. Гербіцид знищує тільки ті бур'яни, які були в посівах на момент обробки.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦИДУ ШКВАЛ, КЕ:

Однорічні злакові: бромус розчепрений, вівсюг звичайний, канаркова трава короткоколоса, плюскуха звичайна, лисохвіст лучний, метлюг білий, мишій сизий, мишій зелений, пальчатка кровоспиняюча, падалица зернових, пажитниця однорічна, тонконіг однорічний.

Багаторічні злакові: гумай (сортого алецьке), очерет звичайний, польовоці біла, пирій повзучий, свинорій пальчастий, тонконіг звичайний. На двосім'ядольні бур'яни препарат не діє.

ГЕРБІЦІД ШКВАЛ, КЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Способ і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Буряки цукрові, соняшник, соя	Однорічні злакові	Обприскування посівів у фазу 2-4 листків у бур'янів (незалежно від фази розвитку культури)	0,4-0,8	1
Ріпак ярій та озимий	Багаторічні злакові (пирій)	Обприскування посівів при висоті пирію 10-15 см (незалежно від фази розвитку культури)	0,8-1,2	



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Слід уникати використання максимальних норм витрат препарату Шквал, КЕ на соняшнику та ріпаку за несприятливих погодних умов (екстремально високі температури та ін.): рекомендуємо знижувати максимальну норму застосування препарату до 0,8 л/га та застосовувати більше робочої рідини - до 300 л/га - для зниження концентрації робочого розчину.

При застосуванні препарату в бакових сумішах з гербіцидами проти двосім'ядольних бур'янів за несприятливих погодних умов можливе зниження дії на злакові бур'яни (пирій, види проса, та деякі інші).



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ШКВАЛ, КЕ:

Яка швидкість дії гербіциду Шквал, КЕ?

Дія препарату на злакові бур'яни проявляється через 5-10 днів після обробки, повна загибель їх відбувається через 7-20 днів (залежно від видового складу бур'янів та погодних умов).

Яких вимог треба дотримуватись для досягнення максимальної ефективності від внесення препарату?

Слід пам'ятати, що норма витрати препарату та ефективність гербіцидної обробки буде залежати від чисельності та видового складу бур'янів, стану посівів культурних рослин. Найвищий рівень гербіцидної дії (до 95%) досягається при обробці посівів в період активного розвитку бур'янів: від фази 2-4 листків до початку кущення для однорічних бур'янів, та при висоті до 10 см у багаторічних бур'янів. Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площа і рясне змочування рослин під час проведення внесення препарату.

Яких дій треба уникати при використанні цього препарату?

- Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3-4 м/с, а також коли культура пошкоджена хворобами, шкідниками або знаходитьться у стресовому стані під дією вітру, морозу чи внесених раніше гербіцидів.
- У дні з високою температурою обприскування бажано проводити у вечірні години або вранці.
- Для досягнення високої ефективності препарату після обприскування протягом 6 годин не повинні випадати атмосферні опади.

Наскільки ефективним буде використання препарату Шквал, КЕ при прохолодних погодних умовах?

Завдяки тому, що діюча речовина хізалофоп-П-етил належить до складних органічних ефірів (арилоксифеноксигропілонатів), вона відрізняється підвищеною легкістю та рухливістю у рослинах. Це обумовлює високу ефективність препарату в умовах більш низьких температур порівняно з діючими речовинами інших хімічних груп.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

II клас небезпечності (малотоксичний). Малотоксичний для ссавців, риб і бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
		200-400 л/га. В разі високого рівня забур'яності потрібно застосовувати максимальну норму витрати робочого розчину.
		Погодні умови в період застосування

Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3-4 м/с, а також коли культура пошкоджена хворобами, шкідниками, або знаходитьться у стресовому стані під дією вітру, морозу чи внесених раніше гербіцидів.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Способ і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кратність обробок
Томати, цибуля, морква, капуста	Однорічні злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазу 2-4 листків у бур'янів незалежно від фази розвитку культури	0,4-0,8	1
Картопля	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни, в т. ч. пирій повзучий	Обприскування посівів у фазі 2-4 листків у однорічних бур'янів висотою пирію 10-15 см незалежно від фази розвитку культури	0,6-1,2	
Томати, цибуля, морква, капуста	Багаторічні злакові бур'яни	Обприскування посівів за висоту бур'янів 10-15 см незалежно від фази розвитку культури	0,8-1,2	
Льон-довгунець	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазі «ялинки» культури (за висоту пирію повзучого 10-15 см.)	0,8-1,2	

Також препарати з аналогічною дією речовиною використовують для захисту столових і кормових буряків, огірків, кавунів, гороху, конопель.

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Буряки цукрові: Шквал, КЕ (0,6-1,2 л/га) + Легіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га)





Юпітер[®], РК

ГЕРБІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ОДНОРІЧНИХ ТА БАГАТОРІЧНИХ ДВОСІМ'ЯДОЛЬНИХ ТА ЗЛАКОВИХ БУР'ЯНІВ У ПОСІВАХ ГОРОХУ ТА СОЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
імазетапір, 100 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Одна обробка за сезон
- Тривала дія
- Застосування до сходів культури або по вегетації
- Широкий діапазон температур

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гербіциду поглинається коренями та листками рослин, переміщується по флоемі та ксилем і накопичується в меристематичних тканинах. Імазетапір знижує активність ферментів ацетолактатсинтетази та ацетогідроксилази з подальшим порушенням синтезу валіну, лейцину та ізолейцину, порушення синтезу ДНК, що призводить до зупинки поділу клітин та росту рослин.

СПЕКТР ДІЇ ГЕРБІЦІДУ ЮПІТЕР, РК:

Гербіцид використовується для пригнічення та знищенння широкого спектру злакових та двосім'ядольних бур'янів.

Злакові:	Двосім'ядольні
• гумай (сорго алепське)	• амброзія полінолиста
• мишій зелений	• галінсога дрібноквіткова
• пальчата кровоспиняюча	• гірчак березко видний
• пальчата лінійна	• гірчиця (види)
• плоскуха звичайна	• гречка посівна
• просо посівне	• грицики звичайні
• сітій бульбоносна	• дурман звичайний
• сітій істівна	• зірочник середній
	• кропива глуха
	• кропива дводомна
	• кучерявець Софії
	• лобода (види)
	• молочай болотний
	• молочай плямистий
	• нетреба звичайна
	• осот польовий
	• паслін чорний
	• підмаренник чіпкий
	• повитиця польові
	• портулак городній
	• редъка дика
	• рутка лікарська
	• соняшник однорічний
	• сурпиця звичайна
	• сухоребрик
	• талабан польовий
	• хрінниця віржинська
	• хрінниця польова
	• чорноцір звичайний
	• щавель горобиний
	• щавель кучерявий
	• щириця (види)
	• якірці сланкі

Ступінь чутливості дивись у таблиці "Чутливість бур'янів до гербіцидів"

ГЕРБІЦІД ЮПІТЕР, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га
Соя	Злакові та однорічні двосім'ядольні бур'яні	Обприскування ґрунту до висівання, до появи сходів або по сходах у фазі 2-3 справжніх листків	0,5-1,0
Горох			0,5-0,75



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЮПІТЕР, РК:

Як правильно провести обробку препаратом Юпітер, РК при досходовому застосуванні? При досходовому застосуванні препарату можна провести обробку шляхом наземного обприскування до або після посіву культури. Передпосівна обробка препаратом здійснюється у добре оброблений ґрунт з загортанням у шар до 6 см під культувацію. Післяпосівна обробка проводиться протягом 2-3 днів після посіву культури.

Від чого залежить ефективність дії гербіциду Юпітер, РК? Слід пам'ятати, що ефективність гербіцидної обробки залежатиме від чисельності та видового складу бур'янів, стану посівів культурних рослин; обов'язково вимогою є забезпечення суцільного покриття площині і рясне змочування рослин під час проведення внесення препарату. Застосування препарату тільки за рекомендаціями. Обробку посівів проводити своєчасно в ранні фази розвитку бур'янів (до 4 справжніх листків). Для збереження «гербіцидного екрану» не проводити міжрядних культувацій протягом 2-3 тижнів після обробки.

Який період захисної дії препарату? Препарат ефективний впродовж всього вегетаційного періоду за відсутності другої хвилі бур'янів.

Яка швидкість дії гербіциду Юпітер, РК? Гербіцид починає діяти відразу після внесення, відміння рослин відбувається в період від 2 до 8 тижнів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Культури, які можна вирощувати в наступному році на площах, де раніше застосовувався гербіцид Юпітер, РК: Після збирання врожаю та глибокого обробітку ґрунту можна сіяти такі культури: бобові, люцерну, конюшину, озиму пшеницю, жито, яру пшеницю, кукурудзу; через 1,5 року після обробки препаратом – соя, картоплю, жито, овочеві культури та однорічні трави; через 2 роки після обробки – цукровий та картомій буряк, озимий та ярий ріпак.

Після застосування гербіциду не можна вносити препарати з групи сульфонілсечовин та імідазолінів протягом всієї вегетації культур і навіть пізньої осені. Не можна застосовувати у бакових сумішах з протизлаковими гербіцидами.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Малотоксичний для ссавців, риб і бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		200-400 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Умовою ефективної дії препарату є відсутність опадів після обприскування протягом 6 годин. У дні з високою температурою обприскування бажано проводити у вечірні години або вранці.		
	Погодні умови в період застосування		
	Не проводити внесення при швидкості вітру понад 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га
Люцерна (безпокривна)	Злакові та однорічні двосім'ядольні бур'яні	Обприскування ґрунту до висівання, до появи сходів культури або після появі сходів у фазі 1-2 трійчастих листків культури. Або через 7-10 днів після первого покосу (не частіше 1 разу на 3 роки на одному полі).	1,0
		Обприскування посівів у фазі 2-3 справжніх листків	0,4-0,5
		2-3 пари справжніх листків культури	0,8-1,0

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ:

- Соя: Юпітер, РК (0,5 л/га) + Ефес, РК (2,0 л/га)



 Standard
Стандартна серія

Альтекс®, КЕ

**КОНТАКТНО-ШЛУНКОВИЙ ІНСЕКТИЦІД
ДЛЯ БОРОТЬБИ З ШИРОКИМ СПЕКТРОМ
ШКІДНИКІВ РОСЛИН**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: альфа-циперметрин, 100 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ: 5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Миттева дія та надійний ефект
- Знищення широкого спектру шкідників
- Незалежність від стадії розвитку комах
- Зберігання високих показників врожаю
- Можливість авіаавнесень

МЕХАНІЗМ ТА СПЕКТР ДІЇ:

Інсектицид має контактно-шлункову дію, застосовується для захисту пшениці, гороху, цукрових буряків, капусти, ріпаку, картоплі, яблуні, земель несільськогосподарського призначення та лісових насаджень від найнебезпечніших шкідників.

Активний компонент препарату альфа-циперметрин, як і всі синтетичні піретроїдні сполуки, спричиняє загибель шкідників через сильне збудження нервових клітин комах з наступним проявом паралічу електричної активності центральної та периферичної нервової системи.

ІНСЕКТИЦІД АЛЬТЕКС, КЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Строки обробки	Максимальна кратність обробок
Пшениця	П'явици, клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, попелиці, білшки, цикачки	0,1-0,15	Обприскування в період вегетації	2
		0,1-0,15 (авіа)		
Горох	Зернівка горохова, трипси, попелиці	0,15-0,25		
Буряки цукрові	Лучний метелик, попелиці, білшки, довгоносики	0,1-0,25		
		0,1-0,15 (авіа)		
Капуста	Міль, совки, білани	0,1-0,15		
Ріпак	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті білшки, попелиці	0,1-0,15		
Яблуня	Плодожерки, листовійки, попелиці	0,15-0,25		
Землі несільськогосподарського призначення (дика рослинність, узбічча доріг)	Саранові	0,2		
Лісові насадження	Золотогуз, шовкопряди	0,05-0,1		

Строки виходу для проведення механізованих робіт – 4 дні, ручних – 10 діб.



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АЛЬТЕКС, КЕ:

Як правильно обрати оптимальну норму витрати препарату для обробки?

Максимальна норма витрати відповідає ефективності препарату 80-95%, мінімальна – 60-70% за умов високоякісної організації і вчасного внесення препарату. Для досягнення високої ефективності в боротьбі зі шкідниками обробку рослин препаратором необхідно починати при чисельності шкідників, що відповідає економічному порогу шкодочинності. У разі виявлення в посівах чисельності шкідників, при якій можливе зниження врожаю більше 25%, заздалегідь планують повторні обробки.

Якою мірою препарат токсичний для бджіл?

Препарат має репелентні та антифідингові властивості по відношенню до корисних комах. У зв'язку з цим, після обробки інсектицид безпечний для медоносних бджіл.

Чи має інсектицид фітотоксичну дію?

Фітотоксичні властивості у препарату відсутні, при його використанні некротичні плями на листках капусти та плодах яблуні не спостерігаються. Тому даний інсектицид є оптимальним препаратом для захисту капусти та яблуні впродовж всього періоду вегетації.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

II клас (помірнотоксичний). Помірнотоксичні для ссавців та риб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.


ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +35 °C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +12°C до +25°C		На польових культурах та землях несільськогосподарського призначення – 200-400 л/га; у садах – 600-800 л/га. При проведенні обприскування авіаційним методом – 50 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	У спекотливі дні обприскування бажано проводити у вечірні години або вранці		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб та час обробки, обмеження	Максимальна кратність обробок
Люцерна (насіннєві посіви)	Саранові, попелиці, довгоносики, клопи	0,05-0,1	Обприскування в період вегетації	2
	Білушки	0,1-0,15	Обприскування сходів	
	П'явици, клоп шкідлива черепашка, пшеничний трипс, попелиці, білшки, цикачки	0,1-0,15	Обприскування в період вегетації	
	Листовійка, листова філоксера	0,24-0,36	Обприскування в період вегетації	
	Шкідники запасів	0,2 мл/м ²	Обробка вологим способом (200 мл роб. розчину/1 м ² допуск людей через 20 днів)	

Також препарати з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту шипшини, гірчиці, тютюну.



 Professional
Професійна серія

Дестрой[®], КС

СИСТЕМНИЙ ІНСЕКТИЦІД КОНТАКТНО-ШЛУНКОВОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ШКІДНИКІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

імідаклоприд, 250 г/л + лямбда-цигалотрин, 80 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат сусpenзї

УПАКУВАННЯ:

5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока швидкість дії
- Тривалий захисний період
- Репелентний ефект
- Відсутність резистентності шкідників до препарату
- Ефективна дія навіть від +10°C

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Системний інсектицид контактно-шлункової дії для боротьби з широким спектром шкідників на пшениці, ріпаку та яблуні.

Одна з діючих речовин імідаклоприд швидко поглинається рослинами та переноситься по них акропетально. Імідаклоприд діє як антагоніст постсинаптичних нікотинових рецепторів, з наступним руйнуванням центральної нервової системи комах. Діюча речовина лямбда-цигалотрин належить до класу синтетичних піретроїдів. Лямбда-цигалотрин має контактно-кишкову дію та репелентні властивості. При потраплянні в організм шкідників впливає на нервову систему, порушуючи діяльність нейронів шляхом взаємодії з натрієвим каналом. Симптоми дії проявляються у вигляді сильного збудження нервової системи, судом кінцівок, з наступним паралічем та загибеллю комах.

ДЕСТРОЙ, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідник	Норма витрати препарату, л/га	Строки обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кількість обробок
Пшениця осіма	Клоп шкідлива черепашка, трипси, п'явиці, попелиці	0,1-0,15	Обприскування в період вегетації	30	1
Ріпак ярий та озимий	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті білочки, попелиці				
Яблуня	Яблунева плодожерка, листовійки, каліфорнійська щітівка, попелиці	0,1			2

Проведення механізованих робіт – 4 доби, ручних робіт – 10 діб.



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДЕСТРОЙ, КС:

У чому полягає унікальність цього препарату?

Поєднання у препараті системної та контактної діючих речовин з різних хімічних родин дозволяє:

- значно розширити спектр дії проти шкідників
- забезпечити довготривалий захисний ефект і одночасно скоротити строк очікування після внесення препарату
- уникнути резистентності шкідників до препарату

Чи впливає температура та вологість повітря на ефективність препарату?

Інсектицид застосовується у широкому інтервалі температур та вологості повітря. Для виявлення системних властивостей препарату температура має бути не менше +10°C.

Чи має інсектицид фітотоксичну дію?

За умов дотримання регламентів та норм застосування препарату проявів фітотоксичності не спостерігається.

Чи можна використовувати препарат у бакових сумішах з іншими препаратами?

Препарат сумісний з більшістю препаратів, проте перед приготуванням бакової суміші необхідно провести пробне змішування. Бакову суміш слід використовувати відразу після приготування.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

II клас небезпечності (малотоксичний). Препарат токсичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +5°C до +25°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		На польових культурах: 200-400 л/га У яблуневих садах: 800-1000 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Препаратори з аналогічними діючими речовинами використовують для захисту сої, кукурудзи, цукрових буряків, виноградників, картоплі, томатів, гороху, капусти, сорго, соняшнику.



Зелена яблунева попелиця



Клоп шкідлива черепашка



Ріпаковий квіткоїд

Standard
Стандартна серія**Ріфос[®], КЕ**

**ІНСЕКТИЦИД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ДІЇ
ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ШКІДНИКІВ З ГРИЗУЧИМ І
ЧАСТКОВО З КОЛЮЧЕ-СИСНИМ РОТОВИМ
АПАРАТОМ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: хлорпіріфос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: концентрат, що емульгується

УПАКУВАННЯ: 10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Контактно-шлункова дія
- Фумігантні та репелентні властивості
- Діє на дорослих особин та личинки у будь-якій стадії розвитку
- Знищенння кліщів, стійких до диметоату
- Відмінна дія на комах, що ведуть скритний спосіб життя (листовійки, мінуючи молі)

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Хлорпіріфос відноситься до класу фосфорорганічних сполук (ФОС), які є речовинами нервовопаралітичної дії. Механізм дії пов'язаний з пригніченням активності естераз, насамперед ацетилхолінестерази (АХЕ), яка грає важливу роль в передачі нервового імпульсу. За умов блокування цього ферменту пестицидом вільний ацетилхолін накопичується в синаптичній щілині, і нормальне проходження нервових імпульсів порушується - в результаті настає тремор (судорожна активність м'язів), що переходить в параліч.

Циперметрин належить до класу піретроїдів, яким притаманна відносна фотостабільність, селективна токсичність з урахуванням метаболічної деградації. Це інсектициди контактношлункової дії з високою початковою біологічною активністю. Механізм дії пов'язаний з порушенням процесу обміну іонів натрію, деполярізацією мембрани. Діюча речовина пролонгує відкриття каналів для натрію, порушує обмін іонів кальцію, що призводить до виділення великої кількості ацетилхоліну при проходженні нервового імпульсу через синаптичну щілину.

СПЕКТР ДІЇ ІНСЕКТИЦИДУ РІФОС, КЕ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Строки обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Пшениця	Клоп шкідлива черепашка, трипси, п'явичі, злакова попелиця, хлібні жуки, хлібна жужелиця	0,75-1,0	Обприскування культур за наявності шкідників в період вегетації	30	1
Ріпак	Прихованохоботники	0,5-0,6		30	2
Яблуня	Плодожерки, листовійки, молі, кліщі, попелиці	1,0-1,5		30	2

* Інтервал між обробками залежить від швидкості появи нової хвилі шкідників та може складати 15-20 днів, залежно від кліматичних умов, що склалися.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**

Ріфос, КЕ не можна використовувати у спекотні дні (з температурою понад +25°C)!

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ РІФОС, КЕ:

Чи завдає шкоди культурним рослинам використання Ріфос, КЕ?

Препарат не завдає шкоди культурним рослинам, при умові дотримання регламенту застосування.

Коли найбільш доцільно застосовувати препарат Ріфос, КЕ?

Для досягнення високої ефективності препарату Ріфос, КЕ, обробку рослин необхідно починати при чисельності шкідників, що відповідає економічному порогу шкодочинності.

Обприскування пшениці, ячменю та інших культур рекомендується проводити в період вегетації, яблуневі сади – до і після цвітіння.

Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площа і рясне змочування рослин під час внесення препарату.

Чи можна використовувати інсектицид Ріфос, КЕ у суміші з іншими препаратами?

Препарат можна використовувати у бакових сумішах з іншими препаратами, які мають слабо кисле або нейтральне значення pH. Не змішувати з пестицидами, які мають лужну реакцію (сірчане вапно, мідь тощо). Забороняється використовувати препарат з іншими препаратами, що містять діючі речовини на основі сульфонілесечовин (Гурон, ВГ, Футурин, ВГ, Меркурій, ВГ та ін.), а також використання Ріфос, КЕ до 14 днів після внесення даних препаратів. При використанні препарата з іншими інсектицидами обов'язково провести тест на сумісність.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ: II клас (помірнотоксичний). Токсичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ: Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C	
	Погодні умови в період застосування Обов'язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площа і рясне змочування рослин під час проведення внесення препарату. У дні з високою температурою обприскування бажано проводити у вечірні години або вранці.	Погодні умови в період застосування Не проводити внесення при швидкості вітру понад 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Строки обробки	Строк останньої обробки до збирання врожаю, днів	Максимальна кратність обробок
Ячмінь	П'явичі, хлібна жужелиця	0,5-0,75	Обприскування в період вегетації	30	1
Буряки цукрові	Звичайний та сірий бурякові довгоносики, щитоноски	0,8		40	1
Гірчиця	Хрестоцвітні білушки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники	0,5-0,6		30	2
Горох	Горохові плодожерки та зернівка, попелиці	1		30	2





Штурм®, ЗП

**КОНТАКТНИЙ АКАРИЦІД, ЩО ВОЛОДІЄ
ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПРИ БОРОТЬБІ
З РІЗНИМИ ВИДАМИ КЛІЩІВ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
піридабен, 200 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:
змочуваний порошок

УПАКУВАННЯ:
1 кг фольгований пакет (10 пакетиків по 100 г)

- ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:**
- Високоефективний проти різних видів кліщів
 - Знищує блокрилку
 - Забезпечує високу швидкість дії
 - Має тривалий період захисту

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина препарату піридабен пригнічує біохімічний процес мітохондріального транспорту електронів в клітинах шкідників, має швидкий та довготривалий ефект.

СПЕКТР ДІЇ АКАРИЦІДУ ШТУРМ, ЗП:

Високоефективний проти широкого спектру видів кліщів, у тому числі:

- кліщ павутинний (*Panonychus spp.*, *Tetranychus spp.*);
- кліщ виноградний (*Phyllocoptes fructiphilus* spp., *Calepitrimerus spp.*).

Препарат також має побічну дію на блокрилку (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*).

АКАРИЦІД ШТУРМ, ЗП ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідники	Норма витрати препарату, кг/га	Строк обробки	Максимальна кратність обробок
Яблуня	Кліщи	0,5-0,9	Обприскування в період вегетації	1
Виноградники				



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ШТУРМ, ЗП:

Чи можна використовувати Штурм, ЗП в бакових сумішах з іншими препаратами?

Для розширення спектру дії препарат можна використовувати в бакових сумішах з усіма традиційними інсектицидами та фунгіцидами, окрім сильно лужних речовин (наприклад, бордоською рідиною). Перед приготуванням бакової суміші необхідно провести пробне змішування. Бакову суміш слід використовувати відразу після приготування.

Як досягти максимальної ефективності від застосування препарату Штурм, ЗП?
Штурм, ЗП – контактний акарицид, тому для досягнення максимального ефекту обов`язковою вимогою є забезпечення суцільного покриття площин рясного змочування рослин під час проведення внесення препарату.

З метою досягнення високої ефективності в боротьбі зі шкідниками, обробку рослин препаратором доцільно починати при чисельності шкідників, яка відповідає економічному порогу шкодочинності.

Як впливає температура повітря на ефективність дії препарату?
Коливання температури суттєво не впливає на ефективність препаратору.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний)

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від -10°C до +40°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +5°C до +25°C		1000 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування

Умовою ефективної дії препаратору є відсутність опадів після обприскування протягом 3 годин

Не проводити внесення при швидкості вітру понад 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Препаратори з аналогічною діючою речовиною використовують для захисту груші, персиків, огірків, томатів, баклажанів, суніці, чаю, цитрусових, декоративних рослин.





Професійна серія



Арбалет[®], КС

ФУНГІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ, ЯЧМЕНЮ ЯРОГО, СОНЯШНИКУ ТА РІПАКУ ОЗИМОГО

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

азоксистробін, 200 г/л + флутріафол, 120 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:

концентрат суспензії

УПАКУВАННЯ:

5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Системна, контактна, трансламінарна та фумігантна дія
- Ефективний проти збудників грибних хвороб з чотирьох класів
- Широкий спектр та універсальність застосування - один фунгіцид для багатьох культур
- Довгий захисний період
- Подовжує процес фотосинтезу та уповільнює старіння

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Завдяки комбінації діючих речовин, препарат системної та трансламінарної дії Арбалет, КС володіє довготривалими захисними та лікувальними властивостями. Діюча речовина азоксистробін при проникенні крізь листову пластинку інгібує проростання спор та апресоріїв, негативно впливаючи на проростання гіфів грибів. Діюча речовина препарату - флутріафол поглинається листовою поверхнею культури та переноситься по рослині акропетально по ксилемі. Флутріафол діє як інгібітор біосинтезу ергостеролу грибних організмів, що призводить до руйнування клітинних мембран та зупинки розвитку грибних захворювань.

ФУНГІЦІД АРБАЛЕТ, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Способ внесення	Кількість обробок
Озима пшениця	Борошниста роса, септоріоз, піренофороз, іржасті хвороби	0,5-0,75	Обприскування в період вегетації	2
Ячмінь ярий	Борошниста роса, сітчастий, смугастий гельмінтоспоріоз, іржасті хвороби			
Соняшник	Фомоз, іржа, несправжня борошниста та борошниста роса, фомопсис	0,6-1,0		
Озимий ріпак	Фомоз, альтернаріоз, біла гниль, переноспороз, сіра гниль			

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АРБАЛЕТ, КС:****Як готувати робочий розчин фунгіциду Арбалет, КС?**

Заповнити бак оприскувача на 1/4-1/3 водою, включити мішалку і додати в оприскувач необхідну кількість препарату, добре струснувши каністру, та долити необхідну кількість води. Внесення слід проводити з включеною мішалкою.

Як швидко слід використати робочий розчин?

Робочий розчин необхідно повністю використати не пізніше ніж через 24 години після приготування.

Сумісність з іншими препаратами:

Фунгіцид Арбалет, КС сумісний з більшістю препаратів. В кожному окремому випадку перед приготуванням бакової суміші необхідно перевірити препарати на сумісність.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +15°C до +25°C		200-400 л/га
Погодні умови в період застосування			Zabороняється проводити обприскування при швидкості віtru більше 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Препаратори з аналогічними діючими речовинами застосовуються для захисту сої, гороху, цукрових буряків.



Альтернаріоз ріпаку



Бура (листова) іржа



Септоріоз листя та колосу пшениці



Сітчаста плямистість ячменю



Корнет[®], КС

ФУНГІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ХВОРОБАМИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, ВИНОГРАДУ ТА ЯБЛУНИ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
флутріафол, 250 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат сусpenзїї

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Пригнічення широкого спектру хвороб
- Довготривалий ефект
- Підвищення витривалості рослин
- Профілактичні та лікувальні властивості
- Висока мобільність діючої речовини

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Корнет, КС - контактний та системний фунгіцид з лікувальними та захисними властивостями. Діюча речовина препарату поглинається листовою поверхнею культури та переноситься по рослині акропетально по ксилемі. Флутріафол діє як інгібітор біосинтезу ергостеролу грибних організмів, що призводить до руйнування клітинних мембран збудників хвороб та зупинки їх розвитку.

СПЕКТР ДІЇ ФУНГІЦИДУ КОРНЕТ, КС:

Фунгіцид Корнет, КС застосовується в боротьбі з широким спектром хвороб листя та колосу (борошниста роса, ринхоспоріоз, септоріоз, іржа, гельмінтоспоріоз та ін.) в посівах сільськогосподарських культур. Препарат володіє довготривалою захисною та лікувальною дією.

ФУНГІЦІД КОРНЕТ, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Максимальна кратність обробок
Озима пшениця	Борошниста роса, плямистості, септоріоз, стеблова бура іржа, кореневі гнилі, фузаріоз, ринхоспоріоз	0,5		
Ярий ячмінь				
Буряки цукрові	Борошниста роса, церкоспороз	0,25		
Виноградники	Оїдум	0,1		
Яблуна	Борошниста роса, парша	0,15		



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ КОРНЕТ, КС:

У чому полягає унікальність фунгіциду Корнет, КС?

Унікальність цього препарату полягає в тому, що він має потрійну захисну дію: системну, контактну і фумігаційну. Однією з особливостей препарату є фумігаційна властивість: розчин, розпилюючись чи випаровуючись, активно проникає у рослину.

Коли доцільно застосовувати препарат Корнет, КС?

Найбільший фунгіцидний ефект препарату забезпечується у разі застосування його на ранніх стадіях розвитку хвороб. З метою досягнення високої ефективності в боротьбі з хворобами обробку рослин фунгіцидом доцільно починати прияві перших ознак хвороби.

За яких умов обробку препаратом повторюють?

Повторні обробки планують заздалегідь за умов високого рівня ураженості рослин хворобами та сприятливих для їх розвитку гідротермічних умов.

Чи можна використовувати препарат у бакових сумішах з іншими препаратами?

Фунгіцид Корнет, КС сумісний з більшістю препаратів. В кожному окремому випадку перед приготуванням бакової суміші необхідно перевірити препарати на сумісність.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний), помірно небезпечний для теплокровних, токсичний для риб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		На польових культурах: 200-400 л/га У садах і на виноградниках: 600-800 л/га
	Погодні умови в період застосування		
	Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Максимальна кратність обробок
Жито	Борошниста роса, іржасті хвороби, кореневі гнилі	0,5	Обприскування в період вегетації	2



Сітчаста плямистість ячменю



Карликова іржа ячменю



Септоріоз листя та колосу пшениці



Церкоспороз

 Professional
Професійна серія

Ретардин® ЕW, ЕВ

**ФУНГІЦІД СИСТЕМНОЇ ДІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ
ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА РІПАКУ
ВІД ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ
ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ.
МАЄ РЕТАРДАНТНУ ДІЮ НА РОСЛИНИ
ОЗИМОГО РІПАКУ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
тебуконазол, 250 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
емульсія, масло (олія) у воді

УПАКУВАННЯ:
5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока ефективність в обмеженні розвитку та поширення хвороб
- Інноваційна та практична форма поліпшує дію препарату та спрощує приготування робочого розчину
- Має добрий ретардантний ефект на озимий ріпак: запобігає переростанню в осінній період та обмежує ріст вегетативної маси в весняно-літній період

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина тебуконазол швидко поглинається рослинами через вегетативні органи та переміщуючись переважно акропетально, рівномірно розподіляється у ксилемі. Дія тебуконазолу проявляється в пригніченні синтезу ергостеролу в мембронах клітин грибів-патогенів. Ретардин ЕW, ЕВ володіє не тільки захисною, але й профілактичною дією. Препарат забезпечує високу ефективність в боротьбі з широким спектром хвороб рослин, таких як септоріоз, фузаріоз, борошниста роса, іржа, альтернаріоз.

РЕТАРДИН ЕW, ЕВ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Способ обробки	Збудники хвороб	Норма внесення, л/га	Кількість обробок
В якості фунгіциду				
Пшениця озима	Обприскування рослин при появі перших симптомів захворювання	Септоріоз листя, фузаріоз колоса, борошниста роса, бура листова іржа	0,5-1,0	2
		Альтернаріоз, сіра гніль	0,8-1,0	2
В якості ретарданту				
Ріпак озимий	Обприскування рослин в фазі 5-7 листків	Інгібування росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	0,5-0,75	1



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ РЕТАРДИН ЕW, ЕВ:

Який захисний період препарату?

Біологічна ефективність продовжується протягом 2-4 тижнів, в залежності від погодних умов та розвитку хвороб.

Як швидко починає діяти препарат?

Діюча речовина проникає в рослину протягом 2-3 годин.

Які переваги має препаративна форма ЕВ?

РЕТАРДИН ЕW, ЕВ, з діючою речовиною тебуконазол, у препаративній формі ЕВ (емульсія, масло (олія) у воді) являє собою дисперсію розчинених в розчиннику крапель діючої речовини в воді. Заміна більшої частини розчинника водою має наступні переваги:

- Висока швидкість і якість приготування робочого розчину
- Присутність комплексу ПАВ, які створюють стабільний розчин та забезпечують прилипання і швидке проникнення в рослину
- Дозволяє знизити загальну токсичність препаративної форми на культурні рослини та теплокровних, порівняно з концентратами емульсій, без зниження цільової активності.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину	
	Від +10°C до +25°C		
Погодні умови в період застосування			
Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с			

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб внесення	Кратність обробок		
Ячмінь	Борошниста роса, сітчаста плямистість, темно-бура плямистість	1	Обприскування від час вегетації	1		
	Іржа	0,5				
Овес	Корончата іржа, борошниста роса, червоно-бура плямистість	1				
Жито	Бура іржа, борошниста роса, рихноспоріоз, фузаріоз колосу					
Соя	Борошниста роса, антракноз, іржа	1				
Капуста	Альтернаріоз, борошниста роса, плямистості					
Льон олійний	Альтернаріоз, борошниста роса, фузаріоз, іржа	1				
Морква	Альтернаріоз, борошниста роса, склеротиніоз					
Виноград	Оїдіум	0,4				





Ретардин[®], ВГ

СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦІД ТА РЕТАРДАНТ ІЗ ЗАХИСНОЮ ТА ЛІКУВАЛЬНОЮ ДІЄЮ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ТА ОЗИМОГО РІПАКУ ВІД ШИРОКОГО СПЕКТРУ ЗБУДНИКІВ ГРИБНИХ ХВОРОБ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: тебуконазол, 500 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: гранули, що диспергуються у воді

УПАКУВАННЯ: 2,5 кг фольгований пакет (5 пакетиків по 500 г)

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Унікальний допоміжний компонент
- Яскравий ретардантний ефект
- Надійна перезимівля рослин

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина тебуконазол швидко поглинається рослинами через вегетативні органи та переміщуючись переважно акропетально, рівномірно розподіляється у ксилемі. Дія тебуконазолу проявляється в пригніченні синтезу ергостеролу в мембронах клітин грибів-патогенів. Ретардин, ВГ володіє не тільки захисною, але й профілактичною дією. Препарат забезпечує високу ефективність в обмеженні розвитку широкого спектру хвороб рослин, таких як септоріоз, борошниста роса, бура іржа, альтернаріоз, сіра гниль.

РЕТАРДИН, ВГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Способ обробки	Збудники хвороб	Норма внесення, кг/га
В якості фунгіциду			
Пшениця озима	Обприскування рослин при появі перших симптомів захворювання	Септоріоз, фузаріоз колоса, борошниста роса, бура іржа	0,25-0,50
Rіпак озимий		Альтернаріоз	0,40-0,50
В якості ретарданту			
Rіпак озимий	Обприскування рослин в фазі 5-7 листків	Інгібування росту листя та підвищення стійкості до екстремальних погодних умов	0,25-0,38



Борошниста роса пшениці



Септоріоз листя та колосу пшениці



Альтернаріоз ріпаку



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ РЕТАРДИН, ВГ:

Як довго триває дія фунгіциду на шкідливі об'єкти?

Період захисної дії препарату 25-35 днів з моменту обробки.

Коли саме необхідно починати застосування препаратору?

Обробку препаратом необхідно проводити при появі перших симптомів захворювання.

Які хвороби можна контролювати за допомогою препаратору Ретардин, ВГ?

Препарат забезпечує високу ефективність в обмеженні розвитку широкого спектру хвороб рослин, таких як септоріоз, борошниста роса, бура іржа, альтернаріоз, сіра гниль.

Від чого залежить ефективність проведення обробки препаратором?

Ефективність фунгіцидної обробки залежить від якості внесення препаратору. Тому слід ретельно дотримуватися правил регулювання обладнання для внесення препаратору, приготування робочого розчину та організації проведення робіт по застосуванню пестицидів.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від -10°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C	
	Погодні умови в період застосування	Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препаратору, кг/га	Способ внесення	Кратність обробок
Ячмінь	Борошниста роса, сітчаста плямистість, темно-бура плямистість	0,375-0,5	Обприскування в період вегетації	2
	Іржа	0,25		
Жито	Бура листова іржа, борошниста роса, рихноспоріоз, фузаріоз колосу	0,25-0,5		
Овес	Борошниста роса, іржа, червонобура плямистість	0,25-0,6		
Соя	Борошниста роса, антракноз, іржа	0,5		
Виноград	Оїдіум, сіра гниль	0,2-0,3	Перед цвітінням і до закінчення росту ягід	





Форсаж[®], КС

**СИСТЕМНИЙ ФУНГІЦІД ЗАХИСНОЇ
ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
карбендазим, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
концентрат сусpenзїї

УПАКУВАННЯ:
10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- 2 в 1: протруйник насіння та фунгіцид
- Профілактичні та лікувальні властивості
- Швидка дія
- Довготривалий ефект
- Широкий діапазон внесення
- Ефективний за низьких температур
- Стійкий до змивання дощем

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Системний фунгіцид використовується для захисту зернових, ріпаку, цукрових та кормових буряків від комплексу хвороб. Особливість дії препарату полягає в тому, що діюча речовина, карбендазим, поглинається через коріння та зелені тканини і рухається по рослині знизу вверх, пригнічує синтез бета-тубуліну, що викликає порушення обміну речовин патогенних грибів.

ФУНГІЦІД ФОРСАЖ, КС ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Способ внесення	Максимальна кратність обробок
Пшениця яра та озима				
Ячмінь ярий та озимий	Борошниста роса, септоріоз	0,4-0,5		
Жито озиме				
Ріпак озимий та ярий	Альтернаріоз, септоріоз	0,6		
Буряки цукрові та кормові	Церкоспороз	0,3-0,4	Обприскування в період вегетації	2



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФОРСАЖ, КС:

У чому полягає унікальність фунгіциду Форсаж, КС?

Препарат належить до найефективніших препаратів проти збудників хвороб з роду Septoria, Alternaria, Cercospora та ін.

Коли доцільно застосовувати препарат Форсаж, КС?

Найбільший фунгіцидний ефект препарату забезпечується у разі застосування його на ранніх стадіях розвитку хвороб.

За яких умов обробку препаратом повторюють?

Повторні обробки заздалегідь планують за умов високого рівня ураженості рослин хворобами та сприятливих для їх розвитку гідротермічних умов.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +30°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		
	Погодні умови в період застосування		
	Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с		

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Способ внесення	Максимальна кратність обробок
Соняшник	Біла та сіра гниль, фомоз, фомопсис, борошниста роса	1,5	Обприскування в період вегетації	2
Яблуня	Парша, борошниста роса	0,4		



Альтернаріоз ріпаку



Церкоспороз буряка



Борошниста роса жита



Септоріоз листя та колосу пшениці

Standard
Стандартна серія**Юнкер[®], ЗП**

ФУНГІЦІД СИСТЕМНОЇ ТА КОНТАКТНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ, ТОМАТІВ ТА ВИНОГРАДНИКІВ ВІД ГРИБНИХ ХВОРОБ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок, що змочується

УПАКУВАННЯ: 2,5 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Швидкість проникнення речовини
- Тривалість захисту навіть при вологій погоді
- Широкий діапазон внесення
- Підвищення життєздатності рослин

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Металаксил потрапляє у рослину через листя, стебла і коріння. Має захисні та лікувальні фунгіцидні властивості, що проявляються у пригніченні синтезу рибосомної РНК. Як наслідок - інгібування протеїну в клітинах патогенів грибних організмів. Діюча речовина металаксил попереджає зараження культурних рослин збудниками грибних хвороб фітофторозу та альтернаріозу. Діюча речовина манкоцеб інгібує сульфогідридні групи у амінокислот та ферментів в клітинах грибів, що негативно позначається на метаболізмі ліпідів, процесах дихання і синтезу АТФ. Манкоцеб ефективно пригнічує розвиток фітофторозу, альтернаріозу, макроспоріозу та кладоспоріозу.

ФУНГІЦІД ЮНКЕР, ЗП ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га	Норма витрати робочого розчину, л/га	Способ внесення	Максимальна кратність обробок
Картопля	Альтернаріоз, фітофтороз	2,0-2,5	200-400	Обприскування при загрозі розповсюдження хвороб та прияві їх перших ознак	2 рази за вегетаційний період, через 10-14 днів після першого застосування
Томати відкритого ґрунту	Фітофтороз	2,25	200-400	Обприскування при виявленні перших ознак хвороби	2-3 рази з інтервалом 7-10 днів
Виноградники	Міldью	2,5	500-800		



Альтернаріоз,
або суха плямистість
(зональна плямистість)
томатів



Альтернаріоз
картоплі



Фітофтороз
картоплі



Міldью

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ЮНКЕР, ЗП:**

У чому полягає унікальність фунгіциду Юнкер, ЗП?

Унікальність цього препарату полягає у тому, що він складається з двох діючих речовин: системної (металаксил) і контактної (манкоцеб), які у вдалому поєднанні доповнюють одна одну та збільшують довготривалість захисної та лікувальної дії препарату.

Коли доцільно застосовувати препарат Юнкер, ЗП?

Найбільший фунгіцидний ефект препарату забезпечується у разі застосування його на ранніх стадіях розвитку хвороб.

За яких умов обробку препаратом повторюють?

Враховуючи біологію збудників фітофторозу картоплі та томатів, міldью виноградників, повторні обробки планують заздалегідь, особливо за сприятливих для патогенів гідротермічних умов.

Чи можна застосовувати Юнкер, ЗП одночасно з іншими препаратами?

Препарат може застосовуватись сумісно з фунгіцидами інших хімічних груп. Перед застосуванням бакових сумішей препарат бажано перевірити на сумісність.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІ клас (малотоксичний). Помірно небезпечний для теплокровних, токсичний для риб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

Optimal temperature conditions for application	Preparation of working solution
From +10°C to +25°C	On potatoes and tomatoes: 200-400 l/ha In grapes: 500-800 l/ha
Wind conditions during application period	It is necessary to conduct spraying when wind speed is no more than 3-4 m/s

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, кг/га	Способ обробки	Кількість обробок
Огірки	Несправжня борошниста роса	2,5	Обприскування в період вегетації	3
	Альтернаріоз, переноспороз	2,5		
	Хміль	2,5		
	Переноспороз	2,5		
	Несправжня борошниста роса	2,5		



 Professional
Професійна серія

Аболір[®], РГ

ДЕСИКАНТ СИСТЕМНОЇ ДІЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

гліфосат, у вигляді амонійної солі, 757 г/кг у кислотному еквіваленті, 687 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ:

роздрібні гранули

УПАКУВАННЯ:

10 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Швидке знищенння бур'янів (однорічні – 12 годин, багаторічні – 5 днів)
- Найнижча норма застосування
- Опади не знижують ефективність дії препарату через годину після застосування
- Відмінна розчинність
- Найбільш досконала формула діючої речовини
- Висока ефективність за несприятливих погодних умов

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина – гліфосат є інгібітором ферментативної системи, яка відповідає за синтез ароматичних амінокислот. Гліфосат проникає у рослину через надземну її частину та активно розноситься по всіх органах, у тому числі і у коріння. Бур'яни гинуть за рахунок поліпшеної формулії вже через 8-10 діб. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються через 7 днів, спочатку у вигляді пожовтіння, потім в'янення листя. Препарат є ефективним у широкому діапазоні концентрації природних катіонів кальцію і магнію у воді.

ДЕСИКАНТ АБОЛІР, РГ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати, кг/га	Способ, час обробки, обмеження	Строк обробки до збирання врожаю, діб
Зернові	Підсушування культурних рослин та знищенння бур'янів	1,5	Обприскування посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30%	14
Ріпак			Обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури	



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕСИКАНТУ АБОЛІР, РГ:

Як правильно приготувати робочий розчин десиканту Аболір, РГ?

З необхідної кількості препарату спочатку готують маточний розчин в заповненому на 1/3 баку обприскувача. Через 15 хвилин долити водою до повного об'єму бака.

Як встановити норму витрати препарату?

Норма витрати препарату встановлюється за результатами обстеження на виявлення чисельності, видового складу та встановлення стадії росту і розвитку бур'янів. При проведенні боротьби з однорічними односім'ядольними та двосім'ядольними бур'янами норму витрати встановлюють в залежності від висоти рослин.

З метою знищення багаторічних бур'янів норма витрати встановлюється мінімальною, в період відростання бур'янів, максимальною в більш пізні фази росту і розвитку рослин.

Для боротьби з березкою польовою норму витрати встановлюють максимальну.

Чи залежить ефективність обробки від жорсткості води?

Завдяки досконалій формулі гербіциду Аболір, РГ добре працює навіть у жорсткій воді, та не потребує додавання у бакову суміш спеціальних компонентів для її пом'якшення.

Як впливають на дію гербіциду складні погодні умови?

За дощової погоди опади майже не знижують гербіцидний ефект вже через годину після внесення препарату. Також, як посушлива так і холодна погода істотно не позначаються на його ефективності.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (високотоксичний у воді). Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

6 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		50-300 л/га
	Погодні умови в період застосування		Не проводити внесення при швидкості вітру понад 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норми витрати, кг/га	Способ, час обробки, обмеження	Строк обробки до збирання врожаю, діб
Кукурудза	Підсушування культурних рослин та знищенння бур'янів	1,5	Обприскування посівів за 2-3 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30%	14
Горох			Обприскування посівів при побурінні 70-75% бобів культури	
Соя			Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів	
Соняшник			Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	





Везувій®, РК

**ДЕСИКАНТ КОНТАКТНОЇ ДІЇ. ДЛЯ ДЕСИКАЦІЇ
ГОРОХУ, СОНЯШНИКУ ТА СОЇ. ПОЛЕГШУє
ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ЗА РАХУНОК ПІДСУШУВАННЯ
РОСЛИН ПРИ НЕРІВНОМІРНОМУ ДОЗРІВАННІ**



ДІЮЧА РЕЧОВИНА: дикват дібромід, 150 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ: розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ: 20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока швидкість дії
- Рівномірне дозрівання
- Значне зниження вологості насіння
- Пригнічення хвороб
- Можливість авіаційних внесень
- Покращення якості насіння
- Безпечність застосування на насіннєвих ділянках і культурах харчового призначення за рахунок швидкого розкладання препарату
- Не змивається дощем через 10 хвилин після обробітку

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат потрапляє в рослини через листя, з частковим переміщенням по ксилемі. Діюча речовина дикват дібромід порушує в рослинах процес фотосинтезу. В них утворюються сильні оксиди, які пошкоджують клітинні мембрани та цитоплазму, що призводить до зневоднення клітин та повного висихання рослин. Діє відразу після внесення препарату, візуально ефект десикації видно через 5-7 днів, залежно від температури повітря та фази розвитку культури.

ДЕСИКАНТ ВЕЗУВІЙ, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Способ та час застосування*	Строк очікування (в днях до збирання врожаю)
Соняшник	2,0-3,0	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	6
Горох	2,0-3,0	Обприскування у період пожовтіння нижніх бобів (вологість зерна до 45%)	7
Соя	2,0-3,0	Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього та середнього ярусів	6

* В посівах соняшнику та гороху препарат застосовується методом наземного та авіаційного обприскування, на сої – наземним методом.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ВЕЗУВІЙ, РК:

Коли доцільно починати десикацію препаратом Везувій, РК?

Починати обробку посівів слід при фізіологічній стиглості насіння за вологості 30-50% залежно від культури, десикація в більш ранні строки може привести до зниження врожайності культури. Інтенсивність десикації залежить від норми витрати препарату, оброблюваної культури, густоти стояння, засміченості посівів, погодних умов в момент обробки та після неї.

В якому випадку необхідно застосовувати максимальну норму витрати препарату?

Збільшення норми витрати препарату можна пояснити наявністю великої кількості листя на культурі, підвищеною засміченістю культури бур'янами, підвищеною вологістю, а також у разі необхідності проведення передчасного збору врожаю.

Чи можна використовувати десикант Везувій, РК в суміші з іншими препаратами?

Бакові суміші препарату Везувій, РК з іншими пестицидами не рекомендуються через неспівпадання строків застосування. Для збільшення ефективності обробки, Везувій, РК використовують в бакових сумішах з сечовою або аміачною селітрою.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас небезпечності.

ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

	Оптимальні температурні умови застосування		Приготування робочого розчину
	Від +10°C до +25°C		при наземному застосуванні – 200-400 л/га, при авіаційному – 50 л/га
	Погодні умови в період застосування		Погодні умови в період застосування
	Обробку необхідно проводити ввечері або вдень в хмарні погоді, осілки при сонячних та жарких погодних умовах десикація проходить дуже швидко, але менш ефективно. Вранці обприскування проводити не рекомендується.		Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с, за умові відсутності опадів.



СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Способ та час обробок	Норма витрати препарату, л/га	Строк очікування до збирання врожаю, діб
Люцерна (насіннєві посіви)	При побурінні 85-90% бобів	3,0-4,0	7
Сорго (насіннєві посіви)	У період, воськової стиглості насіння за його вологості 45-50%	4,0	4-6
Морква (насіннєві посіви)	Обприскування у період початку повної стиглості насіння в зонтиках другого порядку за вологості загальної маси насіння не більше 50%	2,0-3,0	5-10
Капуста (насіннєві посіви)	У період початку біологічної стиглості насіння за його вологості не більше 50%	2,0-3,0	10
Хміль	Обприскування бур'янів за висоти культури 4-5 м	1,5-2,0	10
Картопля	За 10 днів до збирання культури, в період закінчення формування бульб	1,5-2,0	10
Зернові (насіннєві посіви)	За 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	1,5-2,0	7
Буряки цукрові, столові, кормові (насіннєві посіви)	У період побуріння 30-40% клубочків	4,0-6,0	8-10
Конюшина червона (насіннєві посіви)	У період побуріння 75-80% голівок	3,0-4,0	5-7
Боби кормові (насіннєві посіви)	У період пожовтіння насіння нижніх бобів, насіннєвий рубчик-чорний	4,0-5,0	8-10
Редька (насіннєві посіви)	У період воськової стиглості насіння	4,0-5,0	10
Турнепс (насіннєві посіви)	У період воськової стиглості насіння, за його вологості 45-50%	3,0-4,0	6-7
Ріпак	При побурінні 70% стручків культури	3,0	7
Рис	У фазі повної стиглості рослин за 5 діб до збирання	2,0	5
Льон	У фазі ранньої жовтої стиглості культури	2,0-3,0	7
Мак	За 10-12 днів до збирання врожаю	2,0-3,0	10-12

Також препарати з аналогічною дією речовиною використовують як гербіцид суцільної дії для досходового захисту цибулі, картоплі, моркви проти однорічних та багаторічних злакових та двосім'ядольних бур'янів.



Вулкан® Плюс, РК

ДЕСИКАНТ СИСТЕМНОЇ ДІЇ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
гліфосат у формі ізопропіламінної солі, 480 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висока швидкість дії
- Зменшена чутливість до рівня жорсткості води
- Низький рівень піноутворення
- Звільнення від багаторічних бур'янів
- Зменшення кількості втрат врожаю від осипання
- Можливість авіаційних внесень

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Діюча речовина гліфосат є інгібітором ферментативної системи, яка відповідає за синтез необхідних для життєдіяльності рослин ароматичних амінокислот. Гліфосат поглинається рослинами надземною частиною та активно розповсюджується по всіх органах, у тому числі і у коріння, при контакті з ґрунтом розкладається на нетоксичні сполуки. Перші ознаки гербіцидного ефекту при десикації з'являються через 3-5 днів, спочатку у вигляді пожовтіння, потім – в'янення листя.

ДЕСИКАНТ ВУЛКАН ПЛЮС, РК ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Спосіб внесення	Призначення	Норми внесення, л/га	Строк очікування до збирання врожаю, діб	Максимальна кратність обробок
			наземним устаткуванням	авіацією (літак АН-2)	
Зернові	Обприскування посівів за два тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	Підсушування культурних рослин та знищення бур'янів	3,0	3,0	1
Горох	Обприскування при побурінні 70-75% бобів культури			-	
Соя	Обприскування у фазу початку побуріння бобів			-	
Ріпак	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури			-	
Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків			-	



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕСИКАНТУ ВУЛКАН ПЛЮС РК:

Чи можна використати десикант Вулкан Плюс, РК в бакових сумішах з іншими препаратами?

Для прискорення підсихання рослин Вулкан Плюс, РК використовують в бакових сумішах з сечовою або аміачною селітрою.

Коли необхідно проводити десикацію культур?

Десикацію зернових культур препаратом доцільно проводити за 14 діб до збирання врожаю (за вологості зерна не більше 30%). Десикацію ріпаку проводять за 14 діб до збирання врожаю або при побурінні 70% стручків у культури, гороху – за 14 діб до збирання врожаю або при побурінні 70-75% бобів культури, сої – за 14 діб до збирання врожаю або у фазу початку побуріння бобів, соняшнику – за 14 діб до збирання врожаю або у фазу початку побуріння кошиків.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

ІІІ клас (малотоксичний). Нетоксичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

Optимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +10°C до +25°C	при наземному застосуванні – 200-400 л/га при авіаційному – 50 л/га
Погодні умови в період застосування	Обприскування необхідно проводити при швидкості вітру не більше, ніж 3-4 м/с

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Способ та час обробок	Норма витрати препарату, л/га	Строк очікування до збирання врожаю, діб	Максимальна кратність обробок
Льон-довгунець	Обприскування посівів у фазі ранньої жовтої стигlosti лону	3,0	14	1



Пшениця до десикації



Пшениця після десикації



Десикація соняшника



 Professional
Професійна серія

Деліт®, РК

ДЕСИКАНТ СИСТЕМНОЇ дії

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

гліфосату калійна сіль, 613 г/л, у кислотному еквіваленті, 500 г/л

ФОРМУЛЯЦІЯ

розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

20 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Висококонцентрована препаративна форма
- Менша норма застосування
- Містить прилипач нового покоління
- М'який ефект десикації
- Краще проникнення в рослину
- Швидша дія за рахунок більш рухомої діючої речовини
- Полегшення та зменшення втрат при збиранні врожая
- Відмінний контроль однорічних та багаторічних бур'янів

МЕХАНІЗМ дії:

Діюча речовина гліфосат є інгібітором ферменту (EPSPS), який відповідає за синтез необхідних для життєдіяльності рослин ароматичних амінокислот. Препарат дифузно проникає через листову поверхню і розподіляється по всій рослині, включаючи кореневища, при контакті з ґрунтом розкладається на нетоксичні сполуки. Перші ознаки гербіцидного ефекту з'являються через 2-3 дні, спочатку у вигляді пожовтіння, потім в'янення листя. Завдяки вмісту у препараті гліфосату в калійній формі стало можливим підвищити концентрацію діючої речовини та знизити норму витрати у порівнянні з традиційними формами гліфосату (наприклад ізопропіламіної).

ГЕРБІЦІД ДЕЛІТ, РК ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ В ЯКОСТІ ДЕСИКАНТУ НА НАСТУПНИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Способ внесення	Норма витрати препарату, л/га	Строк обробки до збирання врожая, діб	Максимальна кратність обробок
Десикація зернових	Обприскування за 2 тижні до збирання за вологості зерна не >30%	1,5-2,0	14	1
Десикація соняшнику	Десикація у фазі початку побуріння кошиків			

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕСИКАНТУ ДЕЛІТ, РК:

Як правильно встановити норму витрати препарату?

Норма витрати залежить від видового складу бур'янів та фази розвитку рослин.

При переважній кількості однорічних бур'янів можна застосовувати мінімальні норми препарату. При сильному забур'яненні посівів багаторічними бур'янами слід використовувати максимальні норми препарату.



Чи можна використати десикант Деліт, РК в бакових сумішах з іншими препаратами?

Для прискорення підсихання рослин Деліт, РК використовують в бакових сумішах з сечовою або аміачною селітрою.

Коли необхідно проводити десикацію культур?

Десикацію зернових культур препаратом доцільно проводити: за 14 діб до збирання врожая; за вологості зерна не більше 30%; зберігіть 20 зерен з центра різних колосків, натисніть нігтем великого пальця на зернину, якщо тиснення залишається на зернині, культура готова до десикації.

Десикацію соняшнику проводять: за 14 діб до збирання врожая або у фазу початку побуріння кошиків (листки розташовані біля кошика сухі); вологість насіння в межах 20-25% (за сухих погодних умов вона може бути нижче 20%). Проводити десикацію соняшнику можна і вищої вологості (25-30%), оскільки врожай насіння від цього не зменшується. **Застереження:** у такому разі підсихання рослин відбувається повільніше і може дещо знижуватись вміст олії.

Десикацію ріпаку – за 14 діб до збирання врожая або при побурінні 70% стручків у культури та при вологості насіння менше 30%.

Десикацію кукурудзи: за 14 діб до збирання врожая; вологість зерна 29-32%; появі так званої «чорної точки» на зерні для гібридів з ФАО вище 250, 2-3 верхніх засохлих листочки для ФАО нижче 250.

Десикацію сої: за 14 діб до збирання врожая; у фазу початку побуріння бобів за вологості насіння 50% і нижче (врожайність і маса 1000 насінин при цьому вже не зменшуються, вміст білка й олії – також без змін).

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас (малотоксичний). Не токсичний для бджіл.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +35°C

Оптимальні температурні умови застосування	Приготування робочого розчину
Від +10°C до +25°C	100-200 л/га
Погодні умови в період застосування	Ефективною умовою застосування препарату Деліт, РК є відсутність опадів протягом 3 годин після внесення. Препарат доцільно вносити у вечірні години або вранці, але до випадання роси.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Способ та час обробок	Норма витрати препарату, л/га	Строк очікування до збирання врожая, діб	Максимальна кратність обробок
Кукурудза	Обприскування посівів при появі так званої «чорної точки» на зерні для гібридів з ФАО вище 250			
Ріпак	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків культури	2,0	14	1
Соя	Обприскування у фазу початку побуріння бобів			



Standard
Стандартна серія

Фостер[®], ТБ

**ФУМІГАНТ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ЗАПАСІВ
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР МЕТОДОМ ФУМІГАЦІЇ (ГАЗАЦІЇ)**

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: фосфід алюмінію, 560 г/кг

ФОРМУЛЯЦІЯ: таблетки

УПАКУВАННЯ: 1 кг металева пляшка

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Ефективний проти амбарних шкідників, кліщів, мишовидних гризунів, шурів
- 100% загибель шкідників запасів
- Швидка проникаюча здатність
- Висока біологічна активність



МЕХАНІЗМ ТА СПЕКТР ДІЇ:

Фостер, ТБ – фумігант з інсектицидною та родентицидною дією. В результаті контакту препарату з атмосферним повітрям відбувається хімічна реакція фосфіду алюмінію з вологою, що міститься у повітрі. Внаслідок цього відбувається розклад препарату з виділенням безбарвного газу фосфіну, вуглекислого газу і аміаку. Газ фосфін викликає параліч нервової системи шкідника, в результаті чого настає порушення процесів метаболізму і блокується надходження кисню до організму. Як результат настає смерть. Швидкість впливу препарату Фостер, ТБ на шкідників залежить від концентрації газу фосфіну в повітрі. Повна загибель шкідників, що живуть відкрито, досягається при забезпеченні показника концентрації фосфіну на час експозиції на рівні 7 г/год/м³, шкідників у прихованій формі зараження зерна та зернопродуктів – 25 г/год/м³.

Препарат широко застосовується на хлібоприймальних підприємствах, у колективних та насінницьких господарствах для обробки складів, млинів, елеваторів, зерна насіннєвого та продовольчого призначення, борошна, крупи, сухих овоців та іншої сільськогосподарської продукції. Використовуються на об'єктах, заражених найбільш небезпечними і стійкими проти пестицидів шкідниками хлібних запасів (комірнimi, рисовими довгоносиками, булавовусим і малим борошняним хрущаками, зерновим шашелем та іншими). За умови виконання герметизації препарат Фостер, ТБ придатний для знезараження складських приміщень будь-якого типу, контейнерів, трюмів суден, елеваторів силосного типу, силососховищ, транспортного рухомого складу (вагони, причепи), зерна насипом та затареного у мішки, зернопродуктів, шроту, круп, овоців та фруктів, тарі і пакувальних матеріалів. Ефективно знищує всі види шкідників запасів незалежно від фази їх розвитку.

ФУМІГАНТ ФОСТЕР, ТБ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ:

Об'єкт, що обробляється	Норма витрати препарату г/м ³ , т	Способ, час обробки, обмеження
Зерно хлібних злаків, незавантажені складські приміщення	6-9 (2-3 таблетки)	Допуск людей та завантаження складських приміщень – після повного провітрювання (7 діб) та вмісту фосфороводню не більше ГДК у повітрі робочої зони. Реалізація зерна – через 20 діб після фумігації за наявності залишків фосфороводню не вище МДР

Норми витрати препарату залежать від умов зберігання продуктів.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ФОСТЕР, ТБ:

У чому полягає технологія застосування препарату Фостер, ТБ?

У зерно, що зберігається насипом, таблетки вводять за допомогою спеціальних зондів. При обробці затарених матеріалів таблетки препарату розміщують на підставках. Невеликі партії зерна та зернопродуктів (до 200 т, висота бурта до 2,5 м) обробляють під плівкою, яку розміщують на каркасі так, щоб забезпечити між зерном та плівкою вільний простір до 50 см. Під час проведення фумігації препарат розміщують на підлозі, поверхні зерна, проміж мішків з насінням, продукцією з урахуванням загальної витрати, обчисленої на весь обсяг приміщення, незавантаженого чи із зерном, іншою продукцією.

Впродовж якого часу спостерігається дія препарату Фостер, ТБ?

Препарат Фостер, ТБ починає працювати через 30-60 хвилин після контакту з атмосферним повітрям. Інтенсивність виділення газу фосфін залежить від вологості та температури повітря. При вологості повітря 60% та температурі 20°C вже через 24 години виділяється 50% газу. Максимальна концентрація фосфіну на об'єкті досягається через 60-72 години. Тривалість фумігації складає від 4 до 10 діб.

Чи можна використовувати препарат Фостер, ТБ в суміші з іншими препаратами та які основні вимоги безпечного його застосування?

Фостер, ТБ не застосовується в суміші з іншими препаратами. Категорично забороняється застосування препарату Фостер, ТБ відразу після проведення обробок приміщень іншими препаратами із використанням великої кількості води. При контакті з водою препарат може викликати самозаймання.

Через який час після фумігації можна проводити завантаження складських приміщень?

Допуск людей та завантаження складських приміщень дозволяється після повного провітрювання протягом 5 діб. Реалізація продукту дозволяється через 20 діб після фумігації за наявності фосфіну не вище МДР.

Класифікація ВООЗ, токсичність:

(I клас) токсичний.

Гарантійний термін зберігання:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

Оптимальні температурні умови застосування	Застереження
 Повна загибель комплексу шкідників запасів залежить від температури оточуючого середовища: +26...+27°C – через 3 доби +22...+24°C – через 4 доби +16...+18°C – через 5 діб +12...+14°C – через 7 діб +5...+8°C – через 11 діб	 Препарат Фостер, ТБ вогне- та вибухонебезпечний, особливо при kontaktі з водою

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Препаратори з аналогічною дією речовиною використовують для обробки цукру, чаю, тютюну, сухофруктів та горіхоплідних затарених у мішки, коробки, бочки, складські контейнери.



Складські приміщення



Гризуни



Шкідники



ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА РЕЧОВИНА

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

етоксилат ізодецилового спирту, 90%

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розвинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Забезпечує суцільне покриття оброблюваних рослин
- Підсилює дію гербіцидів
- Сприяє проникненню робочого розчину через кутикулу

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Завдяки своїм властивостям ПАР Флокс, РК утворює однорідну плівку на поверхні рослин, що зменшує поверхневий натяг гербіциду. За рахунок цього діюча речовина гербіцидів краще поглинається рослиною, тим самим прискорюючи швидкість дії і ефективність гербіциду.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ:

ПАР Флокс, РК застосовується спільно з препаратами, діючі речовини яких відносяться до хімічної групи сульфонілсечовини:

- Гурон, ВГ
- Канцлер, ВГ
- Меркурій, ВГ
- Футурин, ВГ

НОРМИ ВИТРАТИ:

ПАР Флокс, РК застосовується в концентрації – 0,1-0,2% (100 мл/100 л води) при нормі виливу робочої рідини від 200 до 300 літрів на гектар. Рівень концентрації ПАР Флокс, РК залежить від препарату. Завжди уважно читайте тарну етикетку перед застосуванням.

При обробках з меншим об'ємом слід використовувати 200 мл ПАР Флокс, РК на гектар.

В посушливих та жарких умовах для захисту посівів кукурудзи від злакових видів бур'янів рекомендуються збільшити норму ПАР Флокс, РК до 0,15-0,2% та збільшити норму виливу робочого розчину.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПАР ФЛОКС, РК:



Приготування робочого розчину:

Ефективність гербіцидної обробки залежить від якісного внесення препарату. Тому слід ретельно дотримуватися правил регулювання обладнання для внесення препарату, приготування робочого розчину та організації проведення робіт по застосуванню пестицидів.

Перед внесенням необхідно ретельно перевірити справність систем обприскувача, провести ретельне промивання баку, магістральних трубопроводів та наконечників для розбризкування робочої суміші. Перед роботою відрегулювати обприскувач на заданий режим роботи.

Бак на 1/3 заповнюють водою і при працюючій мішалці додають пестициди. Потім мішалку зупиняють і додають ПАР Флокс, РК, після чого доливають в бак води до необхідного об'єму і знову включають мішалку.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний). Безпечний для теплокровних, нетоксичний для риб.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

3 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +1°C до +40°C



Флокс® Експерт, РК

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СІЛІКОНОВИЙ АГЕНТ, ОРГАНО-СІЛІКОНОВА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА РЕЧОВИНА, ЩО ПІДВИЩУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ ГЕРБІЦІДІВ, ФУНГІЦІДІВ ТА ІНСЕКТИЦІДІВ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

поліефір трисилоксан

ФОРМУЛЯЦІЯ:

розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:

5 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Значно покращує змочування поверхні рослин робочим розчином
- Завдяки інноваційній формулі дозволяє знижувати норму витрати препарату
- Забезпечує високу і стабільну ефективність засобів захисту рослин і добрив завдяки значному збільшенню площі покриття
- Підвищує системність препаратів та стійкість до змивання опадами
- Забезпечує надійне змочування навіть сильно опушених об'єктів

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Завдяки своїм властивостям Флокс Експерт, РК утворює однорідну плівку на поверхні рослин, що зменшує поверхневий натяг робочого розчину. За рахунок цього, робочий розчин краще поглинається рослиною, тим самим прискорюючи швидкість дії та поліпшуючи ефективність обробки рослин.

З ЯКИМИ ПРЕПАРАТАМИ СЛІД ЗАСТОСОВУВАТИ ФЛОКС ЕКСПЕРТ, РК?

Рекомендовано застосовувати з наступними препаратами:

- | | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| • Аболір, ВГ | • Легіон, ВГ | • Арбалет, КС |
| • Вулкан Плюс, РК | • Меркурій, ВГ | • Корнет, КС |
| • Гурон, ВГ | • Футурин, ВГ | • Ретардин, ВГ |
| • Дікам Плюс, РК | • Альтекс, КЕ | • Форсаж, КС |
| • Ефес, РК | • Дестрой, КС | • Юнкер, ЗП |
| • Канцлер, ВГ | • Ріфос, КЕ | • Везувій, РК |
| • мікродобривами | | |
| • регуляторами росту | | |

Зверніть увагу, що при використанні бакових сумішей, які мають у своїй основі силікон, щоб уникнути забивання форсунок, робочий розчин необхідно внести в найкоротші терміни і промити систему.



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Коли слід використовувати Флокс Експерт, РК?

Флокс Експерт, РК слід додавати в бакову суміш в наступних випадках:

- До гербіцидів – за наявності бур'янів в умовах посухи та наявності бур'янів з потужним восковим нальотом (лобода біла, гірчак рожевий, амброзія полинолиста, та ін.)
- Для захисту від хвороб, шкідників та підживлення сільськогосподарських культур, листя яких має восковий наліт (ріпак, буряки, горох, цибуля, часник)
- В разі застосування мінімальних норм використання засобів захисту рослин

Флокс Експерт, РК може використовуватися в якості інгредієнта в рецептuraх, за умови, що всі інгредієнти сумісні. Сілікона повierzchnievo-активна речовина стабільна в водних розчинах при pH = 6,5-7,5, але швидко розкладається в більш кислотних та лужних.

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Група препаратів	Витрата (мл/100л робочого розчину)
Регулятори росту	25-50*
Гербіциди	25-150*
Інсектициди	25-100*
Фунгіциди	15-50*
Добрива	15-100*

* – максимальні норми слід застосовувати за наступних обставин: обробка рослин з потужним восковим нальотом, складні погодні умови (жарка, посушлива погода).



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Флокс Експерт, РК безпечний для оброблюваних рослин.

Однак, при застосуванні препарату в бакових сумішах можливий прояв фіtotоксичності, щоб запобігти цьому, перед внесенням на великих площах рекомендується обробити невелику ділянку даною комбінацією.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

III клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +2°C до +35°C



Чи варто використовувати ПАР (повierzchnievo-активні речовини)?


Professional
Професійна серія

Флокс® Профі, РК

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СИЛІКОНОВИЙ
АГЕНТ, ОРГАНО-СИЛІКОНОВА ПОВЕРХНЕВО-
АКТИВНА РЕЧОВИНА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕСТИЦІДІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ
ГРУНТОВИХ ГЕРБІЦІДІВ ТА ПРЕПАРАТІВ НА
ОЛІЙНІЙ ОСНОВІ

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
поліефір полісилоксан

ФОРМУЛЯЦІЯ:
розчинний концентрат

УПАКУВАННЯ:
1 л пластикова пляшка

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Найширший спектр застосування серед ПАР, в тому числі з грунтовими гербіцидами та препаратами на олійній основі
- Зменшує норму витрати препарату до 20%, а також обсяг витрати робочої рідини на 20 - 50%
- На відміну від інших ПАР забезпечує не лише покриття, а й швидке проникнення препаратів в рослини
- Підвищує стійкість до змивання препарату опадами, запобігає розкладанню ультрафioletовими променями
- Ефективний в широкому діапазоні pH (від 6 до 8)
- Не піниться при приготуванні робочого розчину

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Флокс Профі, РК значно сильніше знижує поверхневий натяг водних сільськогосподарських сумішей, ніж це досягається при використанні звичайних поверхнево-активних речовин. При таких низьких концентраціях, як 0,01 відсотка, він знижує поверхневий натяг нижче 23 дин/см, що забезпечує дуже швидке змочування і розтікання по важко змочуваним поверхням, таким як листя з восковим нальотом.

На додаток до швидкого змочування і поширення, Флокс Профі, РК також значно збільшує поглинання хімічних речовин в рослинних тканинах. Додавання силіконової поверхнево-активної речовини в суміш для гербіцидів може значно підвищити їх ефективність, особливо в боротьбі з широколистими бур'янами за допомогою водорозчинних гербіцидів. Швидке поглинання запобігає змиванню.

Зверніть увагу, що при використанні бакових сумішей, які мають у своїй основі силікон, щоб уникнути забивання форсунок, робочий розчин необхідно внести в найкоротші терміни і промити систему.



З ЯКИМИ ПРЕПАРАТАМИ СЛІД ЗАСТОСОВУВАТИ ФЛОКС ПРОФІ, РК?

Флокс Профі, РК застосовується з наступними препаратами:

- Деліт, РК
- Екстрем, КЕ
- Корвет, КС
- Нікоміл, МС
- Пропозит, КЕ
- Рейтар, КС
- Сулам, СЕ
- Ретардин EW, EB
- мікродобривами
- регуляторами росту
- та іншими препаратами з лінійки компанії

Флокс Профі, РК може використовуватися в якості інгредієнта в рецептюрах, за умови, що всі інгредієнти сумісні. Силіконова поверхнево-активна речовина стабільна в водних розчинах при pH = 6,0-8,0, але швидко розкладається в більш кислотних та лужних.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Коли слід використовувати Флокс Профі, РК?

Флокс Профі, РК слід додавати в бакову суміш в наступних випадках:

- До гербіцидів за наявності умов посухи та наявності бур'янів з потужним восковим нальотом (лобода біла, гірчак рожевий, амброзія полінолиста, та ін.). Для підвищення ефективності грунтових гербіцидів та гербіцидів з ґрунтовою дією
- Для захисту від хвороб, шкідників та підживлення сільськогосподарських культур, листя яких має восковий нальот (ріпак, буряки, горох, цибуля, часник)
- В разі застосування мінімальних норм використання засобів захисту рослин.

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Група препаратів	Витрата (мл/100л робочого розчину)
Регулятори росту	30-50*
Гербіциди страхові	30-150*
Гербіциди ґрунтові	150-200*
Фунгіциди	30-100*
Добрива	20-100*

* – максимальні норми слід застосовувати за наступних обставин: обробка рослин з потужним восковим нальотом, складні погодні умови (жарка, посушлива погода).



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Флокс Профі, РК безпечний для оброблюваних рослин.

Однак, при застосуванні препарату в бакових сумішах можливий прояв фіtotоксичності, щоб запобігти цьому, перед внесенням на великих площах рекомендується обробити невелику ділянку даною комбінацією.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

IV клас небезпечності.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки від дати виготовлення при дотриманні умов зберігання.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +2°C до +35°C



ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ОРГАНО-СІЛІКОНОВИЙ ПІНОГАСНИК

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:
полідиметилсилоксан 40%

ФОРМУЛЯЦІЯ:
масляна емульсія

УПАКУВАННЯ:
1 л пластикова пляшка

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- попереджає утворення піни
- зменшує витрати часу на приготування робочого розчину
- не змінює структуру робочого розчину
- покращує ефективність застосування пестицидів
- забезпечує швидкий результат

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Принципом дії ЛЕНС® є утворення непроникної плівки, яка підвішує поверхневий натяг води та запобігає утворенню пухирців газу (піни). Як результат, утворення піни стає неможливим, тобто у воді препарат заміщує молекули поверхнево-активної речовини, які знаходяться у верхньому шарі. В результаті цього монолітова плівка поверхнево-активної речовини утворює пори (руйнується). За рахунок цього підвищується корисна емність обладнання та зменшуються витрати часу на приготування робочого розчину, процес стає максимально економним та продуктивним.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ:

ЛЕНС® – ад’юvant для приготування бакових сумішей, який сумісний з усіма засобами захисту рослин. Препарат можна застосовувати з усіма формулляціями пестицидів і зокрема з КС, ЕВ, МЕ і МС. Але в будь-якому випадку слід перевірити на сумісність. Найбільш ефективний у роботі з пестицидами на основі водних розчинів (РК), що схильні до надмірного піноутворення.

Зверніть увагу, що при використанні бакових сумішей, які мають у своїй основі силікон, щоб уникнути забивання форсунок, робочий розчин необхідно внести в найкоротші терміни і промити систему.



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Приготування робочого розчину:

Перед використанням емність з препаратом слід ретельно струсити. Частково наповніть бак обприскувача водою на 1/3-1/2 від об’єму. Увімкніть мішалку обприскувача і продовжуйте перемішування протягом приготування робочого розчину та обприскування. Додайте ЛЕНС® у рекомендованих нормах. Далі заповніть на 2/3 бак, додайте інші компоненти в послідовності: водорозчинні порошки (ВП), водорозчинні гранули (РГ), концентрат сусpenзії (КС), концентрат, що емульгується (КЕ), емульсія, масло (олія) у воді (ЕВ) або суспо-емульсії (СЕ), розчинні концентрат (РК). Долійте бак обприскувача до повного. Після внесення препарату необхідно провести ретельне промивання баку, магістральних трубопроводів та наконечників чистою водою.

УВАГА! Не залишайте бакову суміш з силіконовим піногасником у оприскувачі без постійного переміщування більше ніж на добу, бо це може привести до забивання форсунок і поломки робочих частин обприскувача.

Коли піна в робочому розчині вже утворилася, що робити?

Необхідно розвести ЛЕНС® у воді (10 частин води + 1 частина препарату). Даний розчин розповсюджувати на піну до досягнення необхідного ефекту.

УВАГА!
ЛЕНС® повинен завжди додаватися в воду, а не навпаки.

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ:

5–10 мл на 100 л робочого розчину.

* – норми застосування можуть варіювати відповідно до розміру баку, типу перемішування, характеристики інгредієнтів та води. Для сумішей, які утворюють важкоконтрольовану піну може знадобитися максимальна норма.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВООЗ, ТОКСИЧНІСТЬ:

IV клас небезпечності (малотоксичний).

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

2 роки при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

Від +5°C до +40°C. Забороняється зберігання у пошкодженій тарі.



Чи варто використовувати органо-сіліконовий піногасник?



Бор Маджестик[®], Рід

МІКРОДОБРИВО РЕКОМЕНДОВАНЕ ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ, ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР (СОНЯШНИКУ) І РОСЛИН З СИМПТОМАМИ ДЕФІЦИТУ БОРУ (ЗЕРНОВІ)

СКЛАД: бор (B) – 11%, азот (N) – 4,8%, фосфор (P_2O_5) – 2%, калій (K_2O) – 4% та мікроелементи: Cu (EDTA) – 0,05%, Fe (EDTA) – 0,075%, MgO – 0,5%, Mn (EDTA) – 0,031%, Mo (молібдат) – 0,001%, Zn (EDTA) – 0,05%

ФОРМУЛЯЦІЯ: рідина

УПАКУВАННЯ: 10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ МІКРОДОБРИВА:

- Високоефективний і простий у використанні
- Підвищена засвоюваність бору, завдяки наявності азоту й фосфору
- Підвищує жаро-, посухо-, морозостійкість рослин
- Підвищує стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань
- Зміцнюваність з майже всіма засобами захисту рослин та карbamідом
- Оптимальна концентрація мікроелементів для виведення рослин зі стресового стану
- Підвищує врожайність культур
- Регулює запилення та запліднення, знижує abortivність у сої

ОПИС ПРОДУКТУ:

Бор Маджестик, Рід – це концентроване мікродобриво з високим вмістом бору, азоту та мікроелементів для коригування та усунення дефіциту бору у сої, цукрових буряків і кукурудзи, а також інших культур. Наявність додаткових поживних речовин підсилює дію бору й запобігає можливому дисбалансу елементів живлення. Катіони мікроелементів Cu, Fe, Mn та Zn повністю хелатовані EDTA.

ВЛАСТИВОСТІ:

Функції бору пов'язані з процесами метаболізму углеводів і перенесення цукрів через мембрани, синтезу нуклеїнових кислот (ДНК і РНК) і фітогормонів, формування стінок клітин, регуляції росту, дихання. Симптоми дефіциту бору починають проявлятися у злаків при вмісті цього елемента 5-10 мг/кг, у більшості дводольних – при зменшенні його концентрації до 20-70 мг/кг сухої маси. Типовою ознакою нестачі бору є пригнічення точок росту у рослин, головним чином, у дводольних при нестачі бору порушується формування генеративних органів рослин, пригнічується ріст бруньок і молодого листя. При гострому дефіциті бруньки відмирають. Міжзвузля стають укороченими, рослини набувають ознак кущуватості. У листя з'являється межжилковий хлороз.

Найбільш чутливі до дефіциту бору буряк, льон, цвітна капуста, бруква, турнепс, яблуня, груша. Підживлення препаратом Бор Маджестик, Рід сприяє кращому запиленню й зав'язуванню плодів, зменшує abortivність, регулює водний баланс клітин рослини, впливає на ріст і розвиток меристем, сприяє кращому поділу клітин. Він збільшує швидкість перенесення цукрів від зрілих листків до активно зростаючих частин рослини.

Препарат стійкий до змиття та випаровування, рівномірно проникає у рослину та має ефект реактивації (навіть після висихання відносна вологість атмосфери забезпечує реактивацію в'язкого осаду, запобігає утворенню нерозчинних сольових сполук). Для досягнення необхідного ефекту можна проводити декілька позакореневих обробок препаратом за сезон.



ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:

Обприскування вегетуючих рослин в бакові суміші з добревими і засобами захисту рослин після проби на сумісність. Можливе застосування Бор Маджестик, Рід як на листових підживленнях рослин, так в системі крапельного поливу. Використовується як самостійно (в критичні фази розвитку борофільних культур), так і в бакових сумішах з макродобревами і мікродобревами для забезпечення повноцінного живлення рослин. Використовують будь-яке стандартне обладнання. Робочий розчин готують перед вживанням, розбавляючи 1:100 - 1:200 до концентрації 0,5-1%. Оптимальна температура робочого розчину +15-20°C, при температурі повітря +10-25°C і середньодобовій температурі не нижче +5°C. Підживлення проводять рано вранці або ввечері, уникуючи яскравого сонця, дощу і сильного віtru.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від +1°C до +35°C

БОР МАДЖЕСТИК, РІД ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Способ, час обробки
Озима пшениця, кукурудза, соняшник, томати	1,0-3,0	Позакореневе живлення

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Фази внесення	Норма витрати, л/га
Ріпак	Осінь: формування розеток; весна: подовження квітконіжки; бутонізація, до початку цвітіння	1,0-2,0
Буряки цукрові та столові	2 обробки: 4-6 справжніх листків – до змикання міжрядь	2,0-3,0
Соя	4-6 трійчастих листків, бутонізація	1,0-3,0
Картопля	Бутонізація, утворення столонів	1,0-2,0
Виноград	2 обробки: початок повного цвітіння – кінець цвітіння	2,0-3,0



Кукурудза



Соняшник



Томати



Буряк



Картопля



Соя



Виноград



Ріпак





ЦИНК Маджестик[®], Рід

МІКРОДОБРИВО РЕКОМЕНДОВАНЕ ДЛЯ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ КУКУРУДЗИ, ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР (СОНЯШНИКУ) І РОСЛИН З СИМПТОМАМИ ДЕФІЦИТУ ЦИНКУ (ЗЕРНОВІ)

СКЛАД: цинк (Zn) (EDTA) – 13%, солі гумінових кислот – 10 г/л, азот (N) – 5%, фосфор (P₂O₅) – 2%, калій (K₂O) – 4% та мікроелементи:
бор (B) – 0,15%, Cu (EDTA) – 0,05%, Fe (EDTA) – 0,075%, Mn (EDTA) – 0,031%, Mo (молібдат) – 0,001%, MgO – 0,05%

ФОРМУЛЯЦІЯ: рідина

УПАКУВАННЯ: 10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ МІКРОДОБРИВА:

- Швидке проникнення через листок і висока безпечність для культури
- Наявність спеціальних добавок забезпечує оптимальне поглинання поживних речовин незалежно від погодних умов
- Сумісний з більшістю пестицидів
- Підвищує водоутримуючу здатність рослин, їх жаро-, посухо-, морозо- і солестійкість
- Підвищує стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань (фітофтора картоплі та ін.)
- Прискорює рухливість пилку в насіннєвих трубках, підвищує запилення рослин
- Підвищує засвоєння рослинами азоту (N) з ґрунту і добрев
- Підвищує врожайність культур

ОПИС ПРОДУКТУ:

Цинк Маджестик, Рід – це концентроване хелатне мікродобриво у вигляді рідини, яке рекомендується для профілактики й усунення дефіциту у широкого спектра культур. Відрізняється високим вмістом цинку в комплексі з іншими мікроелементами.

Цинк Маджестик, Рід активізує біохімічні процеси в тканинах і клітинах рослин, підвищуючи стійкість культур до різних захворювань. Сприяє побудові 24 цинкозалежних ензимів, дихальних ферментів цитохромів A і B, цитохромоксидаз, алкогольдегідраз і гліцілгліциндептідаз, утилізатора вуглекислого газу – карбоангідраз. Підживлення препаратом Цинк Маджестик, Рід впливають на кількість і якість врожаю багатьох культур. Кукурудза – істотно підвищується врожайність.

Жито, овес, яра пшениця – збільшується врожайність, підвищується продуктивність колоса. При цьому соломина коротша, а маса зерен збільшується. Вміст в зерні фосфору підвищується, а калію знижується. Цукровий буряк (коренеплоди) – збільшується врожайність і вміст цукру.

Вишня, слива, персик – при обприскуванні в період цвітіння і повторно через 14 днів, не тільки значно збільшується врожайність, але й на 7-10 днів прискорюється дозрівання, збільшується розмір плодів, підвищується цукристість, кислотність зменшується.

Яблуна – при внесенні цинкових мікродобрив у ґрунт збільшується приріст пагонів, поліпшується хімічний склад і лежкість яблук.

Суниця, виноград – внесення цинкових добрив призводить до збільшення врожайності, підвищенню цукристості ягід.

Позитивно впливає цинк на врожайність цілого ряду овочевих культур: томатів, огірків, капусти та інших. Однак, треба зазначити, що важливим чинником, що визначає ефективність застосування добрива, є ступінь забезпеченості рослин іншими елементами живлення.

ВЛАСТИВОСТІ:

Цинк в рослинах бере безпосередню участь у синтезі ауксинів, ДНК, рибосом та метаболізмі



вуглеводів, фосфатів і протеїнів. Крім того, цинк впливає на проникність мембрани, що підвищує стійкість рослин до сухого і жаркого клімату, грибкових і бактеріальних захворювань. Підвищений рівень азоту і фосфору у ґрунті призводить до дефіциту цинку. Дефіцит цинку пригнічує поділ клітин в два-три рази. У всіх рослин дефіцит цього елемента призводить до затримки росту. Характерні зовнішні ознаки нестачі цинку – загальномований процес зростання, короткі міжвузля, маленька площа поверхні листової пластинки. Ці симптоми можуть поєднуватися з хлорозом. З часом на листках з'являються жовті цятки або плями сіро-бурого і бронзового кольору. Тканина цих ділянок відмирає. У плодових дерев на кінцях гілок утворюються укорочені пагони з дрібним листям у вигляді розетки («розетність»), а при сильному дефіциті з'являється «суховершинність» і «карликівість». У кукурудзи – «побління» або хлороз верхніх листків, а нове листя блідо-жовтого кольору. У томатів – «дрібнолистість» скручування листових пластинок і черешків. Крім того, при дефіциті цинку, зростання пагонів пригнічується більше, ніж ріст коренів, а урожай насіння знижується сильніше, ніж зменшується маса вегетативних органів. Підвищена чутливість до нестачі цинку у хмелю, гречки, картоплі, буряків, конюшини лучної. Найбільш чутливі до нестачі цинку плодові культури.

Добриво з високим вмістом цинку підвищує життєздатність рослини, сприяє кращому заплідненню, та збільшенню врожайності. Покращує якість врожаю, вміст цукрів.

Для досягнення необхідного ефекту можна проводити декілька позакореневих обробок препаратом за сезон.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:

Обприскування вегетуючих рослин в баковій суміші з азотно-калійними добривами і засобами захисту рослин після проби на сумісність. Використовують будь-яке стандартне обладнання. Робочий розчин готують перед вживанням, розбавляючи 1:100-1:200 до концентрації 0,5-1%. Оптимальна температура робочого розчину +15-20°C, при температурі повітря +10-25°C і середньодобовій температурі не нижче +5°C. Підживлення проводять 2 рази з інтервалом 3-4 тижні рано вранці або ввечері, уникнути яскравого сонця, дощу і сильного вітру.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

4 роки при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ТЕМПЕРАТУРА ЗБЕРІГАННЯ:

від +1°C до +35°C

ЦИНК МАДЖЕСТИК, РІД ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Способ, час обробки
Озима пшениця, кукурудза, соняшник, томати	1,0-3,0	Позакореневе живлення

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Фази внесення	Норма витрати, л/га
Ріпак	Осінь: формування розетки; весна: 5-7 листків; фаза зеленого бутону	1,0-2,0
Буряки цукрові та столові	6-8 справжніх листків – до змінання міжрядь	1,0-2,0
Соя	4-6 трійчастих листка, бутонізація	1,0-2,0
Картопля	Бутонізація, утворення столонів	1,0
Виноград	Перед початком цвітіння; перед початком досягнання ягід	1,0-2,0
Кісточкові	Через 2-3 тижні після цвітіння	1,0
Зерняткові	У фазу рожевого бутону	1,0
Суниця	На початку вегетації перед цвітінням	1,0

УВАГА! З розчинними солями фосфорної кислоти і лужними продуктами утворює осад! Високоефективний препарат, передозування неприпустиме!





Калій Фреш®, П

ПРЕПАРАТ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ КАЛІЮ
ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ
ПРОДУКЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РОСЛИН
ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ У РОЗВИНУТИХ
РОСЛИН

СКЛАД: гіберелін – 10 г/к, азот (N) – 5%, фосфор (P_2O_5) – 15%,
калій (K_2O) – 38%
та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%,
Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%,
Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 9,5 кг, 10 кг поліпропіленовий пакет

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Містить легкозасвоювані рослинами форми макроелементів та хелатовані мікроелементи
- До складу препарату входять азот в амонійній формі, фосфор у легкорозчинній формі дигідрофосфату
- Активізує процеси фотосинтезу та обміну речовин у листі рослин
- Покращує якісні показники продукції
- Поповнє дефіцит калію при його тимчасовій недоступності або нестачі в ґрунті
- Сприяє кращому засвоєнню поживних речовин через листя та з ґрунту
- Підвищує стійкість рослин до несприятливих погодних умов (заморозки, спека, посуха, надмірні опади)
- Підвищує стійкість рослин до грибних хвороб
- Присутність у складі речовин, які володіють поверхневою активністю, для покращення поглинання елементів живлення у листя рослин
- Фітотоксичність відсутня навіть при використанні у великій кількості
- Відсутність катіонів Na^+ та аніонів Cl^-
- Відмінна розчинність у воді
- Низький рівень електропровідності
- Забезпечується додаткове підвищення урожаю сільськогосподарських культур та особливо поліпшується його якість

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Це композиція водорозчинних та легко засвоюваних форм макроелементів живлення та мікроелементів у формі хелатів металів для коригування метаболічних процесів у клітинах та оптимізації трофічних зв'язків між органами у рослин. Результатом застосування препаратору є покращення якісних показників продукції та підвищення стійкості рослин до несприятливих умов у розвинутих рослин.

Ефективність застосування препаратору проявляється в покращенні якісних показників продукції і рекомендуються до застосування після цвітіння рослин.

Калій Фреш, П доцільно також вносити до цвітіння в разі нестачі калію у ґрунті для подолання наслідків стресових умов. Рішення щодо застосування препаратору з підвищеним рівнем калію приймається на підставі результатів рослинної діагностики та при прояві перших ознак дефіциту калію в рослинах. Для підсилення ефекту листового підживлення в кінці вегетації рослин можливо застосовувати в сумішах з препаратором Універсал Фреш, П. Калій Фреш, П може застосовуватися для підживлення всіх культур.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

КАЛІЙ ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препаратору, кг/га	Способ, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,5-1,0	Позакореневе живлення

Калій Фреш, П також використовують для підживлення газонів, хвойних та листяних дерев в осінній період в нормі 10-20 г на 10 л води з розрахунком 10 л розчину на сотку, або 3-5 л на одне дерево



Універсал Фреш®, П

ПРЕПАРАТ З РЕТЕЛЬНО ПІДІБРАНОЮ
КОМПОЗИЦІЄЮ ЛЕГКО ЗАСВОЮВАНИХ
ФОРМ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ НРК
ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ФОРМІ ХЕЛАТІВ МЕТАЛІВ
ДЛЯ КОРИГУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНИХ
ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ОРГАНАМИ У РОСЛИН

СКЛАД: бурштинова кислота – 40 г/кг, азот (N) – 20%,
фосфор (P_2O_5) – 20%, калій (K_2O) – 20%
та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%,
Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%,
Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 9,5 кг, 10 кг поліпропіленовий пакет

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Містить легкозасвоювані для листя рослин форми макроелементів та хелатовані мікроелементи
- У складі препаратору переважають амідні та амонійні форми азота, фосфор - у легкорозчинній формі дигідрофосфату
- Активізує процеси фотосинтезу та обміну речовин у листі рослин
- Сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту
- Підвищує стійкість рослин до несприятливих погодних умов (заморозки, спека, посуха, надмірні опади)
- Підвищує стійкість рослин до грибних хвороб
- Присутність у складі речовин, які володіють поверхневою активністю, для покращення поглинання елементів живлення листям рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні у великій кількості
- Відсутність катіонів Na^+ та аніонів Cl^-
- Відмінна розчинність у воді
- Низький рівень електропровідності
- Забезпечується додаткове підвищення урожаю сільськогосподарських культур та покращується його якість

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Це ретельно підібрана композиція водорозчинних та легко засвоюваних форм макроелементів живлення та мікроелементів у формі хелатів металів для коригування метаболічних процесів у клітинах та оптимізації трофічних зв'язків між органами рослин. Результатом застосування препаратору є активізація ростових процесів кореневої та вегетативної систем рослин. Універсал Фреш, П застосовується при нестачі чи тимчасовій недоступності поживних речовин в ґрунті, для покриття дефіциту елементів живлення для рослин в стресових умовах (погодні умови, хімічні обробки).

Для досягнення максимального ефекту від листового підживлення доцільно вносити неодноразово.

Кількість обробок може сягати трьох.

Універсал Фреш, П застосовується для підживлення всіх культур протягом вегетації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

УНІВЕРСАЛ ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препаратору, кг/га	Способ, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,5-1,0	Позакореневе живлення

Універсал Фреш, П також використовують для підживлення газонів, хвойних та листяних дерев протягом вегетаційного періоду в нормі 10-20 г на 10 л води з розрахунком 10 л розчину на сотку, або 3-5 л на одне дерево





Фосфор Фреш®, П

ПРЕПАРАТ З РЕТЕЛЬНО ПІДБРАНОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ ЛЕГКО ЗАСВОЮВАНИХ ФОРМ МАКРОЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ НРК ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ФОРМІ ХЕЛАТИВ МЕТАЛІВ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ФОСФОРУ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ АКТИВІЗАЦІЇ РОСТОВИХ ПРОЦЕСІВ У КОРЕНЕВІЙ СИСТЕМІ В ПЕРІОД ІІ УТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

СКЛАД: індолілмасляна кислота – 10 г/кг, азот (N) – 10%, фосфор (P_2O_5) – 40%, калій (K_2O) – 11% та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%, Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%, Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 9,5 кг, 10 кг поліпропіленовий пакет

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Містить легкозасвоювані листям рослин форми макроелементів та хелатовані мікроелементи
- У складі препарату міститься фосфор у легкорозчинній формі дигідрофосфату
- Прискорює процеси утворення і розвитку кореневої системи на початку вегетації
- Покращає споживання фосфору за його тимчасової недоступності або нестачі в ґрунті
- Сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту
- Підвищує стійкість рослин до несприятливих погодних умов (заморозки, спека, посуха, надмірні опади)
- Підвищує стійкість рослин до грибних хвороб
- Присутність у складі речовин, які володіють поверхневою активністю, для покращення поглинання елементів живлення у листя рослин
- Фітотоксичність відсутня навіть при використанні у великий кількості
- Відсутність катіонів Na^+ та аніонів Cl^-
- Відмінна розчинність у воді
- Низький рівень електропровідності
- Забезпечується додаткове підвищення урожаю сільськогосподарських культур та покращується його якість

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Це водорозчинна композиція з легко засвоюваних форм макроелементів живлення та мікроелементів у формі хелатів металів з підвищеним вмістом фосфору для коригування метаболічних процесів у клітинах та оптимізації трофічних зв'язків у тканинах коренів рослин. Результатом застосування препаратору є максимальна активізація ростових процесів у кореневій системі в періоди утворення та розвитку. Особливо актуальним є застосування під час активного формування кореневої системи в період від сходів до цвітіння рослин. Фосфор Фреш, П також застосовується при нестачі чи тимчасової недоступності фосфору для рослин. Як правило, це проявляється в особливо стресових умовах (погодні умови, хімічні обробки). Рішення щодо застосування препаратору з підвищеним рівнем фосфору приймається на підставі результатів рослинної діагностики та перших симптомів дефіциту фосфору в рослинах. Для підсилення ефективності листового підживлення можливе поєднання застосування в сумішах з препаратом Універсал Фреш, П. Фосфор Фреш, П може застосовуватися для підживлення всіх культур.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИГОТУВАННЯ МАТОЧНОГО РОЗЧИНУ:

Увага! За ідеальних умов (вода низької мінералізації, з температурою +20°C та pH близько 7) розчинність препаратору Фреш Фосфор становить 250 г/л. За інших умов (холодна, високо-мінералізована, лужна вода), готовувати маточний розчин слід у більш низьких концентраціях. Якщо pH води більше 7,2, перед приготуванням розчину, воду слід підкислити.

ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ФОСФОР ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Способ, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,5-1,0	Позакореневе живлення

Фосфор Фреш, П також використовують для підживлення газонів, хвойних та листяних дерев навесні на початку вегетації в нормі 10-20 г на 10 л води з розрахунком 10 л розчину на сотку, або 3-5 л на одне дерево



Аміно Фреш®, Рід

РЕГУЛЯТОР РОСТУ НА ОСНОВІ АМІНОКИСЛОТ ІЗ ВИСOKIM VMІSTOM AZOTU DЛЯ ПІДВIЩЕННЯ MЕМБРАННОЇ, MЕТАBOLIЧНОЇ I ГЕНЕTICHOЇ AKTIVNOSTI СИСTEM U KЛITINAH TА OPTIMIЗACIЇ TROFIChNOЇ I ELEKTOFIZIOLOGICHNOЇ СИСTEM REGULYACIЇ ORGANIV ROSLIN

СКЛАД: амінокислоти – 150 г/л, бурштинова кислота – 0,5 г/л, екстракт морських водоростей – 0,5 г/л, солі гумінових або фульгілових кислот – 0,5 г/л, гіберерін – 0,05 г/л, індолілмасляна кислота – 0,05 г/л, азот (N) – 11%, фосфор (P_2O_5) – 2%, калій (K_2O) – 4% та мікроелементи: бор (B) – 0,15%, Cu (EDTA) – 0,5%, Fe (EDTA) – 0,7%, Mg – 0,05%, Mn (EDTA) – 0,7%, Mo (молібдат) – 0,01%, Zn (EDTA) – 0,5%

ФОРМУЛЯЦІЯ: рідина

УПАКУВАННЯ: 10 л пластикові каністра

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ:

- Високий вміст амінокислот, проамінокислот та білкових речовин
- Превалювання у препараторі фізіологічно важливих амінокислот, серед яких особливо цінними є триптофан, аргінін, аспарагін та інші
- До складу регулятора росту входить азот в амідній та амонійній формі, тому препаратор є одночасно добривом з властивостями коригувати та регулювати азотний обмін у рослин
- Застосуванням препаратору досягається швидкий ефект у коригуванні обмінних процесів, явним проявом дії стимулатора є підвищення вмісту хлорофілу у клітинах та збільшенню фотосинтетичної активності
- Покращуються фізіологічні процеси пов'язані з функціонуванням покривних тканин листя і водно-повітряного поживного обміну та обміну поживних речовин між рослинами та зовнішнім середовищем
- Цей регулятор росту є композицією фізіологічно активних речовин, з властивостями нівелювання негативних наслідків дії високих температур на фоні дефіциту вологи в ґрунті та пестицидів після обробки рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні регулятора росту у великий кількості

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Аміно Фреш, Рід – це композиція фізіологічно важливих амінокислот з високим вмістом азоту для коригування мембрanoї, метаболічної і генетичної активності систем у клітинах та оптимізації трофічної і електрофізіологічної систем регуляції між органами у рослин.

При застосуванні регулятора росту досягається швидкий ефект у підвищенні вмісту хлорофілу у клітинах та збільшенню фотосинтетичної активності, оптимізується азотний обмін.

Аміно Фреш, Рід доцільно вносити для подолання негативних наслідків дії високих температур на фоні дефіциту вологи в ґрунті та нівелювання токсичної дії пестицидів при застосуванні в несприятливих погодних умовах для росту і розвитку рослин. Для досягнення максимального ефекту від листового підживлення доцільно проводити декілька внесень. Кількість обробок може сягати трьох. Регулятор росту застосовується на всіх культурах протягом вегетації.

НОРМИ ВНЕСЕННЯ РЕГУЛЯТОРУ РОСТУ АМІНО ФРЕШ, РІД ПРИ ЛИСТОВОМУ ПІДЖИВЛЕННІ

Норма внесення регулятора росту становить від 0,5 до 1,0 л на гектар. Кратність застосування 3 рази. Інтервал між обробками може становити 7-10 дб.

ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 4 роки при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

АМІНО ФРЕШ, РІД ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Способ, час обробки
Озима пшениця, кукурудза, ячмінь ярий, соняшник	0,5-1,0	Позакореневе живлення

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Необхідність застосування	Норма витрати, л/га
Для підсилення гербіцидного ефекту; для підкислення робочого розчину	0,2
Для зняття гербіцидного стресу	0,5-1,0





Гуміленд Фреш®, Рід

РЕГУЛЯТОР РОСТУ ДЛЯ РОСЛИН НА ОСНОВІ ГУМІНОВОЇ ТА ФУЛЬВОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАНОЇ І МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН

СКЛАД: солі гумінових кислот – 120 г/л, солі фульвокислот – 60 г/л, аміонокислоти – 0,5 г/л, бурштинова кислота – 0,5 г/л, екстракт морських водоростей – 0,5 г/л, гіберелін – 0,05 г/л, індолімасляна кислота – 0,05 г/л, азот (N) – 2,5%, фосфор (P_2O_5) – 2%, калій (K_2O) – 4% та мікроелементи: бор (B) – 0,15%, Cu (EDTA) – 0,05%, Fe (EDTA) – 0,075%, Mg – 0,05%, Mn (EDTA) – 0,031%, Mo (молібдат) – 0,008%, Zn (EDTA) – 0,076%

ФОРМУЛЯЦІЯ: рідина

УПАКУВАННЯ: 10 л пластикова каністра

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ:

- Високий вміст фізіологічно активних речовин - фульвокислот, які відповнюють функції мембрани і стінок клітин та є будівельним матеріалом для синтезу продуктів вторинного обміну з антістресовими властивостями
- Фульвокислоти належать до комплексонат утворюючих речовин з неорганічними та органічними сполуками. Тому, підвищуючи застосування мікродобриз, інсектицидів та фунгіцидів при листовій обробці
- До складу ріст регулятора входить калій – важливий елемент для коригування та регулювання процесів живлення, функціонування мембрани у клітин та отримання якісної продукції рослинництва
- Препарат відрізняється особливою ефективністю для оптимізації поживного режиму в рослинах при холодній та вологій погоді, перевозложені та недостатньої аеразії ґрунту
- Застосуванням препаратору прискорюються ростові процеси, активізується розвиток рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні ріст регулятора у великій кількості

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат створений на основі калійних солей фульвокислот, які належать до легкорозчинної фракції гумінових речовин. Представляють собою високомолекулярні сполуки. Завдяки біохімічній близькості до мембрани та стінок клітин фульвокислоти легко проникають у рослини. Фульвокислоти є чудовим будівельним матеріалом для клітинних мембран та стінок, продуктів вторинного обміну відповідальних до підвищення стійкості рослин до дії стресових факторів.

Фульвові кислоти здатні до активного утворення комплексних сполук з елементами живлення такими як азот, фосфор, калій та мікроелементами, а також з багатьма органічними сполуками. Комплекс на основі фульвокислот також легко проникає в клітини рослин. Тому, при застосуванні фульвокислот разом з мікродобризами, інсектицидами або фунгіцидами ефективність дії значно підвищується.

Калій, який входить до складу препарату, не тільки покращує фізико- і біохімічні властивості фульвокислот, також відіграє важливу роль у коригуванні метаболічних процесів у клітинах та оптимізації трофічних зв'язків між органами у рослин.

При застосуванні стимулатора росту досягається покращення якісних показників продукції та підвищується стійкість рослин до несприятливих умов у рослин.

Препарат дозіально вноситься для оптимізації поживного режиму в рослинах при холодній та вологій погоді, перевозложені та недостатньої аеразії ґрунту.

НОРМА ВНЕСЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ГУМІЛЕНД ФРЕШ, РІД ПРИ ЛИСТОВОМУ ПІДЖИВЛЕННІ. СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:
Норма внесення регулятора при листових підживленнях від 0,2 до 0,4 літрів на гектар під час вегетації при сумісному використанні засобів захисту рослин: – для покращення дії пестицидів, – для стимулювання ростових процесів, – для посилення опору рослині стресам різної природи. Кратність застосування 3-4 рази за сезон. Інтервал між обробками повинен становити 7-10 діб.

ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ: 4 роки при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ГУМІЛЕНД ФРЕШ, РІД ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Способ, час обробки
Озима пшениця, кукурудза, ячмінь ярий, соя, соняшник	1,0-3,0	Позакореневе живлення

СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ:

Культура	Норма витрати препарату, л/га	Способ, час обробки
Буряки цукрові, ріпак озимий, соя, горох, картопля, овочі	1,0-3,0	Позакореневе живлення

Гуміленд Фреш, Рід, також використовують як стимулатор росту газонів, хвойних та листяних дерев навесні на початку вегетації в нормі 10-30 мл на 10 л води з розрахунком 10 л розчину на сотку, або 3-5 л на одне дерево



Енергія Фреш®, П

РЕГУЛЯТОР РОСТУ ДЛЯ РОСЛИН НА ОСНОВІ ІНДОЛІМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ З МАКРОЕЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕТАБОЛІЧНОЇ І ГЕНЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ГОРМОНАЛЬНОЇ І ТРОФІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН

СКЛАД: індолімасляна кислота – 40 г/кг, азот (N) – 5,4%, фосфор (P_2O_5) – 5%, калій (K_2O) – 8% та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%, Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%, Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 5 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРУ РОСТУ:

- Препарат на основі синтетичного ауксину – індолімасляної кислоти, гормону стимулюючого коренеутворення у рослин
- Надзвичайно ефективний агрозахід – листкове підживлення цим препаратом на початку вегетації для росту і розвитку кореневої системи у молодих рослин
- До складу регулятора росту входить азот, фосфор і калій – важливі елементи для коригування та регулювання процесів живлення
- Активізує процеси фотосинтезу та обміну речовин у листі рослин
- Сприяє крашому засвоєнню поживних речовин з ґрунту
- В результаті застосування препаратору прискорюються ростові процеси, активізується розвиток рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні ріст регулятора у великій кількості

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

До складу препаратора входить синтетичний ауксин відповідальний за ріст і розвиток кореневої системи – індолімасляна кислота. Обробка цим препаратом особливо актуальнана на початку росту і розвитку рослин для стимулювання коренеутворення.

Регулятор росту може також застосовуватися при нестачі чи тимчасовій недоступності поживних речовин в ґрунті, для покриття дефіциту елементів живлення для рослин в стресових умовах (погодні умови, хімічні обробки).

ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ЕНЕРГІЯ ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Способ, час обробки
Ярий ячмінь, пшениця, кукурудза, соняшник	0,5-1,0	Позакореневе живлення



Соняшник



Кукурудза



Ярий ячмінь, пшениця





Ленд Фреш®, П

РЕГУЛЯТОР РОСТУ ДЛЯ РОСЛИН НА ОСНОВІ КАЛІЕВОЇ СОЛІ ФУЛЬВОВОЇ КИСЛОТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАННОЇ І МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН

СКЛАД: солі фульвокислот – 500 г/кг, азот (N) – 3%, фосфор (P_2O_5) – 5%, калій (K_2O) – 10% та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%, Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%, Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 5 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ:

- Високий вміст фізіологічно активних речовин – фульвокислот, що відновлюють функції мембрани і стінок клітин та є будівельним матеріалом для синтезу продуктів вторинного обміну з антистресовими властивостями
- Фульвокислоти належать до комплексонат утворюючих речовин з неорганічними та органічними сполуками. Тому, підвищують ефективність застосування мікродобрив, інсектицидів та фунгіцидів при листовій обробці
- До складу ріст регулятора входить калій – важливий елемент для коригування та регулювання процесів живлення, функціонування мембрани у клітині та отримання якісної продукції рослинництва
- Препарат відзначається особливою ефективністю для оптимізації поживного режиму в рослинах за холодної та вологій погоди, перезволоженні та недостатньою аерацією ґрунту
- Під дією препарату прискорюються ростові процеси, активізується розвиток рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні ріст регулятора у великих кількості

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат створений на основі калійних солей фульвокислот, які належать до легкорозчинної фракції гумінових речовин. Представляють собою високомолекулярні сполуки. Завдяки біохімічній близькості до мембрани та стінок клітин фульвокислоти легко проникають у рослини, фульвокислоти є чудовим будівельним матеріалом для клітинних мембрани та стінок, продуктів вторинного обміну відповідальних за підвищення стійкості рослин до дії стресових факторів.

Фульзові кислоти здатні до активного утворення комплексних сполук з елементами живлення такими як азот, фосфор, калій та мікроелементами, а також з багатою органічними сполуками. Комплексонати на основі фульвокислот також легко проникають у клітини рослин. Тому, при застосуванні фульвокислот разом з мікродобривами, інсектицидами або фунгіцидами ефективність їх дії значно підвищується. Калій, який входить до складу препарату, не тільки покращує фізико – і біохімічні властивості фульвокислот, також відіграє важливу роль у коригуванні метаболічних процесів у клітинах та оптимізації трофічних зв'язків між органами у рослин.

При застосуванні стимулятора росту досягається покращення якісних показників продукції та підвищується стійкість рослин до несприятливих умов вегетації.

Препарат доцільно вносити для оптимізації поживного режиму в рослинах при холодній та вологій погоді, перезволоженні та недостатньою аерацією ґрунту.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ЛЕНД ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Способ, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь ярий	0,3-1,0	Позакореневе живлення



Мікс Фреш®, П

РЕГУЛЯТОР РОСТУ НА ОСНОВІ АМІНОКИСЛОТ ІЗ ВИСОКИМ ВМІСТОМ АЗОТУ ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАННОЇ, МЕТАБОЛІЧНОЇ І ГЕНЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СИСТЕМ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН

СКЛАД: амінокислоти – 150 г/кг, екстракт морських водоростей – 350 г/кг, азот (N) – 10%, фосфор (P_2O_5) – 5%, калій (K_2O) – 8% та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%, Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%, Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 5 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ:

- Високий вміст амінокислот та білкових речовин
- Превалювання у препараті фізіологічно важливих незамінів : амінокислот, серед яких особливо цінними є триптофан, аргінін, аспарагін, та інші
- До складу регулятора росту входить азот в амідній та амонійній формі, тому препарат є одночасно добривом, що коригує та регулює азотний обмін рослин
- В складі препарату присутні мікроелементи (мідь, залізо, марганець і цинк), які необхідні для синтезу життєво необхідних ферментів
- Всі мікроелементи знаходяться у вигляді комплексонатів з амінокислотами, які легко і швидко проникають у клітини. При цьому, мікроелементи швидко включаються в обмінні процеси
- Застосовуючи препарат можна повністю забезпечити рослини необхідними мікроелементами
- При використанні регулятора росту підвищується вміст хлорофілу у клітинах та зростає фотосинтетична активність, активізуються фізіологічні процеси пов'язані з функціонуванням покривних тканин листя, водно-повітряний та обмін поживних речовин всередині рослини та між рослинами та зовнішнім середовищем
- Мікс Фреш, П є композицією фізіологічно активних речовин та мікроелементів, що нівелюють негативні наслідки дії високих температур на фоні дефіциту вологи у ґрунті та пестицидів після обробки рослин
- Фіtotоксичність відсутня навіть при перевищенні рекомендованих норм

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Мікс Фреш, П – це композиція фізіологічно важливих амінокислот з високим вмістом азоту та мікроелементів для коригування мембральної, метаболічної і генетичної активності систем у клітинах та оптимізації трофічної і електрофізіологічної систем регуляції між органами у рослин. Результатом застосування регулятора росту є швидке підвищення вмісту хлорофілу у клітинах та збільшення фотосинтетичної активності, оптимізація азотного обміну, ліквідація дефіциту важливих для життєдіяльності мікроелементів (мідь, залізо, марганець та цинк). Регулятор росту доцільно вносити для подолання дефіциту мікроелементів у рослинах та негативних наслідків дії високих температур на фоні дефіциту вологи в ґрунті. Препарат застосовується за перших ознак дефіциту мікроелементів. Для досягнення максимального ефекту доцільно проводити декілька внесень. Регулятор росту застосовується на всіх культурах протягом вегетації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

МІКС ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Способ, час обробки
Ячмінь ярий, кукурудза, соняшник	0,5-1,0	Позакореневе живлення





Флорід Фреш®, П

РЕГУЛЯТОР РОСТУ РОСЛИН НА ОСНОВІ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН З МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МЕМБРАННОЇ, МЕТАБОЛІЧНОЇ І ГЕНЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СИСТЕМ У КЛІТИНАХ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТРОФІЧНОЇ, ГОРМОНАЛЬНОЇ І ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМ РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ РОСЛИН

СКЛАД: екстракт морських водоростей – 500 г/кг, амінокислоти – 15 г/кг, азот (N) – 3%, фосфор (P_2O_5) – 5%, калій (K_2O) – 16%
та мікроелементи: бор (B) – 0,025%, Cu (EDTA) – 0,01%, Fe (EDTA) – 0,07%, Mg – 3%, Mn (EDTA) – 0,04%, Mo (молібдат) – 0,04%, Zn (EDTA) – 0,025%

ФОРМУЛЯЦІЯ: порошок

УПАКУВАННЯ: 5 кг фольгований пакет

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРА РОСТУ:

- Високий вміст фітогормонів – до 0,06%, переважно цитокінінів (зеатін, ізопентенилайденін та інші)
- Присутні необхідні для рослин амінокислоти, полі- і олігосахариди та вітаміни
- До складу ріст регулятора входить азот, фосфор, калій та мікроелементи важливі для коригування та регулювання процесів живлення у рослин
- Під дією препарату прискорюються ростові процеси, активізується розвиток рослин
- Всі речовини, які входять до складу регулятора росту, відіграють також позитивну роль в оптимізації процесів обміну речовин після дії стресових умов та підвищення імунітету до інфекційних хвороб
- Регулятор росту є композицією фізіологічно активних речовин надзвичайно ефективних для стимулювання росту надземних органів рослин в період активного росту рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні ріст регулятора у великий кількості

В бакову суміш з препаратом рекомендується додавати піногасник Ленс®

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Препарат містить екстракти трьох видів морських водоростей багатих на рослинні гормональні речовини, оліго- та полісахариди, амінокислоти, водоростеву кислоту та органічні речовини з високим вмістом азоту, фосфору, калію та мікроелементів.

Серед фітогормонів у препараті переважають цитокініни (зеатін, ізопентенилайденін та інші), які відповідають за регуляцію фізіологічних процесів в надzemній частині рослин. Під впливом цитокінінів оптимізуються та запускаються процеси росту і розвитку надzemної частини рослин з послідувальною активізацією життєдіяльності кореневої системи. Амінокислоти, полісахариди, олігосахариди та вітаміни, які також присутні у препараті відповідальні компоненти при синтезі білокових речовин та продуктів вторинного обміну. Роль вторинних продуктів обміну проявляється у підвищенні стійкості до несприятливих умов вегетації та збудників хвороб.

Присутні у ріст регуляторі азот, калій та мікроелементи сприяють покращенню метаболічних процесів у клітинах та оптимізації трофічних зв'язків між органами у рослин.

При цьому, мікроелементи у формі комплексних сполук з органічними речовинами – амінокислотами надзвичайно легко засвоюються рослинами.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ:

5 років при дотриманні умов зберігання від дати виготовлення.

ФЛОРИД ФРЕШ, П ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Норма витрати препарату, кг/га	Способ, час обробки
Кукурудза, соняшник, ячмінь	0,2-0,4	Позакореневе живлення



ПОРЯДОК ПРИГОТУВАННЯ БАКОВИХ СУМІШЕЙ

При приготуванні бакових сумішей ЗЗР рекомендується наступна послідовність:

1. Частково наповніть бак обприскувача водою згідно з рекомендаціями на етикетці, на 1/3, або 1/2, або 3/4 від об'єму. Увімкніть мішалку обприскувача і продовжуйте перемішування протягом приготування робочого розчину та обприскування.
2. Додайте карbamід та (або) комплексні водорозчинні мікродобрива у вигляді кристалічних порошків.
3. Додайте препарати у вигляді водорозчинних порошків (ВП).
4. Додайте препарати у вигляді водорозчинних гранул (РГ), у вигляді гранул, що диспергуються у воді (ВГ).
5. Додайте препарати у вигляді концентратів суспензії (КС).
6. Додайте препарати у вигляді концентратів, що емульгуються (КЕ).
7. Додайте препарати у вигляді масляних дисперсій (МД).
8. Додайте препарати у вигляді емульсії, масла (олії) у воді (ЕВ) або суспо-емульсії (СЕ).
9. Додайте препарати у вигляді розчинних концентратів (РК).
10. Додайте прилипачі, ад'юванти.
11. Додайте рідкі мікродобрива та стимулятори росту, або їх маточні розчини.
12. Долийте бак обприскувача до повного.



**УВАГА!
НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ
В БАКОВИХ СУМІШАХ НАСТУПНІ ПРЕПАРАТИ:**

1. Фосфорогранічні інсектициди (**Ріфос**), гербіциди, що містять похідні сульфонілсечовин (**Гурон, Еліот, Канцлер, Нікоміл, Меркурій**) та імідазоліонів (**Молтено, Хантер, Юпітер**). А також використовувати (**Ріфос**) до 14 днів після внесення даних препаратів. Не змішувати з пестицидами, які мають лужну реакцію (сірчане вапно, мідь тощо).
2. Гербіциди **Ефес** та **Стилет**.
3. Гербіцид **Канцлер** – при використанні у посівах льону не використовувати з грамініцидами та ПАР **Флокс**.
4. При наявності у баковій суміші карbamіду, обробки повинні проводитись у вечірні та нічні години через можливість опіків.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ РІВЕНЬ pH РОБОЧОГО РОЗЧИНУ ДЛЯ ДЕЯКИХ ГРУП ПЕСТИЦІДІВ:

pH 3,5	Добре працюють гліфосати, не підходить для більшості пестицидів
pH 3,5-6,0	Підходить для негайного застосування та недовгого зберігання (1-2 години) більшості пестицидів, не підходить для препаратів групи сульфонілсечовин
pH 6,0-7,0	Нормально працюють більшість пестицидів
pH 7,0-7,5	Добре працюють сульфонілсечовини, зменшується ефективність інших пестицидів
pH ≥7,5	Значно знижується ефективність всіх пестицидів



БАКОВІ СУМІШІ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРУ ДІЇ ТА ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБОК

Культура	Група препаратів	Фаза розвитку	Мета обробки	Бакова суміш, норми внесення
Поля призначенні під посів	Гербіцид	Обприскування вегетуючих бур'янів	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни в умовах недостатнього зволоження	Вулкан Плюс (3-4 л) + Футурин (150 г) + Флокс Експерт (0,05-0,1 л)
			Для підсилення дії на проблемні злакові бур'яни (чечет, гумай та ін.)	Вулкан Плюс (3-4 л) + Сулам (0,4 л) + Флокс Профі (0,05-0,1 л) Деліт (2-3 л) + Футурин (150 г) + Флокс Профі (0,05-0,1 л) Деліт (2-3 л) + Сулам (0,4 л) + Флокс Профі (0,05-0,1 л)
Зернові колосові	Протруйник	Обробка насіння перед сівбою	Для підсилення дії на кореневі гнілі та збудника сінгової плисняні	Кольчуга Плюс (0,2 л) + Форсаж (0,5 л)
			Для підсилення дії на збудників сажкових хвороб	Корвет (50-70 г) + Сулам (0,1-0,2 л)
Гербіцид	До появи пропорцевого листка	Для підсилення дії на лободу білу	Меркурій (15 г) + Канцлер (10 г) + Флокс Експерт (0,05-0,1 л)	
			Для підсилення дії на багаторічні та перерослі двосім'ядольні бур'яни	Меркурій (20 г) + Сулам (0,2-0,25 л)
		До кінця кущення	Меркурій (20 г) + Легіон (80 г) + Флокс Експерт (0,05-0,1 л)	
	Фунгіцид	Профілактично, або за перших ознак захворювання	Для уникнення резистентності та розширення спектру контролюваних грибних хвороб в посівах пшениці, та ріпаку	Ретардин (0,5 л) + Корнет (0,4-0,5 л)
Соя	Гербіцид	До сходів бур'янів та культури	Для підсилення дії на бур'яни та подовження захисного періоду	Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,2 л) + Флокс Профі (0,15-0,2 л) Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,2 л) + Флокс Профі (0,15-0,2 л)
			за умов значного піноутворення в баку оприскувача	Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,2 л) + Ленс (5-10 мл/100 л води) Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,2 л) + Ленс (5-10 мл/100 л води)
	1-3 трійчастих листки	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни в умовах недостатнього зволоження	Eфес (1,5) + Канцлер (5-8 г) + Флокс (0,2 л)	
	2-3 трійчастих листки	Для крашого контролю стійких та перерослих бур'янів	Ефес (2,0 л) + Юпітер (0,5 л)	
Горох	Гербіцид	1-3 трійчастих листки	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни в умовах недостатнього зволоження	Молтено (0,75 л) + Ефес (2,0 л)
		3-5 справжніх листків	Для крашого контролю стійких та перерослих бур'янів	Ефес (2,5 л) + Юпітер (0,5 л)
Кукурудза	Гербіцид	До сходів бур'янів та культури	Для підсилення дії на бур'яни та подовження захисного періоду	Молтено (0,75 л) + Ефес (2,0 л)
				Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) + Флокс Профі (0,15-0,2 л) Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) + Флокс Профі (0,15-0,2 л)
	3-7 листків у культурі	Для контролю як злакових, так і двосім'ядольних бур'янів	за умов недостатнього зволоження	Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) + Ленс (5-10 мл/100 л води)
				Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) + Ленс (5-10 мл/100 л води)
	3-5 листків у культурі	Канцлер (10 г) + Нікоміл (0,7-1,0 л)	за умов значного піноутворення в баку оприскувача	Канцлер (10 г) + Нікоміл (0,7-1,0 л)
				Сулам (0,3-0,4 л) + Нікоміл (0,7-1,0 л)
	3-7 листків у культурі	Футурин (150 г) + Нікоміл (0,7-1,0 л)	за умов недостатнього зволоження	Футурин (150 г) + Нікоміл (0,7-1,0 л)
				Дікам Плюс (0,7 л) + Нікоміл (0,7-1,0 л)
	3-5 листків у культурі	Канцлер (10 г) + Сулам (0,4 л) + ПАР Флокс (0,2 л)	за умов значного піноутворення	Канцлер (10 г) + Сулам (0,4 л) + ПАР Флокс (0,2 л)
				Канцлер (10 г) + Легіон (60-120 г) + ПАР Флокс (0,2 л)
	3-5 листків у культурі	Канцлер (10 г) + Дікам Плюс (0,7 л) + ПАР Флокс (0,2 л)	Для підсилення дії на перерослі та стійкі двосім'ядольні бур'яни	Канцлер (10 г) + Дікам Плюс (0,7 л) + ПАР Флокс (0,2 л)
				Канцлер (10 г) + Легіон (120 г) + ПАР Флокс (0,2 л)
Соняшник	Гербіцид	До сходів бур'янів та культури	Для підсилення дії на бур'яни та подовження захисного періоду	Нікоміл (0,7-1,0 л) + Легіон (120 г)
				Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) + Флокс Профі (0,15-0,2 л) Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) + Флокс Профі (0,15-0,2 л)
	Бур'як	1-3 пари справжніх листків	Для контролю як злакових, так і двосім'ядольних бур'янів	Екстрем (1,5-2,2 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) + Ленс (5-10 мл/100 л води)
				Пропозит (2,0-2,5 л) + Рейтар (1,8-2,5 л) + Ленс (5-10 мл/100 л води)
Ріпак	Гербіцид	6-8 листків однорічних бур'янів, розетка-початок стебування у багаторічних	Для контролю як злакових, так і двосім'ядольних бур'янів	Легіон (120 г) + Шквал (0,6-1,2 л)
				Легіон (120 г) + Шквал (0,6-1,2 л)

ВАРИАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ З ПРИВ'ЯЗКОЮ ДО ФАЗ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ЇХ СУМІШІ З ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Культура	Фаза розвитку	Мета обробки	Мікродобрила та стимулятори росту – бакова суміш, норми внесення	* Засоби захисту рослин (за умов спільног внесення)
Озимі пшениця та ячмінь	До посіву (обробка насіння)	Закладання та розвиток потужної кореневої системи та забезпечення необхідними елементами живлення на початку росту рослини	Енергія Фреш (0,5-1 кг/т) + (або) Фосфор Фреш (1-2 кг/т)	Фунгіцидний протруйник – Колчуга Плюс, або Томагавк, або Граніт, або Галеон + інсектицидний протруйник – Ін Сет, або універсальний комбінований протруйник Пентафорс 322 FS
		Підвищення енергії проростання трамвованого насіння; захист проростків від післядії гербіцидів, внесених під попередник; високий вміст цинку, міді, запіза та марганцю сприя гармонійному розвитку та зимостійкості рослин	Мікс Фреш (0,5-1 кг/т)	
	Кущення (осінь)	Прискорення появі сходів за холодної погоди і (або) пізніх посівів; покращення засвоєння елементів живлення з ґрунту; зимо- та холодаостійкість	Ленд Фреш (0,3-1 кг/т), або Гуміленд Фреш (1-3 л/т)	
		Синтез цукрів, підвищення зими- та холодаостійкості	Капіт Фреш (1-2 кг/т)	Фунгіцид – Форсаж, або Ретардин EW
	Кущення (весна)	Стимуляція кущення (для посівів, що перевизували в фазі сходи - початок кущення)	Флорід Фреш (0,2-0,4 кг/т) + Фосфор Фреш (1-2 кг/т) + Ленс (5-10 мл/100 л води)	Обробка до застосування засобів захисту рослин
		Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 кг/т) + (або) Фосфор Фреш (1-2 кг/т)	1. Гербіцид – Сулам, або Дікам Плюс, або Корнет + функгіцид – Арабалет, або Корнет, або Ретардин EW, або Форсаж + інсектицид – Ріфос, або Альтекс. 2. Гербіцид – Сулам, або Меркурій, або Гурон, або Корвет + функгіцид – Арабалет, або Корнет, або Ретардин EW, або Форсаж + інсектицид – Альтекс
	Вихід в трубку	Покращення засвоєння елементів живлення з ґрунту; холодаостійкість (в умовах затяжної холодної весни)	Ленд Фреш (0,3-1 кг/т), або Гуміленд Фреш (1-3 л/т) + (або) Капіт Фреш (1-2 кг/т)	
		Забезпечення макро- та мікроелементами в доступній формі в період інтенсивного росту рослин	Універсал Фреш (1-2 кг/т)	Гербіцид – Сулам, або Меркурій, або Гурон, або Корвет + функгіцид – Арабалет, або Корнет, або Ретардин EW, або Форсаж
	Поява пропорцевого листка	Продовження фотосинтезу, підвищення кількісних та якісних показників врожаю	Флорід Фреш (0,2-0,4 кг/т) + Аміно Фреш (0,5-1 кг/т) + Ленс (5-10 мл/100 л води), або Флорід Фреш (0,2-0,3 кг/т) + Цінк Маджестик (0,5-0,75 л/т) + Ленс (5-10 мл/100 л води)	Фунгіцид – Арабалет, або Корнет, або Ретардин EW, або Форсаж
		Посухостійкість, збільшення врожайності	Капіт Фреш (1-2 кг/т)	
Соняшник	Кущення	Вихід колосу	Бор Маджестик (0,5 л/га)	
		Молочна стиглість	Аміно Фреш (0,5-1 л/га)	Інсектицид – Дестрой, або Ріфос
		2-3 пари справжніх листків	Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 кг/т) + Фосфор Фреш (1-2 кг/т)
		3-5 пар справжніх листків	Закладання більшої кількості квіток; усунення дефіциту бору	Бор Маджестик (1-1,5 л/га)
		3-4 пари справжніх листків	Максимальне запилення квіток, виповненість насіння; усунення дефіциту бору	Капіт Фреш (1-2 кг/т)
	Кукурудза	«Зірочка» – початок цвітіння	Посухостійкість, збільшення врожайності; усунення дефіциту бору	Ленд Фреш (0,3-1 кг/т), або Гуміленд Фреш (1-3 л/т), або Аміно Фреш (0,5-1 л/т)
		3-5 листків	Усунення фіtotоксичності після застосування гербіцидів	Бор Маджестик (1-1,5 л/га)
		6-9 листків	Закладання більшої кількості квіток; усунення дефіциту бору	Бор Маджестик (1-1,5 л/га)
		10 листків – викидання волоті	Максимальне запилення квіток, виповненість насіння; усунення дефіциту бору	Бор Маджестик (1-1,5 л/га)
		«Зірочка» – початок цвітіння	Посухостійкість, збільшення врожайності, усунення дефіциту бору	Капіт Фреш (1-2 кг/т)
Ріпак	Кукурудза	3-5 листків	Розвиток потужної кореневої системи	Енергія Фреш (0,5-1 кг/т) + Фосфор Фреш (1-2 кг/т)
		6-9 листків	Стимулювання росту; усунення дефіциту цинку, міді, запіза та марганцю	Гербіцид – Пропозит, або Шквал, або Легіон
	Ріпак	Відновлення розеток, початок росту стебла	Бор Маджестик (1-1,5 л/т) + Капіт Фреш (1-2 кг/т)	Ретардин та функгіцид – Ретардин EW + інсектицид – Ріфос, або Альтекс
		Покращення засвоєння елементів живлення з ґрунту; холодаостійкість (в умовах затяжної холодної весни)	Мікс Фреш (0,5-1 кг/т)	
Соя	Бутонізація	Максимальне запилення квіток, виповненість насіння; усунення дефіциту бору	Ленд Фреш (0,3-1 кг/т), або Гуміленд Фреш (1-3 л/т) + (або) Капіт Фреш (1-2 кг/т)	Інсектицид – Дестрой, або Ріфос
		Закладання більшої кількості квіток; усунення дефіциту бору	Бор Маджестик (1-1,5 л/т)	
	Цвітіння - початок досягнення	Стимулювання гілкування	Флорід Фреш (0,2-0,4 кг/т) + Універсал Фреш (1-2 кг/т) + Ленс (5-10 мл/100 л води), або Аміно Фреш (0,5-1 л/т) + Універсал Фреш (1-2 кг/т)	Фунгіцид – Арабалет, або Корнет + Форсаж + інсектицид (при необхідності) Ін Сет, або Ріфос, або Альтекс
		Посухостійкість, підвищення врожайності	Капіт Фреш (1-2 кг/т)	

* Вибір препаратів та норм використання залежить від виду шкідливого об'єкту, його чисельності, та фази розвитку

Системи захисту

СИСТЕМА ЗАХИСТУ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО

• Пропозит, КЕ (2,0-3,0 л/га)	• Альтекс, КЕ (0,1-0,25 л/га)
• Стимет, КЕ (Однорічні злакові буряки у фазі 2-6 листків — 0,4-0,8 л/га, багаторічні злакові буряки при висоті 10-20 см — 0,8-1,8 л/га)	
• Шквал, КЕ (Однорічні злакові буряки у фазі 2-4 листків — 0,4-0,8 л/га, багаторічні злакові буряки при висоті 10-15 см — 0,8-1,2 л/га)	
• Легіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га)	
• Фреш Енергія (0,3-0,5 кг/га)	• Корнет, КС (0,25 л/га)
• Фреш Гуміленд, Рід. (1,0 ¹ -3,0 ² кг/га)	• Форсаж, КС (0,3-0,4 л/га)
• Фреш Ленд (0,3 ¹ -1,0 ² кг/га)	• Фреш Аміно (0,5 ¹ -1,0 ² кг/га)
• Фреш Фосфор (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)	
• Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га)	• Фреш Калій (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)
Обприскування грунту до/після після виставання, але до появи скочів	• Фреш Універсал (1,0 ¹ -3,0 ² кг/га)
Фаза сім'ядолей	• Маджестик Цінк (1,0 ¹ -3,0 л/га)
Фаза розвинутих сім'ядолей- першої пари листків	Фаза складення «лінійки» кореня
4-5 справоких листків	Фаза складення листків в рядах
ІНСЕКТИЦИДИ	ФУНГИЦИДИ
ГЕРБІЦИДИ	РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ
МІКРОДОБРИВА	ФАЗА СКОДЖЕННЯ ЛИСТКІВ В МІЖРЯДЯХ

1. – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)

2 – при застосуванні самостійно

124

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВИНОГРАДНИКІВ

• Ін Сет, ВГ (0,07 кг/га)	• Ін Сет, ВГ (0,07 кг/га)
• Корнет, КС (0,1 л/га)	• Корнет, КС (0,1 л/га)
• Юнкер, ЗП (2,5 кг/га)	• Юнкер, ЗП (2,5 кг/га)
• Фреш Енергія (0,3-0,5 кг/га)	• Фреш Аміно (0,5 ¹ -1,0 ² л/га)
• Фреш Гуміленд, Рід. (1,0 ¹ -3,0 ² л/га)	
• Фреш Фосфор (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)	
• Фреш Універсал (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)	• Фреш Калій (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)
• Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га)	• Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га)
ІНСЕКТИЦИДИ	ФУНГИЦИДИ
7-9 листків	Початок цвітіння
3-5 листків	Кінець цвітіння
ПОЧАТОК РОСТУ	ФОРМУВАННЯ ЯГДА- ЗАКІНЧЕННЯ РОСТУ ЯГДІ
МІКРОДОБРИВА	ПОЧАТОК РОСТУ

125

1. – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)

2 – при застосуванні самостійно

Системи захисту

Системи захисту

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ГОРОХУ

Обприскування грунту до або після сівби	Сівба	Сходи	3-5 листків	5-6 листків	Бутонізація	Цвітіння	Формування бобів	Побудіння бобів	Достигання
• Юпітер, РК (0,5-0,75 л/га)	• Юпітер, РК (0,5-0,75 л/га)	• Ефес, РК (3,0 л/га)					■ МІКРОДОБРИВА		
• Молотено, РК (0,75-1,0 л/га)								• Вулкан Плюс, РК (3,0 л/га)	
								• Везувій, РК (2,0-3,0 л/га)	
								• Деніт, РК (2,0-2,5 л/га)	
• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/га)	• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/га)	• Альтекс, КЕ (0,15-0,25 л/га)	• Альтекс, КЕ (0,15-0,25 л/га)						
• Фреш Гуміленд, Рід. (1,0-3,0 л/га)	• Фреш Флорід (0,2 кг/га)						■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ		
• Фреш Ленд (0,3 ¹ -1,0 ² кг/га)								• Фреш Аміно (0,5-1,0 л/га)	
• Фреш Фосфор (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)	• Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га)							• Фреш Капій (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)	

■ ГЕРБІЦІДИ

■ ІНСЕКТИЦІДИ

■ ДЕСИКАНТИ

■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

■ МІКРОДОБРИВА

¹ – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)

² – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ

ГЕРБІЦІДИ	ІНСЕКТИЦІДИ	ДЕСИКАНТИ	РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ	МІКРОДОБРИВА
• Рейтар, КС (3,0-4,0 л/га)	• Альтекс, КЕ (0,07-0,1 л/га)	■ Юніверсал (2,5 кг/га, 2 обробки з інтервалом 10-14 днів)	■ Фреш Аміно (0,5 л/га)	
• Фреш Флорід (0,1-0,3 кг/т)	• Юнівер. ЗП (2,5 кг/га, 2 обробки з інтервалом 10-14 днів)	• Фреш Енергія (0,3-0,5 кг/га)	• Фреш Аміно (0,5 л/га)	
		• Маджестик Бор (0,4 кг/га)	• Фреш Флорід (0,4 кг/га)	
• Маджест. Бор (1,0 л/т)	• Фреш Гуміленд, Рід. (1,0 ¹ -3,0 ² л/га)	• Фреш Гуміленд, Рід. (1,0 ¹ -3,0 ² л/га)	■ Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га)	■ Фреш Капій (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)
• Фреш Фосфор (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)	• Фреш Ленд (0,3 ¹ -1,0 ² кг/га)	• Фреш Ленд (0,3 ¹ -1,0 ² кг/га)	• Фреш Універсал (1,0 ¹ -2,0 ² кг/га)	
До висадки	Висаджування	Проростання	Розвиток листків	Бутонізація
				■ Цвітіння
				■ Дозрівання
				■ В'яннення листя

■ ГЕРБІЦІДИ

■ ІНСЕКТИЦІДИ

■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

■ МІКРОДОБРИВА

¹ – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)

² – при застосуванні самостійно

Системи захисту

Системи захисту

СИСТЕМА ЗАХИСТУ КУКУРУДЗІ (Professional)

• Деніт РК (2,0-3,0 л/га)	• Гранівіт, ТН (2,5-3,0 л/л)	• Пропозит, КЕ (0,0-3,0 л/л)
• Азотпр. РГ (1,5 кг/га)	• Ін Сет SC, КС (3,5-6,0 л/л)	• Екстрем, КЕ (1,5-3,0 л/л)
• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/т)	• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/т)	• Фреш Аміно (0,5-1,0 л/т)
• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/т)	• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/т)	• Фреш Універсал (1,0-2,0 кг/т)
		• Фреш Мікс (0,5-1,0 кг/т)



На парах та полях, призначених під посіви ярих зернових	Протруйники	До сівби, під час та після сівби, але до появи сходів
		Від 2 до 10 листків кукурудзи

■ ПРОТРУЙНИКИ

■ МІКРОДОБРИВА

■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

■ ГЕРБІЦИДИ

1 – при застосуванні в сумі з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)

2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ КУКУРУДЗІ (Standard)

• Вулкан Плюс, РК (2,0-6,0 л/га)	• Гранівіт, ТН (2,5-3,0 л/л)	• Екстрем, КЕ (1,5-3,0 л/л)
	• Ін Сет SC, КС (3,0-6,0 л/л)	• Апач ВГ (0,4-0,5 кг/га) 3-5 листків
		• Ультра Плюс, КЕ (0,7-0,8 л/га) 3-5 листків
		• Крейсер, ВГ (40-50 г/га + ГАР Флокс, РК 200 мл/га)
• Фреш Фосфор (1,0 ¹ -2,0 ² кг/т)		• Фреш Фосфор (1,0 ¹ -2,0 ² кг/т)
		• Фреш Капій (0,5-1,0 кг/га)



Від 2 до 10 листків кукурудзи

■ МІКРОДОБРИВА

■ ГЕРБІЦИДИ

■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

■ ГЕРБІЦИДИ

На парах та полях, призначених під посіви ярих зернових	Протруйники	До сівби, під час та після сівби, але до появи сходів
		Від 3 до 10 листків кукурудзи

■ ПРОТРУЙНИКИ

■ МІКРОДОБРИВА

■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

■ ГЕРБІЦИДИ

■ ГЕРБІЦИДИ

1 – при застосуванні в сумі з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)

2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ (Professional)

• Пенгіфорс, ТН (1,5-2,0 л/га)	• Дестрой, КС (0,1-0,5 л/га)	• Ріфос, КЕ (0,75-1,0 л/га)	• Фостер, таб. (6-9 л/га) до 2-3 таб./т.
• Томатавк, ТН (0,4-0,5 л/т)	• Регардін ЕВ, ЕВ (0,5-1,0 л/га)	• Араболет, КС (0,5-0,75 л/га)	• Абоніл, РГ (1,5 кг/га)
• Галеон, ТН (0,55-0,7 л/т)	• Гурон, ВГ (30-40 г/га)	• Корвейт, КС (0,05-0,07 л/га)	• Деліт, РК (2,0 л/га)
• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/т)	• Супам, СЕ (0,4-0,6 л/га)	• Маджестик Цінк (0,75-1,5 л/га)	
• Фреш Гуміленд рід. (1,0-3,0 л/т)	• Фреш Енергія (0,3-0,5 кг/га)	• Фреш Універсал Фібрід (1,0-2,0 кг/га)	• Фреш Аміно, рід. (0,5 л/га)
	• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/т)		
	• Фреш Гуміленд рід. (1,0-2,0 л/т)	• Фреш Мікс (0,5-1,5 кг/га)	



1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)
2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ (Standard)

• Гранійт, ТН (2,5-3,0 л/т)	• Алтекс, КЕ (0,1-0,15 л/га)	• Ін Сег, ВГ (0,05-0,1 кг/га)	• Фостер, таб. (6-9 л/га) до 2-3 таб./т.
• Колчуга Плюс, ТН (0,2-0,25 л/т)	• Корнейт, КС (0,5 л/га)	• Регардін, ВГ (0,25-0,5 кг/га)	• Форкам, КС (0,4-0,5 л/га)
• Форсаж, КС (1,0-1,2 л/т)	• Меркурій, ВГ (0,015-0,025 кг/га)	• Вулкан Плюс, РК (3,0 л/га)	
• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/т)	• Дікам Плюс, РК (0,5-0,8 л/га)		
	• Легіон, ВГ (0,06-0,12 кг/га)	• Фреш Універсал (1,0-2,0 кг/га)	
	• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/т)		



1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)
2 – при застосуванні самостійно

Системи захисту

СИСТЕМА ЗАХИСТУ РІПАКУ (Professional)

Ін Сет, КС (3,0-4,0 л/га)	• Пропозант, КЕ (2,0-3,0 л/га)	• Стилоп, КЕ (0,4-1,8 л/га)	• Легіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га)	• Деліт, РК (2,0-2,5 л/га)
		• Шквал, КЕ (0,4-1,2 л/га)		• Абопір, РГ (1,5 кг/га)
			• Регардин ЕW, ЕВ (0,5-1,0 л/га)	• Араболет, КС (0,6-1,0 л/га)
	• Дестрой, КС (0,1-0,15 л/га)	• Ріфос, КЕ (0,5-0,6 л/га)		
		• Фреш Енергія (0,3-0,5 кг/га)	• Фреш Капій (1,0-2,0 кг/га)	• Фреш Капій (1,0-2,0 кг/га)
		• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/га)		
		• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га)		
		• Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га)		
		• Фреш Універсал (1,0-2,0 кг/га)		
			• Фреш Мікс (0,5-1,5² кг/га)	
				• Вулкан Плюс, РК (3,0 л/га)

ІНСЕКТИЦИДИ ■ **ГЕРБИЦИДИ** ■ **ФУНГИЦИДИ** ■ **ДЕСИКАНТИ** ■ **РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ** ■ **МІКРОДОБРИВА**








1 – при застосуванні в сумі з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)
2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ РІПАКУ (Standard)

Ін Сет SC, КС (3,0-4,0 л/га)	• Стилоп, КЕ (0,4-1,8 л/га)	• Легіон, ВГ (0,12-0,2 кг/га)	• Вулкан Плюс, РК (3,0 л/га)
	• Шквал, КЕ (0,4-1,2 л/га)		
		• Регардин, ВГ (0,4-0,5 кг/га)	
	• Альтекс, КЕ (0,1-0,15 л/га)	• Ін Сет, ВГ (0,05-0,07 кг/га)	• Ріфос, КЕ (0,5-0,6 л/га)
			• Дестрой, КС (0,1-0,15 л/га)
		• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/га)	• Фреш Капій (1,0-2,0 кг/га)
		• Фреш Універсал (1,0-2,0 кг/га)	

ПРОТРУЙНИКИ Протруєння до сівби	Обприскування ґрунту до сівби після висівання, але до появи сходів	ІНСЕКТИЦИДИ ■ ГЕРБИЦИДИ ■ ФУНГИЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ ФУНКЦІДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ	ІНСЕКТИЦИДИ ■ ГЕРБИЦИДИ ■ ФУНГИЦИДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ ФУНКЦІДИ ■ ІНСЕКТИЦИДИ
		1 – при застосуванні в сумі з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив) 2 – при застосуванні самостійно	1 – при застосуванні в сумі з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив) 2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОХЯЩНИКУ (Professional)

<ul style="list-style-type: none"> Ін-Сет КС (3,5-5,5 кг/т) 	<ul style="list-style-type: none"> Рейтір, КС (2,0-4,0 л/га) Пропоніт, КЕ (2,0-3,0 л/га) 	<ul style="list-style-type: none"> Стилер, КЕ (0,4-1,8 л/га) Хагер, РК² (1,0-1,2 л/га) Мотено, РК (1,0-1,2 л/га) Меркурій, ВГ⁴ (0,02-0,05 кг/га) Арбалет, КС (0,6-1,0 л/га) Ріфос, КЕ (1,0 л/га) Фреш Фосфор (1,0 л/га) Мардхестик Бор (1,0 л/га) Фреш Флорід (0,3 кг/т) 	<ul style="list-style-type: none"> Шквал, КЕ (0,4-1,2 л/га) Хантер, РК² (1,0-1,2 л/га) Везувій, РК (2,0-3,0 л/га) Деніт, РК (2,5 л/га) Абоур, РТ (1,5 кг/га) Безвій, РК (2,0-3,0 л/га)
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			<img alt

ПРОТРУЙНИКИ ■ **ГЕРБІЦІДИ** ■ **ІНСЕКТИЦІДИ** ■ **ФУНГІЦІДИ** ■ **ДЕСИКАНТИ** ■ **РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ** ■ **МІКРОДОБРИВА**

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регулюторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив) 2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОНЯЩНИКУ (Standart)

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регулюторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)
 2 – при застосуванні самостійно
 3 – у поєзях гібридів сочевини, стіків, до лісівничих речовин і груп імадзольни
 4 – гібриді стіків дія трибону-рінометту

Системи захисту

■ ПРОТРУЙНИКИ ■ ГЕРБІЦІДИ ■ ІНСЕКТИЦІДИ ■ ФУНГІЦІДИ ■ ДЕСИКАНТИ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікробіривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікробірив)

2 – при застосуванні самостійно

3 – гібриді стійкі до трибенурон-метилу

Системи захисту

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОЇ (Professional)

• Деніт, РК (2,0-4,0 л/га)	• Гапеон, TH 0,55- 0,75 л/т	• Пропозит, КЕ (2,0-3,0 л/га)	• Юнігер, РК* (0,5-1,0 л/га)	• Ефес, ВР (1,5-3,0 л/га)	• Кандіпер, ВГ (6-8 л/га)	• Шквал, КЕ** (0,4-1,2 л/га)	• Деніт, РК (2,0-2,5 л/га)
• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/т)	• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/га)	• Ступет, КЕ** (0,4-1,8 л/га)	• Монтено, РК (0,75-1,0 л/га)	• Арбланет, КС (0,6-1,0 л/га)	• Рібос, КЕ (1,0 л/га)	• Аблонір, РГ (1,5 кг/га)	• Базуїй, РК (2,0-3,0 л/га)
• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/т)	• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/т)	• Фреш Енергія (0,5-1,0 кг/га)	• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/га)	• Фреш Флорід (0,4 кг/л/га)	• Фреш Гуміленд, рід. (1,0-3,0 л/га)	• Маджестик Бор (1,5-3,0 л/га)	• Фреш Каїлі (1,0-2,0 кг/га)
• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/т)	• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/т)	• Фреш Фосфор (1,0-2,0 кг/т)	• Фреш Мікс (0,5-1,5 л/га)	• Фреш Каїлі (1,0-2,0 кг/га)	• Фреш Каїлі (1,0-2,0 кг/га)	• Фреш Каїлі (1,0-2,0 кг/га)	• Фреш Каїлі (1,0-2,0 кг/га)
Обприскування вегетуючих бу'р'янів до висадки культури	Протруйння до сівби	Обприскування грунту до/або після сходів *Обприскування сідів незалежно від фази розвитку культури	* Обприскування грунту до/або після сходів до 2-3 листків *Обприскування сідів незалежно від фази розвитку культури	1 справжній листок	3-5 справжніх листків	Цвітіння – початок достигання	Побуріння бобів нижнього та середнього ярусів, за вологості насіння не більше 35-40%

■ ПРОТРУЙНИКИ ■ ГЕРБІЦІДИ ■ ІНСЕКТИЦІДИ ■ ФУНГІЦІДИ ■ ДЕСІКАНТИ ■ РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ ■ МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)

2 – при застосуванні самостійно

СИСТЕМА ЗАХИСТУ СОЇ (Standard)

• Вулкан Плюс, РК (2,0-6,0 л/га)	• Екстрем, КЕ (1,5-3,0 л/га)	• Юнігер, РК* (0,5-1,0 л/га)	• Ефес, РК (1,5-3,0 л/га)	• Везувій, РК (2,0-3,0 л/га)
• Ступет, КЕ** (0,4-1,8 л/га)				• Вулкан Плюс, РК (3,0 л/га)
		• Форсаж, КС (0,4 л/га) + • Алієкс, КЕ (0,15 л/га)	• Корнет, КС (0,4 л/га)	
• Фреш Фосфор (1,0*-2,0 [†] кг/т)			• Фреш Каїлі (1,0*-2,0 [†] кг/т)	• Фреш Каїлі (1,0*-2,0 [†] кг/т)
Обприскування вегетуючих бу'р'янів до висадки культури	Обприскування грунту до/або після сівби, але до появи сходів	* Обприскування грунту до/або після сівби до 2-3 листків *Обприскування сідів незалежно від фази розвитку культури	1 справжній листок	Цвітіння, початок достигання

• Гербіциди	■ Інсектициди	■ Десіканти	■ Фунгіциди	■ Системи захисту
Обприскування вегетуючих бу'р'янів до висадки культури	Обприскування грунту до/або після сівби, але до появи сходів	* Обприскування грунту до/або після сівби до 2-3 листків *Обприскування сідів незалежно від фази розвитку культури	1 справжній листок	Цвітіння, початок достигання

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)

2 – при застосуванні самостійно

Системи захисту

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЯБЛУНИ	• Альтекс, КЕ (0,15-0,25 л/га)	• Дестрой, КС (0,1 л/га)	• Альтекс, КЕ (0,15-0,25 л/га)	• Дестрой, КС (0,1 л/га)
• Ріфос, КЕ (1,0-1,5 л/га)	• Корнет, КС (0,1-0,15 л/га)	• Корнет, КС (0,1-0,15 л/га)	• Корнет, КС (0,1-0,15 л/га)	• Корнет, КС (0,1-0,15 л/га)
• Фреш Універсал (1,0'-3,0' кг/га)	• Фреш Калій (1,0'-2,0' кг/га)	• Фреш Енергія (0,1-0,15 ² кг/га)	• Фреш Аміно (0,5'-1,0' л/га)	• Фреш Енергія (0,1-0,15 ² кг/га)
• Наджестік Бор (1,5-3,0 л/га)	• Фреш Фосфор (1,0'-2,0' кг/га)	• Фреш Гумінець, Рід. (1,0'-3,0 л/га)	• Фреш Гумінець, Рід. (1,0'-3,0 л/га)	• Наджестік Бор (1,5-3,0 л/га)
• Фреш Гумінець, Рід. (1,0'-3,0 л/га)	• Фреш Ленч (0,3'-1,0' кг/га)	• Фреш Ленч (0,3'-1,0' кг/га)	• Фреш Ленч (0,3'-1,0' кг/га)	• Фреш Ленч (0,3'-1,0' кг/га)
• Маркестік Цинк (1,0'-3,0' л/га)	• Маркестік Цинк (1,0'-3,0' л/га)	• Маркестік Цинк (1,0'-3,0' л/га)	• Маркестік Цинк (1,0'-3,0' л/га)	• Маркестік Цинк (1,0'-3,0' л/га)
Зелений конус	Мишачі вушка	Формування бутону	Рожевий бутон	Цвітіння
ІНСЕКТИЦИДИ	ІНСЕКТИЦИДИ	ІНСЕКТИЦИДИ	ІНСЕКТИЦИДИ	ІНСЕКТИЦИДИ
1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)	2 – при застосуванні самостійно	РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ	ФУНГІЦИДИ	МІКРОДОБРИВА

1 – при застосуванні в суміші з мікродобривом (для регуляторів росту) або з регулятором росту (для мікродобрив)

2 – при застосуванні самостійно

НАЙВАЖЛИВІШІ ФЕНОЛОГІЧНІ «КРИТИЧНІ» ФАЗИ

Культура	Фаза розвитку та механізм впливу	Особлива чутливість
Озима пшениця, ячмінь, з весни – яра пшениця	Осінь. Початок кущення: накопичення цукрів для підвищення зимостійкості Весна. Кущення, початок активного відростання: відновлення вторинної кореневої системи, формування продуктивних стебел	Калій, фосфор, сірка, марганець, мідь, цинк
Ячмінь ярий	Кінець кущення – початок виходу в трубку: закладка кількості колосків в колосі, підтягування продуктивних пагонів Кінець виходу в трубку – колосіння: подовження життєдіяльності верхніх листків, збільшення маси 1000 шт. зерен та покращення якості	Азот, фосфор, сірка, магній, марганець, мідь, молібден
Кукурудза	Кінець кущення – початок виходу в трубку: закладка кількості колосків в колосі, підтягування продуктивних пагонів Шостий–восьмий лист. Закладка кількості листків, продуктивних елементів качана	Азот, фосфор, калій, магній, мідь, марганець
Цукровий буряк	Шостий–восьмий лист. Розтягування меристеми кореня Сходження міжрядь	Азот, фосфор, бор, марганець
Соняшний	П'ятий–шостий лист. Закладка продуктивних елементів кошика	Азот, фосфор, бор, марганець, цинк
Озимий ріпак	Початок формування розетки (4-6 лист). Закладка генеративних бруньок Початок розтягування стебла (висота 30 см) Початок бутонізації	Азот, фосфор, калій, бор, цинк, мідь
Соя	Перший–третій справжній лист Початок наливу бобів	Азот, фосфор, молібден, бор
Горох	Початок формування бобів	Марганець, молібден, цинк, мідь

ФІЗІОЛОГІЧНА ПОТРЕБА ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В МІКРОЕЛЕМЕНТАХ ТА СІРЦІ

Культура	Бор	Марганець	Мідь	Цинк	Залізо	Молібден	Сірка
Пшениця	+	+++	+++	+	+	+	+++
Ячмінь	+	++	+++	+	+	+	+
Кукурудза	++	++	++	+++	+	+	++
Сорго	+	+++	++	+++	+++	+++	+
Горох	+	+++	++	++	+	++	+
Соя	+	+++	+	++	+++	+++	++
Соняшник	+++	++	++	++	+	+	+
Ріпак	+++	+++	+	+	+	++	+++
Льон	++	+	+++	+++	+	+	+
Цукровий буряк	+++	+++	++	++	++	++	++
Картопля	++	++	+	++	+	+	+

+++ висока потреба

++ середня потреба

+ низька потреба

ЧУТЛИВІСТЬ БУР'ЯНІВ ДО ГЕРБІЦИДІВ

Клас	Назва бур'яна	Грунтові гербіциди			Страхові гербіциди					
		Бензотіадазони		Грамініциди		Імідазолони				
		Екстрем	Пропозит	Рейтар	Ефес	Стилет	Шквал	Молтено	Хантер	Юпітер
Знаки	Ацетохлор	пропіацетохлор	прометрін		бентазон	клодіонім	хіалофоп-П-етил	імазамокс	імазапро + імазамокс	імазатіп
	Прося, види Прося <i>Panicum spp.</i>	2	2	2		3	3	3	3	3
	Метлюг звичайний Метлюга обыкновенная <i>Apera spica</i>	3	3	1		3	3	3	3	3
	Пальчака (види) Росинка кроваво-красная <i>Digitaria spp.</i>	3	3	2		3	3	3	3	3
	Мишій (види) Щепчиник (види) <i>Setaria spp.</i>	3	3	2		3	3	3	3	3
	Вісівка (види) Овеск (види) <i>Avena spp.</i>	1	3	1		3	3	3	3	3
	Пирій позичний Пирій полузичий <i>Agropyrum repens</i>	2		1		3	3	2	3	2
	Гумай Гумай (Сорго алецькое) <i>Sorghum halepense</i>	1	1			3	3		3	3
Багаторічні	Тонконог' (види) Мятлик (види) <i>Roa spp.</i>			1		3	3	3		
	Свинорий пальчастий Свинорий пальчастий <i>Cynodon dactylon</i>	1	1	1		3	3		3	3
	Астркові (Asteraceae)									
	Амброзія полінолиста Амброзія полінолистиста <i>Ambrosia artemisiifolia</i>	1	2	2	3			3	3	3
Двочілійні	Осот щорсткий Осот щерохвостий <i>Sonchus asper</i>	2		1					3	3 (сходи)
	Ромашка (види) Ромашка (види) <i>Matricaria spp.</i>	1	2	2	3			3		
	Галінога (види) Галінога (види) <i>Gallinagoa</i>	2	3	3	3			3	3	3
	Нетреба (види) Дурнищник (види) <i>Xanthium</i>	1	2	2	3			3	3	3
Однорічні дводомні ягодинні	Капустяні (Brassicaceae)									
	Гірчиця польова Гірчиця польовий <i>Sinapis arvensis</i>	1	2	2	3			3	3	3
	Гриції звичайні Гриції сумка <i>Capsella bursa-pastoris</i>	1	2	3				3	3	3
	Кукарівка Софії (Головник Софії (дескурайнія) <i>Descurainia sophia</i>		2	2				3	3	3
Двочілійні ягодинні	Редика дика Редика дика (польова) <i>Raphanus raphanistrum</i>	1	1	2	3			3	3	3
	Талабан польовий Ярутка польова <i>Thlaspi arvense</i>			3				3	3	2
	Гречкові (Polygalaceae)									
	Гречак (види) Горець (види) <i>Polygonum spp.</i>	2	2	2				3	3	3
Лікарські	Гречка татарська Гречка татарська <i>Polygonum tataricum</i>	2		2	3				3	3
	Лободові (Chenopodiaceae)									
	Лобода (види) Мар'я (види) <i>Chenopodium spp.</i>	3	2	2	3			3	2	2
	Лутуга (види) Лебеда (види) <i>Alticea spp.</i>	1	2					3	3	3
Лікарські	Амарантові (Amaranthaceae)									
	Ширшиця (види) Ширшиця (види) <i>Amaranthus spp.</i>	2	2	3	3			3	3	3
Лікарські	Первоцвітові (Primulaceae)									
	Куряч'я очка польові Очний цвет польовой <i>Anagallis arvensis</i>	1		2	2			3		

Страхові гербіциди											Триазол піримідини	
Синтетичні ауксіни			Сульфонілсечовини									
Дікамба	Легіон	Сулам	Апач	Гурон	Еліот	Канцлер	Меркурій	Нікоміл	Футурин	Корвейт		
дікамба + 2,4-Д клопірапід	2-Д-ефір + флорасулам	2,4-Д-ефір + флорасулам	трібенурон-метил + дікамба	трібенурон-метил + тифенсульфурон-метил	мекотран + нікосульфурон	тифенсульфурон- метил	трібенурон- метил	ніко- сульфурон	тифенсульфурон- метил + дікамба	флуметоулам + флорасулам		
			3		3			3				
			3									
			3		3			3				
			3		3			3				
			3		3			3				
			3		3			3				
			3		3			3				
			1									
3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3		
2	3	2	3	3	3	2	2	1	3	3		
2	3	3	3	3	3	3	3		3	3		
3		3	3		3	1		3	3			
3	3	3	3		3	3			3	3		
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3		
2	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3		
		2									2	
3		3	3	2	3	3	2	3	3			
3		3	3	3		3			3			
2		3	3	3	3	3	3	3	3	3		
3		2	3		3				3			

ЧУТЛИВІСТЬ БУР'ЯНІВ ДО ГЕРБІЦИДІВ (Продовження)

Чутливі: ураження бур'янів 75-100% **Середньочутливі:** ураження бур'янів 31-75% **Стійкі:** ураження бур'янів 0-30% відсутня або невідома дія препарату

(142)

Страхові гербіциди											Триазол примідіни
Синтетичні ауксини			Сульфонілесечовини								Корвет
Дікам Плюс	Легіон	Сулам	Апач	Гурон	Еліот	Канцлер	Меркурій	Нікоміл	Футурин	Флуметосулам + флорасулам	
дікамба + 2,4Д	клопрапід	2-Д ефір + флорасулам	римсульфуран+метил + дікамба	трибензурон+метил + тифенсульфуран+метил	мезотріон + нікосульфурон	тифенсульфуран+ метил	трибензурон+ метил	неко + сульфурон	тифенсульфуран+ метил + дікамба		
2	3	3	3	1	3	1	1	3	3	3	3
2	3	2	3	2	3	1		3	3	3	3
3		3	3	3		2	3		3	3	3
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2		2	2			1	1			2	
3		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	1	3	3	3	3	2	2		3	3	3
3		2	3	1		2	1		3		2
3		3	2	3	3		3		3		2
3	3	3	3	3		3	3		3		2
3	3	3									2
3	3	3	3					3		3	2
2	3	2	3	3			2			3	2
2	3	2	3	3		2	3	1	3		2
		2									
2		2	3	1		1	1	1	3		
3		3	3	3			3		3		
3		3	3	3			3		3		1
2	2	3	3	3							
	2	2						1			

Таблиця складена на основі узагальнення рекомендацій та праць науково-дослідних установ України

143

Довідкова інформація

СПЕКТР ДЛІ ФУНГІЦІДІВ І ПРОТРУЙНИКІВ НАСІННЯ

Основні види хвороб сіг культур	Арбалет, КС	Галеон, TH	Гранівіт, TH	Кольчуга плюс, TH	Корнет, КС	Лентафорс 322 FS, TH	Регардин EW, EB	Форсаж, КС	Юнкер, ЗП
Альтернаріоз	+	+			+		+	+	+
Антракноз			+		+		+		
Аскохітоз		+	+						
Біла гниль (соняшник)	+				+	+	+		
Борошинаста роса	+		+	+	+				
Гельмінгспоріоз	+			+					
Ірда листова бура	+		+						
Коренева гниль гельмінгспоріоза			+	+					
Коренева гниль офіобольозна			+	+					
Коренева гниль пітіозна			+	+					
Коренева гниль фузаріозна			+	+					
Коренева гниль церкоспорельозна			+	+					
Мілд'ю				+			+		
Моніїоз					+		+		
Несправжня борошинаста роса (Пероноспороз)				+			+		
Оїдум									
Парша				+					

144

Основні види хвороб сіг культур	Арбалет, КС	Галеон, TH	Гранівіт, TH	Кольчуга плюс, TH	Корнет, КС	Лентафорс 322 FS, TH	Регардин EW, EB	Форсаж, КС	Юнкер, ЗП
Пліснявіння насіння		+	+	+		+		+	
Плямистості листя	+	+		+	+	+	+	+	
Ринхоспоріоз	+	+		+			+		
Різоктоніоз			+						
Сажка кам'яна		+	+						
Сажка летюча			+						
Сажка покрита		+	+						
Сажка пухирчаста			+						
Сажка тверда			+						
Септоріоз		+							
Сіра гниль (виноградники)									
Сіра гниль (соняшник, ріпак)	+								
Склеротінія (ріпак)									
Снігова пліснявання		+							
Фітофтороз									
Фомоз	+								
Фузаріоз	+								
Церкоспороз	+								
Чорна гниль (виноградники)									

145

Таблиця складена на основі узагальнення рекомендацій та праць науково-дослідних установ України

Довідкова інформація

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

З метою запобігання можливих отруєнь при роботі з пестицидами, а також попадання препарату в харчові продукти і фураж забрудненням водойм, повітря і ґрунту населених пунктів, необхідно строго дотримуватись заходів безпеки, передбачених Державними санітарними правилами "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві" ДСП 8.8.1.2.001-98 та "Державними санітарними правилами авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України" затв. МЗ України 382 від 18.12.96 р. У зв'язку з цим потрібно чітко виконувати всі заходи безпеки згідно з розробленими інструкціями, основними з яких є:

- усі працюючі з отрутохімікатами повинні мати допуск (посвідчення) на право виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами, видані відповідно до порядку отримання допуску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 746, від 18.09.95 р.;
- до роботи з пестицидами не допускаються особи, молодші за 18 років, вагітні і жінки-годувальниці, а також особи, у яких при попередньому медичному огляді виявлені захворювання, при яких забороняється робота з пестицидами;
- громадяни, які направлені на роботу з отрутохімікатами, повинні пройти попередній медичний огляд та інструктаж про токсичні властивості препаратів, що вносяться, нормах, строках та способах їх застосування;
- працюючих з отрутохімікатами слід забезпечити спецодягом з щільної, пілонепроникної тканини, спеціальним взуттям, респіраторами, протигазами, захисними окулярами, рукавицями;
- робота з отрутохімікатами повинна проводитися під керівництвом спеціалістів із захисту рослин або агрономів, які мають підготовку по заходам безпеки при роботі з отрутохімікатами;
- уникати контакту шкіри, очей і одягу з препаратом та робочим розчином. Не вдихати пил та аерозольні випари;
- при роботі з отрутохімікатами потрібно дотримуватись правил особистої гігієни, на місцях роботи не приймати харчі, не пити, не палити. Перед харчуванням потрібно зняти спецодяг, вимити з мілом руки і лице, прополоскати рот. Після роботи слід добре струсити одяг і прийняти душ;
- спецодяг і захисні засоби перед їх повторним використанням піддавати очистці;
- в місцях роботи з отрутохімікатами забороняється зберігання харчів, води, фуражу та предметів домашнього побуту;
- тривалість роботи з отрутохімікатами не повинна перевищувати 6 годин, а при використанні сильнодіючих отрут (препаратів рутті, миш'яку, фосфорорганічних сполук) – 4 години;
- забороняється залишати отрутохімікати в полі та інших місцях без охорони;
- випас худоби та укіс на оброблених гербіцидами ділянках дозволяється не раніше, як через 45 діб після обробки.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ:

Препарати слід зберігати згідно ДСП 8.8.1.2.001-98 „Транспортування, збереження та застосування пестицидів у народному господарстві”.

Отрутохімікати потрібно зберігати в оригінальній упаковці в сухому прохолодному складському приміщенні для агрохімікатів, яке має припливно-витяжну вентиляцію, поодаль від нагрівальних пристрій, окремо від харчових продуктів та кормів при температурах не нижче +1°C і не вище +35°C.

Потрібно запобігти проникненню в складське приміщення вологого повітря. Забороняється зберігання у пошкоджений тарі. Транспортувати і відпускати препарати необхідно в спеціальній міцній, добре закритій тарі з вказівкою назви та кількості препарату.

Швидкість руху транспорту під час перевезення пестицидів повинна бути не більше 40 км/год, за несприятливих погодних умов – не більше 20 км/год.

Транспорт, апаратура, залишки препарату знезаражуються хлорним вапном, 10% розчином кальцинованої соди; порожня тара спалюється в установлених місцях. Забороняється повторне використання тари.

ПРИ РОБОТИ З ПЕСТИЦИДАМИ ПОТРІБНО НЕ ДОПУСКАТИ:

- забруднення іригаційних вод і водних джерел, що використовуються для побутових потреб;
- забруднення харчових продуктів і кормів;
- випас худоби на оброблених територіях;
- збирання врожаю або кормів протягом строків очікування.

ЗАХОДИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ:

До складу пестицидів входять органічні сполуки, зокрема розчинники, які характеризуються вогнебезпечними властивостями. Деякі з них горять та розкладаються під дією високих температур. Це може спричинити отруєння та матеріальні збитки.

ДЕЯКІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО УНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ:

- регулярно перевіряйте укомплектованість та справність протипожежного обладнання;
- для гасіння використовуйте пісок, ґрунт, пінні або порошкові вогнегасники;
- при охопленні вогнем пестицидів не використовуйте воду для його гасіння;
- при неможливості самостійного уникнення пожежі викликайте пожежну бригаду.

ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОПАДАННІ ПРЕПАРАТУ НА ШКІРУ, В ОЧІ, ШЛУНОК, ПРИ ВДИХАННІ ТОЩО

У разі будь-якого нездужання негайно припинити роботу, вжити заходів першої допомоги і викликати лікаря.

При попаданні препарату:

- у шлунок – необхідно дати постраждалому випити декілька стаканів води та викликати блівоту. Для більш повного видалення препарату із організму треба повторити це декілька раз. Після цого необхідно дати випити півсклянки 2% розчину питної соди, розмішати 2-3 столові ложки активованого вугілля;
- в очі – зняти препарат ватою або куском матерії та ретельно змити його теплою водою з мілом (для фосфорорганічних – попередньо обробити 5-10% розчином аміаку або 2-5% розчином хлораміну);
- при інгаляційному попаданні в організм – постраждалого вивести із небезпечної зони, дати доступ свіжого повітря.

У разі необхідності доставити потерпілого в лікувальну установу для надання спеціалізованої допомоги. Лікування симптоматичне.

Особливу увагу потрібно приділити фосфорорганічному препарату Ріфос, КЕ. При отруєнні в терапії використовувати антидоти: атропін, оксимові препарати (ПАМ, токсогонін та ін.). Тяжкі отруєння можуть привести до шоку і смерті протягом декількох годин після надходження у шлунок. Для інших препаратів – антидотів немає.



0 800 20 42 42

e-mail: agrosfera@agrosfera.ua

www.agrosfera.ua

